



*Atlas und Grundriss der  
chirurgischen Operationslehre*

Otto Zuckerkandl

## Lehmann's medizinische Handatlanten nebst kurzgefassten Lehrbüchern.

- Bd. I. Atlas und Grundriss der Lehre vom Geburtsakt und der operativen Geburtshilfe. In 155 teils vielfarbigen Abbildungen, von Dr. O. Schäffer. 5. erweit. Auflage. geb.  $\text{M}$  8.—
- Bd. II. Anatomischer Atlas der geburtshilflichen Diagnostik und Therapie. Mit 160 meist farb. Abbild. u. 318 S. Text, von Dr. O. Schäffer. 2. gänzlich umgearb. Aufl. Preis eleg. geb.  $\text{M}$  12.—
- Bd. III. Atlas und Grundriss der Gynäkologie, mit 207 meist farb. Abbildg. u. 262 S. Text, v. Dr. O. Schäffer. 2. Aufl. Preis geb.  $\text{M}$  14.—
- Bd. IV. Atlas und Grundriss der Krankheiten der Mundhöhle, des Rachens und der Nase. Mit 48 farbigen Tafeln und 80 Textabbild. Von



- O. ZUCKERKANDL. 5. vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 46 farb. Tafeln und 300 Textabbildungen. Geb.  $\text{M}$  12.—
- Bd. XVII. Atlas der gerichtlichen Medizin von Prof. Dr. E. v. Hofmann in Wien. Mit 56 farb. Tafeln und 193 Text-Illustr. Geb.  $\text{M}$  15.—
- Bd. XVIII. Atlas und Grundriss der äusseren Erkrankungen des Auges von Prof. Dr. O. Haab in Zürich. Mit 80 farb. Abb. auf 48 Tafeln und 7 schwarzen Textabbildungen. 2. Auflage. Geb.  $\text{M}$  10.—
- Bd. XIX. Atlas und Grundriss der Unfallheilkunde. 40 farbige Tafeln. 141 Textabb. Von Dr. Ed. Golebiewski in Berlin. Geb.  $\text{M}$  15.—
- Bd. XX/XXI. Atlas und Grundriss der patholog. Histologie. Spezieller Teil 120 farb. Taf. Von Prof. Dr. H. Dürok. 2 Bände. Geb. je  $\text{M}$  11.—
- Bd. XXII. — — Allgemeiner Teil. Mit 77 vielfarbigen lithographischen und 81 zum Teil zweifarbigen Buchdruck-Tafeln. Geb.  $\text{M}$  20.—
- Bd. XXIII. Atlas und Grundriss der orthopäd. Chirurgie v. Dr. A. Lünig u. Dr. W. Schultze. Mit 16 farb. Taf. u. 366 Textabb. Geb.  $\text{M}$  16.—

- Bd. XXIV. **Atlas und Grundriss der Ohrenheilkunde.** Herausgegeben von Dr. G. Brühl, unter Mitwirkung v. Professor Dr. A. Politzer. Mit 39 farb. Tafeln und 99 Textabbildungen. Geb. *ℳ* 12.—.
- Bd. XXV. **Atlas und Grundriss der Unterleibsbrüche.** Von Prof. Dr. G. Sultan in Göttingen. Mit 36 farb. Tafeln und 83 Textabb. Geb. *ℳ* 10.—.
- Bd. XXVI. **Atlas und Grundriss der Histologie und mikroskopischen Anatomie des Menschen.** Von Professor Dr. J. Sobotta in Würzburg. Mit 80 farb. Tafeln und 68 Textabbildungen. Geb. *ℳ* 20.—.
- Bd. XXVII. **Atlas und Grundriss der Psychiatrie.** Von Privatdozent Dr. W. Weygandt in Würzburg. 43 Bogen Text, 24 farb. Tafeln, 276 Textabbildungen u. 1 Anstaltskarte. Geb. *ℳ* 16.—.
- Bd. XXVIII. **Atlas und Grundriss der gynäkologischen Operationslehre.** Von Privatdozent Dr. O. Schüller. 43 farb. Tafeln u. 21 zum Teil farbige Textabbildungen. Geb. *ℳ* 12.—.
- Bd. XXIX. **Atlas und Grundriss der Diagnostik und Therapie der Nervenkrankheiten** von Dr. W. Seiffer in Berlin. Mit 26 farbigen Tafeln und 264 Textabbildungen. Geb. *ℳ* 12.—.
- Bd. XXX. **Lehrbuch und Atlas der Zahnheilkunde mit Einschluss der Mundkrankheiten** von Dr. Gust. Preiswerk in Basel. Mit 44 farbigen Tafeln und 152 Textabbildungen. Geb. *ℳ* 14.—.
- Bd. XXXI. **Atlas und Grundriss der Lehre von den Augenoperationen.** 30 farb. Tafeln und zahlreiche Textabbildungen von Prof. Dr. O. Haab in Zürich. Geb. *ℳ* 10.—.
- Bd. XXXII. **Atlas und Grundriss der Kinderheilkunde.** Von Dr. R. Hecker und Dr. J. Trumpp, Privatdozenten in München. 80 Bogen Text, 48 farbige Tafeln und 144 Textabbildungen. Geb. *ℳ* 16.—.

In Vorbereitung:

- Bd. XXXIII. **Marwedel, Allgemeine Chirurgie.**  
Bd. XXXIV/XXXV. **Sultan, Spezielle Chirurgie.**

## **Lehmann's medizinische Atlanten.**

### **Neue Folge in Quartformat.**

- Bd. I. **Atlas und Grundriss der topographischen und angewandten Anatomie** von Prof. Dr. O. Schultze in Würzburg. Mit 70 farb. Tafeln, sowie 23 Textabbildungen nach Originalen von Maler A. Schmitson und Maler K. Hajek. Geb. *ℳ* 16.—.
- Bd. II—IV. **Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen** von Professor Dr. J. Sobotta, Prosektor der Anatomie zu Würzburg:
- I. Band (Lehmann's medizinische Atlanten in 4<sup>o</sup> Band II): **Knochen, Bänder, Gelenke und Muskeln des menschlichen Körpers.** Mit 84 farbigen Tafeln, sowie 257 zum Teil mehrfarbigen Abbildungen nach Originalen von Maler K. Hajek und Maler A. Schmitson. Geb. *ℳ* 20.—.
- II. Band (Lehmann's medizinische Atlanten in 4<sup>o</sup> Band III): **Die Eingeweide des Menschen einschliesslich des Herzens.** Mit 19 farbigen Tafeln, sowie 187 zum Teil mehrfarbigen Abbildungen nach Originalen von Maler K. Hajek. Geb. *ℳ* 16.—.
- III. Band (Lehmann's medizinische Atlanten in 4<sup>o</sup> Band IV): **Das Nerven- und Gefässsystem und die Sinnesorgane des Menschen.** (Erscheint im Jahre 1905.)
- Grundriss der deskriptiven Anatomie des Menschen** von Prof. Dr. J. Sobotta, Prosektor der Anatomie zu Würzburg.  
(Ausführlicher Text zum vorstehenden Atlas mit Verweisungen auf diesen.)

I. Band geheftet *ℳ* 4.—, II. Band geheftet *ℳ* 3.—.

Jeder Band enthält ausser den Abbildungen ausführliche Erklärungen derselben nebst Tabellen und kurzem Text. Ein ausführlicher Textband wird jedem Bande des Atlas, also in drei Abteilungen, beigegeben. Diese Textbände stellen ein kurzes Lehrbuch der Anatomie dar.

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

---

# Grundzüge der Hygiene

unter Berücksichtigung der Gesetzgebung des Deutschen Reichs  
und Oesterreichs bearbeitet

von **Dr. W. Prausnitz,**

Professor an der Universität Graz.

Für Studierende an Universitäten u. technischen Hochschulen,  
Aerzte, Architekten, Ingenieure und Verwaltungsbeamte.

Siebente, erweiterte und vermehrte Auflage.

Mit 565 Seiten Text und 234 Original-Abbildungen.

**Preis brosch. Mk. 8.—, geb. Mk. 9.—**

---

# Kursus der topographischen Anatomie

von **Dr. N. Rüdinger,**

weil. o. ö. Professor an der Universität München.

**Vierte, stark vermehrte Auflage.**

Bearbeitet von

**Dr. Wilh. Höfer,** Assistent der chir. Klinik München.

Mit 80 zum Teil in Farben ausgeführten Abbildungen.

**Preis brosch. Mk. 9.—, geb. Mk. 10.—**

---

# Die typischen Operationen und ihre Uebung an der Leiche.

Kompendium der chirurgischen Operationslehre.

Von Generaloberarzt **Dr. E. Rotter.**

Sechste erweiterte Auflage.

400 Seiten. Mit 115 Abbildungen. Elegant geb. **Mk. 8.—**

---

# Stereoskopisch-photograph. Atlas der Pathologischen Anatomie des Herzens und der grösseren Blutgefässe.

In 50 Lichtdrucktafeln nach Originalaufnahmen

von **Dr. G. Schmorl,**

Kgl. sächs. Medizinalrat und Prosektor am Stadtkrankenhaus in Dresden.

**Preis mit Textbändchen in Klappkasten Mk. 15.—**

Dieser Atlas bringt die gesamte pathologische Anatomie des Herzens  
in ausgezeichneten stereoskopischen Photographien zur Darstellung. Die  
einzelnen Bilder wirken in einer Weise plastisch, dass das natürliche Präparat  
dadurch ersetzt erscheint.



Atlas und Grundriss  
der  
chirurgischen Operationslehre.

3. Auflage.



LEHMANN'S MEDICIN.  
**HANDATLANTEN.**  
BAND XVI.


---

Atlas und Grundriss  
der  
chirurgischen  
**Operationslehre**

von  
Dr. Otto Zuckerkindl  
Wien.

**Mit 46 farbigen Tafeln und 309 Abbildungen im Texte.**

**Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.**



MÜNCHEN.  
Verlag von J. F. Lehmann.  
1905.

---

**Alle Rechte, insbesondere das der Uebersetzung, vorbehalten.**

---

Holzschnitte von *H. Gerdn*, Leipzig.

Lithographien von *Fr. Reichhold*, München.

Druck des Textes von *kgl. Hofbuchdruckerei Kastner & Callwey*, München.

Autotypien von *Meisenbach Rißlarth & Co.*, München.

Papier von *Otto Heck & Ficker*, München.

Einbände von *L. Beer*, München.



105-  
2-14  
11

# Vorwort

zur dritten Auflage.

---

Die vorliegende dritte Auflage dieses Buches ist eine in Wort und Bild vermehrte und verbesserte. Neben den elementaren Operationen, deren Uebung am Kadaver die Grundlage des Unterrichtes in der chirurgischen Technik bilden, sind nunmehr auch die schwierigeren und komplizierteren Eingriffe, so die am Schädel, am Darmtrakt, an den Harnwegen gebührend berücksichtigt. Die Bilder sind um 8 farbige Tafeln und 31 schwarze Illustrationen vermehrt worden. Die letzteren sind zumeist nach Momentaufnahmen im Operationssaal gezeichnet.

Der Verlagsbuchhandlung bin ich für die gewährte Möglichkeit der Ausgestaltung des Buches zu Dank verpflichtet.

Wien im Dezember 1904.

*Dr. O. Zuckerkanal.*



# Inhalts-Verzeichnis.

## Allgemeiner Teil.

### A. Lagerung des Kranken.

	Seite
Rückenlage . . . . .	1
Hängender Kopf . . . . .	3
Steinschnittlage . . . . .	3
Seitenlagerung . . . . .	5

### B. Durchtrennung der Gewebe.

Messerführung . . . . .	6
Das Präparieren im Gewebe . . . . .	11
Das Schneiden mit der Schere . . . . .	17
Die Trennungen der Gewebe durch Stich . . . . .	19
Unblutige Verfahren zur Durchtrennung der Gewebe . . . . .	23
Durchtrennung der Knochen . . . . .	26

### C. Blutstillung . . . . . 29

Provisorische . . . . .	30
Definitive . . . . .	33
Angiotripsie . . . . .	33
Unterbindung . . . . .	35

### D. Wundversorgung, Wundnaht.

Blutige Naht . . . . .	37
Gestielte Nadel . . . . .	38
Metallklammernaht . . . . .	40
Seidenknopfnah . . . . .	41
Fortlaufende Naht . . . . .	41
Sehennah . . . . .	43
Knochennah . . . . .	45

## Spezieller Teil.

### Die Operationen an den Extremitäten.

#### I. Unterbindungen der Gefäße in der Kontinuität.

	Seite
Indikationen . . . . .	47
Allgemeines über die Ausführung der Unterbindungen . . . . .	48
Unterbindung der Art. axillaris . . . . .	54
Unterbindung der Art. brachialis . . . . .	56
Unterbindung der Art. cubitalis . . . . .	58
Unterbindung der Art. radialis und ulnaris . . . . .	63
Unterbindung der Art. femoralis	
1. unter dem Poupart'schen Bande . . . . .	67
2. oberhalb der Mitte des Oberschenkels . . . . .	68
3. im Hunter'schen Kanal . . . . .	69
Unterbindung der Art. poplitea . . . . .	70
Unterbindung der Art. tibialis { antica postica } . . . . .	72

#### II. Amputationen und Exartikulationen.

Indikationen . . . . .	77
Allgemeines über Amputationen . . . . .	79
Zirkelschnitt . . . . .	80
Lappenschnitt . . . . .	85
Ovalairschnitt . . . . .	90
Durchsägung des Knochens . . . . .	91
Wundversorgung . . . . .	92
Exartikulationen . . . . .	94

#### Amputationen und Exartikulationen an der unteren Extremität.

Exartikulationen der Zehen in den Interphalangeal- oder Metatarso-Phalangealgelenken . . . . .	97
Absetzung des Fusses im Tarsometatarsalgelenke (Lis- franc) . . . . .	101
Amputatio intertarsea . . . . .	105
Exarticulatio intertarsea (Chopart) . . . . .	106
Exarticulatio sub talo . . . . .	108
Amputation des Unterschenkels . . . . .	111
Zweizeitiger Zirkelschnitt . . . . .	114
Lappenamputationen des Unterschenkels . . . . .	116
Amputation des Unterschenkels nach Heine . . . . .	117
Osteoplastische Amputation des Unterschenkels (Bier- Eiselsberg) . . . . .	120
Subperiostale Amputation des Unterschenkels (Bruns) . . . . .	122



	Seite
Amputation nach Syme . . . . .	123
„ „ Pirogoff . . . . .	125
Exartikulation im Kniegelenke . . . . .	135
Amputation des Oberschenkels . . . . .	136
Lappenamputation am Oberschenkel . . . . .	138
Osteoplastische Amputation des Oberschenkels nach Gritti . . . . .	139
Modifikationen des Gritti'schen Verfahrens . . . . .	141
Auslösung des Oberschenkels im Hüftgelenke . . . . .	145
Auslösung des Oberschenkels im Hüftgelenke mittelst des Exstirpationsverfahrens . . . . .	146

#### Amputationen und Exartikulationen an der oberen Extremität.

Exartikulationen der Finger in den Interphalangeal- gelenken: in den Metakarpo-Phalangealgelenken	148
Exartikulation des kleinen Fingers samt dem Metakarpus nach Walther . . . . .	152
Amputation eines Fingers im Metakarpus . . . . .	156
Enukleation der Hand mittelst Zirkelschnitt und Bildung einer Manschette . . . . .	156
Enukleation der Hand mittelst vorderem und hinterem Hautlappen . . . . .	158
Amputation des Vorderarmes . . . . .	159
Enukleation im Ellbogengelenke . . . . .	161
Amputation des Oberarmes . . . . .	164
Exart. im Schultergelenke . . . . .	166
Exartikulation des Armes mit dem Schultergürtel . . . . .	170

### III. Resektionen an den Gelenken der Extremitäten.

Allgemeines zur Gelenkresektion . . . . .	172
Indikationen. . . . .	174

#### Resektionen an den Gelenken der oberen Extremität.

Resektion des Schultergelenkes nach Langenbeck . . . . .	175
„ „ „ „ „ Kocher . . . . .	178
Resektion des Ellbogengelenkes nach Langenbeck . . . . .	180
„ „ „ „ „ Kocher . . . . .	184
Resektion des Handgelenkes nach Langenbeck . . . . .	186
Resektionen an den Gelenken der Finger . . . . .	187

#### Resektionen an den Gelenken der unteren Extremität.

Hüftgelenkresektion . . . . .	188
„ nach Langenbeck . . . . .	188

	Seite
Hüftgelenkresektion nach Velpeau . . . . .	189
"                  nach Kocher . . . . .	189
Resektion des Kniegelenkes mittelst eines vorderen Querschnittes . . . . .	191
Resektion des Kniegelenkes nach Volkmann . . . . .	193
"                  "                  nach Kocher . . . . .	194
Resektion im Fussgelenke nach Langenbeck . . . . .	196
"          "          "                  nach König . . . . .	197
"          "          "                  nach Reverdin-Kocher . . . . .	198
"          "          "                  nach Wladimiroff-Mikulicz . . . . .	199

#### IV. Sonstige Operationen an den Extremitäten.

Resektion der Skapula . . . . .	202
Operation der Sehnenscheidenhygrome . . . . .	202
Operation der Dupuytren'schen Fingerkontraktur . . . . .	203
Operation des schnellenden Fingers . . . . .	204
Operation bei Syndaktilie . . . . .	204
Resektion einer Beckenhälfte . . . . .	204
Operation der angeb. Hüftluxation . . . . .	205
Punktion und Inzision des Kniegelenkes . . . . .	206
Osteotomien am Oberschenkel . . . . .	206
Operation bei Varizen . . . . .	207
Operation beim Klumpfuß . . . . .	209
Operation beim Plattfuß . . . . .	210
Operation des eingew. Nagels . . . . .	211
Achillotenotomie . . . . .	211

#### Operationen am Kopfe und Halse

##### Trepanation.

Indikationen für die Trepanation . . . . .	214
Ausführung der Trepanation . . . . .	
"          mit dem Trepan . . . . .	216
"          mit Meissel und Hammer . . . . .	217
Osteoplastische Schädelresektion . . . . .	218
Bestimmung der Trepanationsstellen am Schädel . . . . .	222
Trepanation des Warzenfortsatzes . . . . .	226
Operative Freilegung der Mittelohrräume . . . . .	227
Eröffnung des Sinus frontalis . . . . .	230

##### Operationen an den Kiefern.

Eröffnung der Oberkieferhöhle . . . . .	232
Resektion des Oberkiefers . . . . .	234
Temporäre Resektion des Oberkiefers . . . . .	238

	Seite
Resektion des Unterkiefers . . . . .	240
Temporäre Resektion des Unterkiefers . . . . .	242
Mediane Spaltung } des Unterkiefers . . . . .	244
Seitliche Spaltung }	
Resektionen aus der Kontinuität des U. . . . .	246

#### Operationen an der Zunge.

Submentale Zungenexstirpation . . . . .	246
Exstirpation nach Kocher . . . . .	249
Operation der Ranula . . . . .	250
Tonsillotomie . . . . .	251
Eröffnung des Tonsillarabszesses . . . . .	253

#### Plastische Operationen.

Allgemeines . . . . .	253
Rhinoplastik . . . . .	260
Operation der Sattelnase . . . . .	265
Plastische Deckung von Wangenhautdefekten . . . . .	268
Hasenschartenoperationen . . . . .	270
Staphyloraphie und Uranoplastik . . . . .	274

#### Operationen an den Nerven des Kopfes.

I. Ast des Trigeminus . . . . .	276
II. Ast des Trigeminus . . . . .	277
III. Ast des Trigeminus . . . . .	279
Blosslegung des II. und III. Astes nach Krönlein . . . . .	283
Blosslegung des III. Astes an der Schädelbasis . . . . .	284
Intrakranielle Trigeminusoperation . . . . .	285

#### Operationen an den Luftwegen.

Laryngotomie . . . . .	286
Kriko-thyreotomie . . . . .	288
Larynxexstirpation . . . . .	289
Tracheotomie Indikationen . . . . .	291
Tracheot. sup. . . . .	293
Tracheot. inf. . . . .	294
Intubation . . . . .	299
Pharyngotomie . . . . .	303
"    nach Malgaigne . . . . .	303
"    nach Langenbeck . . . . .	305
Oesophagotomie . . . . .	305

#### Unterbindungen der Gefäße im Bereiche des Halses.

Unterbindung des Truncus anonymus . . . . .	308
Unterbindung der Art. carotis communis . . . . .	309

	Seite
Unterbindung der Art. carotis externa . . . . .	311
Unterbindung der Art. thyreoidea sup. . . . .	312
Unterbindung der Art. lingualis . . . . .	312
Unterbindung der Art. subclavia . . . . .	313
a) oberhalb des Schlüsselbeines . . . . .	315
b) unterhalb des Schlüsselbeines . . . . .	316
Unterbindung der Art. thyreoidea inf. . . . .	317
Unterbindung der Art. vertebralis . . . . .	318
Kropfoperationen . . . . .	318
Tenotomie des Kopfnickers . . . . .	321

### Operationen am Rumpfe und am Becken.

Paracentesis thoracis, Thorakotomie . . . . .	322
Punktion des Herzbeutels . . . . .	328
Eröffnung des Herzbeutels . . . . .	328
Unterbindung der Art. mammaria int. . . . .	329
Die Abtragung der Brustdrüse . . . . .	330
bei gutartigen Geschwülsten . . . . .	330
bei Karzinom . . . . .	330
Punktion des Wirbelkanals . . . . .	334
Punctio abdominis . . . . .	335
Unterbindung der Art. iliaca . . . . .	337
Laparotomie . . . . .	339

### Operationen am Darme.

Darmnaht . . . . .	343
Enteroanastomose . . . . .	349
Enterostomie . . . . .	353
Jejunostomie . . . . .	354
Kolostomie . . . . .	355
Darmresektion . . . . .	356
Darmausschaltung . . . . .	358
Amputation des Processus vermiformis . . . . .	358
Kolopexie . . . . .	362

### Operationen am Magen.

Gastrostomie . . . . .	362
Gastroenterostomie? . . . . .	367
„ anterior . . . . .	369
„ posterior . . . . .	372
Resektion des Pylorus . . . . .	378
Pylorusausschaltung . . . . .	380

### Operationen am Gallensysteme.

Cholezystotomie und Cholecystostomie . . . . .	382
Cholezystektomie . . . . .	383

	Seite
Choledochotomie . . . . .	384
Cholezystenterostomie . . . . .	384
Transduodenale Choledochotomie . . . . .	384
Extirpation der Milz . . . . .	385
Omentopexie . . . . .	385

#### Operationen am Mastdarm und Rektum.

Exstirpation des Mastdarms . . . . .	386
Operation der Mastdarmpfistel . . . . .	392
„ „ Haemorrhoiden . . . . .	394
„ „ Atresia ani . . . . .	397

#### Operationen an den Harnorganen.

Katheterismus . . . . .	397
Einführung weicher Katheter . . . . .	401
Einführung starrer Instrumente . . . . .	403
Verweilkatheter . . . . .	409
Punctio vesiae . . . . .	411
Urethrotomia externa . . . . .	415
Urethrotomia bei eingeführter Leitsonde . . . . .	417
„ „ ohne Leitsonde . . . . .	418
Urethrotomia interna . . . . .	422
Sectio lateralis . . . . .	425
Sectio mediana . . . . .	426
Urethrostomie . . . . .	427
Litholapaxie . . . . .	427

#### Operationen an der Harnblase.

Sectio alta . . . . .	432
„ „ bei Blasenstein . . . . .	433
„ „ für andere endovesikale Eingriffe . . . . .	436
Zystostomina alta . . . . .	438
Operation der Blasenektomie . . . . .	438

#### Operationen an der Niere.

Nephrotomie . . . . .	440
Nephrektomie . . . . .	440
Nephropexie . . . . .	444
Operationen an den Harnleitern . . . . .	445

#### Operationen an den Geschlechtsorganen.

Prostatotomie . . . . .	448
Exstirpation der Samenblasen . . . . .	449
Prostatektomie . . . . .	450
Resektion und Exstirpation des Vas deferens . . . . .	455

## XIV

	Seite
Kastration . . . . .	456
Orchidopexie . . . . .	459
Operation der Varikokele . . . . .	459
„ „ Hydrokele . . . . .	460
„ „ Phimose . . . . .	462
„ des verkürzten Phrenulum . . . . .	464
Amputation des Penis . . . . .	465
Operation der Fisteln am Penis . . . . .	468
Operation der Hypospadie . . . . .	470

### Operationen an den Hernien.

Operation des Leistenbruches . . . . .	475
„ „ Schenkelbruches . . . . .	479
„ „ Nabelbruches . . . . .	482

# Verzeichnis der farbigen Tafeln.

- Tab. 1. Blosslegung der Art. brachialis und axillaris.
- Tab. 2. Blosslegung der Art. cubitalis, der Art. radialis und ulnaris.
- Tab. 3. Blosslegung der Art. femoralis unter dem Poupart'schen Bande und an der Mitte des Oberschenkels.
- Tab. 4. Blosslegung der Art. femoralis im Adduktorenschlitz.
- Tab. 5. Blosslegung der Art. poplitea.
- Tab. 6. Blosslegung der Art. tibialis ant. und post.
- Tab. 7. Blosslegung der Art. tibialis postica.
- Tab. 8. Lisfranc'sche Gelenklinie.
- Tab. 9. Chopart'sche Gelenklinie.
- Tab. 10. Stumpf nach Pirogoffs Amputation.
- Tab. 11. Querschnitt durch den Unterschenkel.
- Tab. 12. Querschnitt durch den Oberschenkel.
- Tab. 13. Querschnitt durch den Vorderarm.
- Tab. 14. Querschnitt durch den Oberarm.
- Tab. 15. Resektion des Ellbogengelenkes (Kocher).
- Tab. 16. Resektion des Kniegelenkes (Kocher).
- Tab. 17. Resektion des Fussgelenkes (Kocher).
- Tab. 18. Resektion des Unterkiefers.
- Tab. 19. Temporäre Resektion des Unterkiefers (Langenbeck).
- Tab. 19a. Blosslegung des Trigeminus (II, III) an der Schädelbasis.
- Tab. 19b. Intrakranielle Blosslegung des Trigeminus.
- Tab. 20. Laryngofissur.
- Tab. 21. Exstirpation des Larynx.
- Tab. 22. Tracheotomia inferior.
- Tab. 23. Pharyngotomia infrahyoidea.
- Tab. 24. Pharyngotomia lateralis (Langenbeck).
- Tab. 25. Blosslegung der Art. Carotis com. und der Art. subclavia unterhalb der Clavicula.
- Tab. 26. Blosslegung der Art. lingualis.
- Tab. 27. Trigonum supraclaviculare.
- Tab. 27a. Exstirpation der Struma.
- Tab. 28. Amputation der karzinomatösen Brustdrüse I.
- Tab. 29. Amputation der karzinomatösen Brustdrüse II.

## XVI

- Tab. 30. Blosslegung der Art. iliaca ext.
  - Tab. 31. Darmnaht.
  - Tab. 32. Darmvereinigung mit dem Murphyknopf.
  - Tab. 33. Darmanastomose.
  - Tab. 34. Darm- (Magen-) Fistel und Anus präternaturalis.
  - Tab. 34a. Amputation der Appendix.
  - Tab. 34b. Pylorusresektion.
  - Tab. 35. Sakrale Blosslegung des Mastdarms.
  - Tab. 36. Hoher Blasenschnitt bei Beckenhochlagerung.
  - Tab. 37. Nephrotomie.
  - Tab. 38. Perineale Blosslegung der Prostata, Samenblasen und Harnblase.
  - Tab. 39. Radikaloperation des Leistenbruches nach Bassini I.
  - Tab. 40. Radikaloperation des Leistenbruches nach Bassini II.
  - Tab. 41. Radikaloperation des Leistenbruches nach Bassini III.
-



# Verzeichnis der Figuren.

---

- Fig. 1. Beckenhochlagerung.  
" 2. Hängender Kopf.  
" 3. Steinschnittlage.  
" 4. Seitenlagerung.  
" 5—12. Messer verschiedener Form.  
" 13. Schreibfederhaltung des Messers.  
" 14. Geigenbogenhaltung.  
" 15. Spaltung einer erhobenen Hautfalte mit dem spitzen Messer.  
" 16. Führung und Haltung des Resektionsmessers.  
" 17. Führung und Haltung des Tenotoms.  
" 18. Führung und Haltung des Tenotoms.  
" 19. Das Schneiden über der Hohlsonde.  
" 20. Präparieren zwischen zwei Pinzetten.  
" 21, 22. Chirurgische Scheren.  
" 23. Schneiden mit der Schere.  
" 24. Haltung des Troikarts.  
" 25. Subkutane Infusion.  
" 26. Scharfer Löffel.  
" 27. Thermokauter.  
" 28. Schlingenschnürer.  
" 29. Bogensäge.  
" 30. Drahtsäge.  
" 31. Zirkularsäge.  
" 32. Elektromotor.  
" 33. Fingerkompression der Art. femoralis.  
" 34. Anlegung der elastischen Binde.  
" 35. Arterienkleinme.  
" 36. Führung der Nadel.  
" 37, 38. Gestielte Nadeln.  
" 39, 40. Handhabung gestielter Nadeln.  
" 41. Chirurgische Nadeln.  
" 42. Metallklammernnaht.  
" 43—46. Wundnaht.  
" 47—50. Formen der Sehnennaht.

- Fig. 51. Knochennaht.  
 " 52. Knochenklammer.  
 " 53. Metallnagel.  
 " 54. Art. zwischen zwei Ligaturen durchtrennt.  
 " 55—57. Formen von Knoten.  
 " 58. Hautschnitte zur Ligatur der A. axillaris und brachialis.  
 " 59. Muskulatur der oberen Extremität.  
 " 60. Hautschnitte zur Lig. der A. cubitalis, radialis und ulnaris.  
 " 61. Phlebotomie.  
 " 62, 63. Muskulatur des Oberschenkels.  
 " 64. Hautschnitte zur Lig. der A. femoralis.  
 " 65. Muskulatur des Unterschenkels, Rückseite.  
 " 66. Hautschnitte zur Lig. der A. poplitea.  
 " 67. Muskulatur des Unterschenkels, Vorderseite.  
 " 68, 69. Hautschnitte zur Lig. der Art. tibialis ant. und postica.  
 " 70—75. Amputation mit dem zweizeitigen Zirkelschnitt.  
 " 76, 77. Bildung eines Hautmuskellappens durch Transfixion.  
 " 78. Hautmuskellappen.  
 " 79. Bildung von Hautlappen.  
 " 80. Ovalairschnitt.  
 " 81. Blutstillung am Amputationsstumpf.  
 " 82, 83. Wundnaht nach Amputation.  
 " 84. Amputation der Zehen.  
 " 85. Lisfranc'sche Gelenklinie.  
 " 86. Lisfranc'sche Exartikulation.  
 " 87—90. Enucleatio sub talo.  
 " 91—93. Zirkelschnitt, Lappenschnitt zur Unterschenkelamputation.  
 " 94—98. Osteoplastische Unterschenkelamputation.  
 " 99. Amputation nach Syme.  
 " 100—109. Amputation nach Pirogoff.  
 " 110. Hautschnitte zur Exartikulatio genus.  
 " 111—113. Oberschenkelamputation nach Gritti.  
 " 114, 115. Schema der Gritti'schen Operation.  
 " 116, 117. Schema der Operation von Ssabanajeff.  
 " 118, 119. Schema der Operation von Djelitzyn.  
 " 120, 121. Schema der Operation von Abrashanow.  
 " 122. Exartikulation im Hüftgelenke. Hautschnitt.  
 " 123—128. Enukleationen der Finger.  
 " 129. Exartikulation der Hand Zirkelschnitt.  
 " 130—133. Exartikulation der Hand.  
 " 134. Amputation des Vorderarmes. Hautschnitte.  
 " 135, 136. Enukleation im Ellbogengelenke.  
 " 137. Oberarmamputation. Zirkelschnitt.  
 " 138, 139. Lappenschnitte zur Amputation und Enukleation des Oberarmes.

Fig. 140. Auslösung der Schulter. Bildung eines axillaren Hautmuskellappens.

- " 141, 142. Auslösung der Schulter nach Esmarch.
- " 143. Resektion der Schulter. Hautschnitt.
- " 144, 145. Resektion der Schulter nach Langenbeck.
- " 146. Resektion des Ellbogengelenkes. Lage des N. ulnaris.
- " 147—149. Schnittführung zur Resektion des Ellbogengelenkes.
- " 150. Resektion des Ellbogengelenkes. Freilegung der Gelenkskonstituentien.
- " 151, 152. Handgelenksresektion Dorso-radialschnitt.
- " 153. Hüftgelenksresektion. Hautschnitt.
- " 154, 155. Kniegelenksresektion, Vorderer Bogenschnitt nach Textor.
- " 156. Suprapatellarschnitt nach Hahn.
- " 157. Angelschnitt nach Kocher.
- " 158. Fussgelenksresektion. Bilateraler Längsschnitt nach König.
- " 159. Fussgelenksresektion nach Reverdin-Kocher.
- " 160—162. Resektion des Fusses nach Wladimiroff-Mikulicz.
- " 163, 164. Achillotenotomie.
- " 165. Trepan.
- " 166. Luer'sche Zange.
- " 167. Temporäre Schädelresektion.
- " 168. Dahlgren'sche Zange.
- " 169. Schädelresektion nach Obalinsky.
- " 170, 171. Krönlein'sches Schema zur Hirntopographie.
- " 172, 173. Trepanation des Warzenfortsatzes.
- " 174, 175. Trepanation der Stirnhöhle.
- " 176. Trepanation der Kieferhöhle.
- " 177—179. Resektion des Oberkiefers.
- " 180. Resektion des Unterkiefers.
- " 181. Temporäre Resektion des Unterkiefers nach Sedillot.
- " 182. Submentale Zungenexstirpation nach Billroth.
- " 183. Hautschnitt zur Zungenexstirpation nach Kocher.
- " 184, 185. Tonsillotomie.
- " 186, 187. Keilexzision aus der Unterlippe.
- " 188, 189. Cheiloplastik (Diefenbach).
- " 190, 191. Cheiloplastik (Langenbeck).
- " 192, 193. Cheiloplastik (Morgan).
- " 194, 196. Rhinoplastik.
- " 197, 198. Partielle Rhinoplastik.
- " 199—201. Meloplastik (Kraske-Gersuny).
- " 202—204. Hasenschartenoperation nach Nelaton.
- " 205—207. Hasenschartenoperation nach Malgaigne.
- " 208—210. Hasenschartenoperation nach Mirault-Langenbeck.

Fig. 211—213. Operation der doppelseitigen Hasenscharte.

- " 214. Entspannungsschnitte bei breitem Lippenspalt.
- " 215. Blosslegung des N. frontalis.
- " 216. Blosslegung des N. infraorbitalis.
- " 217. Blosslegung des N. mentalis.
- " 218. Hautschnitte für Operationen an den Luftwegen.
- " 219—223. Trachealkanülen.
- " 224—228. O'Dwyers Instrumentarium für Intubation.
- " 229. Oesophagotomie.
- " 230. Hautschnitte für Unterbindungen der Gefäße am Halse.
- " 231. Skalenuslücke.
- " 232. Billroth'scher Troikart.
- " 233. Rippenresektion.
- " 234. Blosslegung der Art. mammaria int.
- " 235. Amputatio mammae carcinomat. Hautschnitt.
- " 236. Naht nach Mammaamputation.
- " 237. Punktion des Bauches..
- " 238. Bauchdeckenschnitte.
- " 239. Murphys Tabaksbeutelnaht.
- " 240, 241. Endständiger Verschluss des Darmes.
- " 242, 243. Enteroanastomose mittels Murphyknopf.
- " 244, 245. Amputation des Appendix.
- " 246, 247. Gastrostomie.
- " 248 - 250. Gastroenterostomia anterior.
- " 251 - 254. Gastroenterostomia posterior.
- " 255. Sakrale Rektumexstirpation. Hautschnitt.
- " 256. Spaltung der Mastdarmfistel.
- " 257. Operation d. Haemorrhoiden mittelst Ligatur.
- " 258. Operation d. Haemorrhoiden mittelst Kauterisation.
- " 259 - 265. Katheter und Sonden.
- " 266 - 272. Katheterismus.
- " 273 - 275. Verweilkatheter.
- " 276. Troikart zur Blasenpunktion.
- " 277, 278. Blasenpunktion.
- " 279 - 281. Urethrotomia interna.
- " 282 - 287. Litholapaxie.
- " 288, 289. Hoher Blasenschnitt.
- " 290. Blosslegung der Niere. Hautschnitt.
- " 291. Invaginationsnaht der Harnleiterstümpfe.
- " 292. Perineotomie.
- " 293 - 296. Prostataktomia perinealis.
- " 297, 298. Exstirpation des Hodens.
- " 299 - 301. Phimosenoperation.
- " 302, 303. Operation des verkürzten Phrenulum.
- " 304, 305. Amputation des Penis.
- " 306, 307. Operation der Harnröhrenfistel
- " 308. Operation der Hypospadie nach Beck.
- " 309. Herniotomie.


## Allgemeiner Teil.

### A. Lagerung des Kranken zur Operation.

Die Lagerung, die wir dem Kranken zur Operation geben, muss stabil sein, eine bequeme Zugänglichkeit zum Operationsfeld geben und die Atmung unbehindert lassen. In aufrechter Stellung, in sitzender Lage sollen Operationen nicht ausgeführt werden. Die Position muss eine vollständig passive sein, es empfiehlt sich also stets, am liegenden Kranken zu operieren, wobei je nach der Lage der anzulegenden Wunde, die Lagerung eine verschiedene ist.

Die natürlichste ist die horizontale Rückenlage, die bei Operationen am Kopfe, Hals und Rumpfe Anwendung findet. Der Kranke liegt mit dem Rücken auf der Tischplatte, die Beine liegen ebenfalls gestreckt, oder sie sind im Kniegelenke gebeugt an entsprechend geformte Schienen gefesselt. Bei Operationen an den Organen des Beckens liegt der Kranke auf der schiefen, mit dem Kopfende dem Boden genäher-ten Platte (Beckenhochlagerung, Trendelenburg'sche Lage (Fig. 1). Es sinken in dieser Lage die Eingeweide gegen das Zwerchfell, und bei Eröffnung der Bauchhöhle gewinnt man eine überraschende Einsicht in die Topographie der Organe des Beckens.

Fig. 1. Rückenlage bei Beckenhochlagerung.



Bei Operationen in der Mundhöhle, im Rachen ist die horizontale Rückenlage mit hängendem Kopf (Rose) zweckmässig. Die Schultern des Kranken liegen entsprechend der Kante des Tisches; der Kopf hängt bei maximal gestrecktem Halse über der Kante nach abwärts (Fig. 2). Die Lage hat den Vorteil, dass bei Operationen das Blut nicht in die Luftwege dringt, sondern zum Munde und zur Nase ausfliesst.



Fig. 2. Operieren am hängenden Kopf.

Die Steinschnittlage, eine Modifikation der Rückenlage ist bei Operationen am Perineum, am Mastdarm, bei Blosslegungen der tieferen Harnröhrenanteile, wie der Prostata gebräuchlich. Sie ist die klassische Lagerung bei den perinealen Steinschnitten und besteht darin, dass der Kranke in Rückenlage mit maximal gebeugten Hüft- und Kniegelenken, derart auf dem Tische

liegt, dass der Steiss, womöglich auch noch der letzte Lendenwirbel über der Tischplatte hervorragt.

Man kann auch in dieser Position die Hochlagerung des Beckens zweckmässig verwenden.



Fig. 3. Steinschnittlage.



Die Steinschnittlage wird in verschiedener Form, bei geringerer oder stärkerer Beugung im Hüftgelenke angewendet, wobei entweder die Kniekehlen oder die Sprunggelenke in fixe Stützen gelagert werden.

Die Lagerung auf die Kante des Körpers, Seitenlagerung, ist in selteneren Fällen angezeigt; zur Blosslegung der Niere wird der Kranke auf die gesunde Seite gelagert; eine dicke Rolle kommt unter die Lende zu liegen,




Fig. 4. Seitenlagerung.

so dass am Operationsterrain, die zu durchtrennenden Teile der Bauchdecke stärker gespannt sind und derart der Zugang zum Retroperitonealraum vergrößert wird (Fig. 4).

Bei den Operationen an den Extremitäten wird dort, wo diese, wie bei der Amputation, von allen Seiten zugänglich sein soll, der zu operierende Teil frei den Rand des Tuches überragend von Assistenten gehalten. Im anderen Falle lagert man die abduzierte obere Extremität auf ein dem Operationstisch angerücktes Tischchen. Die untere Extremität liegt einfach der Tischplatte auf.

## Messer.

- Fig. 5. geknöpftes Messer.  
 Fig. 6. spitzes Messer.  
 Fig. 7. einfaches gebauchtes Skalpell.  
 Fig. 8. Resektionsmesser.  
 Fig. 9. Amputationsmesser.  
 Fig. 10. Tenotome mit konkaver und konvexer Schneide.  
 Fig. 11. } Bistouri.  
 Fig. 12. }
- 

## B. Durchtrennung der Gewebe.

Die Weichteile können blutig oder unblutig durchtrennt werden; blutig durch den Schnitt mit dem Messer, durch den Scherenschlag und durch Stich; oberflächliche Schichten pathologischer Gewebe können blutig durch den scharfen Löffel beseitigt werden. Zur unblutigen Zerstörung kommen thermische (Thermo-, Galvanokaustik, Athmo-kausis) chemische und mechanische Mittel zur Anwendung. Chemisch wirken die verschiedenen Ätzmittel, mechanisch die kalte Schlinge, der Ekraseur und die elastische Ligatur.

Die Knochen werden mit Meißel und Hammer, mit Sägen, Scheren und schneidenden Zangen durchtrennt, oder durch geeignete Apparate an bestimmten Stellen gebrochen (Osteoklase).

Das wichtigste und vornehmste Instrument der Chirurgie, das Messer, besteht aus Klinge und Heft. Die beiden sind entweder fix verbunden oder durch ein stellbares Scharnier artikuliert. (Bistouri). Nach der Form der Klinge unterscheiden wir, das gebauchte Skalpell, das spitze und das geknöpftes Messer.

Am gebauchten Skalpelle (Fig. 7) ist die Schneide konvex; der Messerrücken ist eine Gerade und verläuft in direkter Flucht mit dem




Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8.



Fig. 10.




Fig 11.




Fig. 12.



Fig. 9.

Heft. Das spitze Messer zeigt sowohl an der Schneide als am Rücken eine konvexe Linie und

Fig. 13. Schreibfederhaltung.



läuft in eine Spitze aus (Fig. 6). Das geknöpfte Messer (Fig. 5) ist am Ende der Klinge knopf- förmig gerundet.

Nach der Grösse und Bauart der Messer unterscheiden wir ferner Amputationsmesser (Fig. 9), Resektionsmesser (kurze, kräftige Messer) (Fig. 8), Tenotome (Fig. 10) etc.

Das Schneiden mit dem Messer ist eine Kombination von Druck- und Zugwirkung. Die zweckmässige Dosierung jeder der beiden Elemente ist Sache der Erfahrung. Anfänger fehlen, indem sie ausschliesslich durch Druck mit der Schneide des Messers wirken wollen.




Fig. 14. Geigenbogenhaltung.

Zur Durchtrennung der Haut von der Oberfläche her bedienen wir uns des einfachen gebauchten Skalpells.

Man fasst dasselbe zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger wie eine Feder; der Ulnarrand des kleinen Fingers ruht dem Objekte auf; mit der Linken wird die zu durchtrennende Haut ausgespannt. (Fig. 13.)

Dies die Messerhaltung bei kleineren Hautschnitten und beim freien Präparieren im Gewebe.

Bei Schnitten von grösserer Länge wird das Messer zwischen Daumen und die Beeren der vier Finger wie ein Geigenbogen gefasst, die linke Hand spannt die zu durchtrennende Haut. Die operierende Hand wird frei, ohne aufgestützt zu werden, geführt (Fig. 14).

Soll das Messer in einem Zuge durch eine dicke Lage von Weichteilen bis auf den Knochen




Fig. 15.

Spaltung einer erhobenen Hautfalte von der Basis zur Oberfläche.

geführt werden (beispielsweise bei den Schnitten zur Blosslegung der Gelenke), so wird es wie ein Tischmesser gefasst und durch die Weichteile eingestossen. (Fig. 16.)





Die Durchtrennung erfolgt hier mit sägenden Zügen des Messers.

Zur subkutanen Durchtrennung der Sehnen wird das Tenotom entweder zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger erfasst (Fig. 17), oder wie ein Messer beim Schälen einer Frucht mit vier Fingern umklammert, während der Daumen am Objekte eine Stütze findet (Fig. 18).

Will man die Haut von innen nach aussen durchtrennen, so geschieht dies mit dem spitzen Messer, indem dieses quer durch die Basis einer erhobenen Hautfalte eingestochen und gegen die Haut geführt wird (Fig. 15).

Soll ein zirkulärer Hautschnitt um die ganze Peripherie — beispielsweise des Unterschenkels geführt werden, so wird das Messer mit der vollen Faust gefasst, an der dem Operateur abgewandten Seite der Extremität, in sagittaler Ebene, mit der Schneide der Haut aufgesetzt, und nach Regeln, die später ihre Besprechung finden werden, um die Extremität geführt.

Im allgemeinen sollen die Hautschnitte die Haut senkrecht durchdringen. Die schräge Durchtrennung der Haut ist nur in bestimmten Fällen angezeigt.

Die Hautschnitte sind ihrer Form nach entweder linear, halbmond-, zungenförmig (Lappen),  förmig,  förmig, oder  türflügelförmig,  ankerförmig etc.

Die Länge des Schnittes wechselt mit der Tiefe, in welche eingedrungen werden soll. Im allgemeinen sollen die Hautschnitte nicht zu klein angelegt werden; der grössere Schnitt ermöglicht in der Tiefe eine genauere Orientierung, ein bequemerer und aus diesem Grunde schonenderer Vorgehen.

## Das Präparieren im Gewebe.

Man präpariert chirurgisch richtig, wenn man das vorgesteckte Ziel, die Blosslegung, oder die Ausschälung eines Gebildes, unter möglicher Schonung der benachbarten Gewebe erreicht. Gebilde, welche den Weg versperren, werden durch

Wundhaken (stumpfe, spitze, ein- und mehrzinkige Haken) abgehalten; Nerven oder Gefäße sollen nie zwischen die Branschen der Pinzetten gefasst, sondern schonend mit stumpfen Haken abgezogen werden. Ist ein Blutgefäß im Wege, so kann es zwischen zwei Ligaturen durchtrennt werden. Um




Fig. 16. Führung und Haltung des Resektionsmessers.

schonend in die Tiefe präparieren zu können, stehen uns von Methoden zur Verfügung:

- 1) Das Präparieren aus freier Hand,
- 2) das Präparieren auf der Hohlsonde,
- 3) das Präparieren zwischen zwei Pinzetten,
- 4) das stumpfe Präparieren.



Das freie Präparieren mit dem Skalpelle erfordert anatomische Sicherheit und Uebung in der Führung des Messers. Das Messer wird wie eine Schreibfeder gehalten.

Das Präparieren auf der Hohlsonde ist empfehlenswert, wenn die anatomischen Ver-




Fig. 17.  
Führung und Haltung des Tenotoms.

hältnisse es gestatten, beim Eindringen in die Tiefe Schicht für Schicht isoliert zu spalten (bei der Herniotomie, dem Hydrokelenschnitt, Schnitt durch die Bauchdecken etc.). Die linke Hand hebt mit dem Schnabel der anatomischen Pinzette einen kleinen Kegel der zu durchtrennenden Schicht empor. Dieser Gewebskegel wird an seiner Basis mit dem Messer geschlitzt und durch diese Lücke die Hohlsonde derart eingeführt, dass

sie mit ihrer Rinne nach oben gewendet, in der Richtung des anzulegenden Schnittes gehalten wird. Die Rinne der Sonde dient dem Messerrücken beim Schneiden als Bahn (Fig. 19).

Zwischen zwei Pinzetten operiert man, indem der Operateur und der assistierende Ge-




Fig. 18. Haltung des Tenotoms.

hilfe an korrespondierenden Punkten die zu durchtrennenden Gebilde sukzessive mit Pinzetten emporheben, worauf die erhobene Falte mit dem Messer eingeschnitten wird (Fig. 20). (Bei Eröffnung der Bauchhöhle, bei der Herniotomie gut verwendbar.)

Man isoliert im lockeren Zellgewebe ein Gefäß, man operiert stumpf, indem man mit

2 anatomischen Pinzetten, durch Zurückstreifen des Zellstoffes, sich unblutig den Weg bahnt. Diese Methode ist namentlich zur Freilegung von Gefässen und Nerven, zur Blosslegung der Trachea, unentbehrlich.

Soll mit dem ersten Schnitt auch eine grössere Muskelschicht durchtrennt werden, so bedienen wir uns der kräftigen, kurzen Messer, Re-





Fig. 19. Das Schneiden über der Hohlsonde.

sektionsmesser, welche wie ein Tischmesser erfasst mit kräftigem Stosse durch die Weichteile bis auf die knöcherne Unterlage eingestossen werden, worauf in sägenden Zügen dicke Schichten von Muskulatur durchtrennt werden können. (Fig. 16).

Zur zirkulären Durchtrennung von Muskelmassen wird das Messer in die volle Faust genommen und nach bestimmten Regeln geführt.

Ist in der Tiefe einer Wunde, dem Auge nicht mehr zugänglich, ein Strang zu durchtrennen, ein klemmender Ring einzukerben, so geschieht dies unter Leitung des Fingers mit dem geknöpften Messer. Das geknöpfte Ende schützt die Gewebe bei Einführung des Messers, sowie die Fingerbeere des linken Zeigefingers, an welchen das Messer gelehnt wird,



**Fig. 20. Präparieren zwischen zwei Pinzetten.**  
Eröffnung des Bauchfells bei Laparotomie.

vor Verletzungen. Nachdem mit dem eingeführten Zeigefinger genau die Stelle, an welcher der Schnitt erfolgen soll, ermittelt ist, wird das geknöpfte Messer wie eine Feder gefasst, mit dem Rücken längs der Beugeseite des Zeigefingers in die Tiefe geleitet. Das Schneiden wird hier durch Druck von seiten des Fingers, an welchen das Messer gelehnt ist, bewerkstelligt.

## Das Schneiden mit der Schere.

An der chirurgischen Schere unterscheidet man die beiden Klingen, das Schloss und die Griffe. Die Klingen sind entweder die gerade




Fig. 21.  
Gerade Schere.





Fig. 22.  
Hohlscdere.

Chirurgische Scheren.

Fortsetzung der Griffe (Fig. 21), gerade Schere, oder sie sind der Fläche nach gekrümmt (Fig. 22), Hohlscdere. Sind sie der Kante nach gegen die Handhabe geknickt, so bezeichnet man das Instrument als Winkelschere.

Fig. 23. Schneiden mit der Schere.



Bei dem Gebrauche der Schere kommen Daumen und Mittelfinger in die Scherengriffe zu liegen; der Zeigefinger wird auf das Schloss gestützt (Fig. 23). Das zu durchtrennende Gewebe

wird zwischen die Branschen der Schere gefasst und durch die Bewegung des mit dem Daumen gefassten Griffes gegen den zweiten, fix gehaltenen, durchschnitten.

Mit der Schere durchtrennt man strangförmige Gebilde, Bindegewebe, Sehnen, Muskeln, Gefäße, Faszienplatten; Darm, Magen, die vermöge ihrer Konsistenz zur Durchtrennung mit dem Messer ungeeignet sind, werden mit der Schere durchschnitten; es kann ferner die Schere beim Präparieren im Gewebe abwechselnd mit dem Messer zur Anwendung kommen. Dabei wird die eine (stumpfe) Branche der Schere unter die zu trennende Schicht geschoben.

### **Die Trennungen der Gewebe durch Stich.**


Trennungen der Gewebe durch Stich werden vorgenommen, wenn durch eine eingestossene Kanüle, aus pathologischen oder physiologischen Hohlräumen, Flüssigkeit entleert werden soll (Punktion von Abszessen, Hydrokelenpunktion), oder wenn eine spitze Hohnadel eingestochen wird, um durch dieselbe Flüssigkeit ins Zellgewebe oder in das Parenchym der Organe einzubringen (subkutane, parenchymatöse Injektionen).

Das Tasten mit der eingestochenen Nadel ist bisweilen aus diagnostischen Gründen in der Tiefe der Gewebe erforderlich.

Endlich ist zur Durchführung von Nähten die Anlegung von Stichkanälen nötig.

Nicht immer sind es spitz zugeschärfte Instrumente, die in die Gewebe des Körpers eingeführt werden, häufig werden mit Absicht stumpfe, am Ende sich verjüngende Instrumente gebraucht, die in der Tiefe, zwischen den Gebilden, den Ge-

webbspalten folgend, vordringen. Die Kornzange, die Hohlsonde werden zur Aufsuchung von Eiterherden, nach Durchtrennung der Haut am schonendsten ein Explorieren der Gewebe in der Tiefe ermöglichen. Der Eiter fließt längs der Rinne der Hohlsonde ab. Durch Oeffnen der Kornzange befördert man den Ablauf des Eiters.



**Fig. 24.**

**Haltung des Troikarts bei Ausführung der Punktion des Bauches.**

Zur Punktion dienen gerade oder gekrümmte röhrenförmige Instrumente (Troikarts), welche mit einem Stilette versehen sind, dessen Spitze das Ende der Röhre um ein geringes überragt. Zur Ausführung der Punktion wird der Troikart derart in die volle Faust genommen, dass der Griff in der Hohlhand ruht; der Zeigefinger markiert die Stelle am Schafte des Instrumentes, bis zu welcher dasselbe eindringen soll (Fig. 24).





**Fig. 25. Subkutane Infusion von Kochsalz nach einer Laparotomie.**

Mit kräftigem Stoss wird das Instrument an bestimmter Stelle senkrecht durch die Haut getrieben und bis in die Höhlung vorgeschoben; an der Art des geänderten Widerstandes kann der Operateur diesen Moment des Eindringens genau bestimmen. Die Kanüle wird nun an ihrem Ende mit dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand gefasst, und der Stachel entfernt.

Die mit den dünnen Instrumenten, zu diagnostischen Zwecken, vorgenommenen Punktionen bezeichnet man als *Explorativpunktionen*. Das Abfliessen des Inhaltes durch das dünne Rohr der Kanüle muss oft durch Aspiration mit einer angesetzten Spritze bewerkstelligt werden.

Nach Ausführung der Punktion können durch die Troikartkanüle Flüssigkeiten in die entleerte Höhle eingespritzt werden (Jodoforminjektion nach Punktion kalter Abscesse).

Zur subkutanen Injektion dient eine mit Hohlneedle armierte Spritze; es wird eine Hautfalte erhoben und der Stachel der Spritze flach durch die Haut in das Unterhautzellgewebe eingestochen, worauf die Flüssigkeit, durch Druck des Stempels der Spritze, in das lockere Gewebe getrieben wird.

Zur Ausführung parenchymatöser Injektionen wird der Stachel der Spritze durch die Haut senkrecht bis in das Innere des Organs (Schilddrüse, Lymphdrüse) eingestochen.

Werden grössere Quanten Flüssigkeit auf dem Wege subkutaner Injektion dem Körper einverleibt, so spricht man von subkutanen Infusionen. Nach Blutverlusten, erschöpfenden Operationen, kann man auf diese Weise zur Stimulierung des Herzens dem Körper grössere Flüssigkeitsmengen (bis zu 1,5 Liter Kochsalzlösung) zuführen. Der Infusionsapparat besteht aus einem Glasbehälter, an dem ein Schlauch angebracht ist,

dessen Ende die spitze Hohnadel trägt. Die Lösung ist mit dem Gefäße sterilisiert und auf Körperwärme gestellt. Desgleichen sind die Schläuche und Nadeln steril.

Man injiziert gewöhnlich an korrespondierenden Stellen jeder Körperseite ins Zellgewebe, wo es ziemlich locker gefügt, eine rasche Verbreitung und Aufsaugung der Flüssigkeit gestattet, an den Extremitäten in zentripetaler Richtung, in die Bauchhaut, in die Infraklavikulargruben oder retro-mammär. Die Nadeln werden, während man Flüssigkeit auslaufen lässt, eingestossen. Die sich ansammelnde Flüssigkeit erzeugt oedematöse Schwellungen, die rasch schwinden. Druck auf dieselben erleichtert die Aufsaugung (Fig. 25).



Fig. 26.  
Volkman's  
scharfer  
Löffel.

Mit dem scharfen Löffel (Fig. 26) lassen sich locker gefügte pathologische Gewebe, Neoplasmen, Granulationen, abschaben. Namentlich wird der Löffel zur Entfernung des Belages von Fisteln, Abszesshöhlen, zur Abtragung kleiner Geschwülste vorteilhaft zu verwenden sein. Bei malignen Geschwülsten hat die Ausschabung nur palliativen Wert.

### **Die unblutigen Verfahren zur Durchtrennung der Gewebe.**

1. Das *Ferrum candens* (cauterium actuale), der im Feuer glühend gemachte Eisenstab, findet als solcher in der Chirurgie keine Verwendung, wohl aber schneidet man die Gewebe blutleer mit dem glühenden Brenner der Thermokauter von Paquelin (Fig. 27) oder mit dem, durch elektrischen Strom zum

Glühen gebrachten Platindraht (Galvanokauter). Der über der Spiritusflamme bis zur Rotglut erhitzte Brenner der Thermokauter kann durch das Einblasen der Dämpfe von Petroleumäther, dauernd glühend erhalten werden. Durch die Regulierung der zuströmenden Dämpfe des Petroleumäthers, d. h. durch eine mehr oder we-




Fig. 27.

Paquelin's Thermokauter.

A. Brenner. B. Spirituslampe. C. Gebläse. D. E. Reservoir für Petroleumäther.

niger energische Handhabung des am Apparate angebrachten Gebläses, lassen sich alle Grade der Erhitzung bis zur Weissglut erzielen.

Mit den verschiedenen Arten von Schlingen können Gebilde von ihrer Basis abgetrennt werden, wenn sie derart gestaltet sind, dass die Schlinge um die Trennungsfläche gelegt werden kann. Die durch den elektrischen Strom

zum Glühen gebrachte galvanokaustische Schlinge schneidet, indem sie allmählich zugezogen wird, das Gewebe blutleer durch.




Fig. 28.  
Schlingenschnürer.

Die einfache Drahtschlinge, welche die Gewebe direkt durchquetscht, kann nur bei leicht gefügten Geweben (Nasendpolypen) in Anwendung kommen. Das Zuziehen der Drahtschlinge wird mit Hilfe des Schlingenschnürers (Fig. 28) bewerkstelligt.

Die Einwirkung heisser Dämpfe zur Zerstörung pathologischer Gebilde (Atmokausis) ist ein Mittel, an umschriebenen Stellen, oberflächliche Verschorfung der Gewebe zu erzeugen.

Die Wirkung konzentrierten Lichtes, der Röntgen- und Radiumstrahlen auf pathologische Gebilde (Lupus, Hautkrebs, Teleangiektasien) ist gegenwärtig Gegenstand vielfacher Untersuchung.

Von chemischen Mitteln haben sich zur Zerstörung von Geweben in der modernen Chirurgie der Lapisstift, die rauchende Salpetersäure und Lösungen von Chlor-

zink erhalten. Zur Behandlung von malignen Geschwülsten wurden Aetzpasten, Aetzpfeile aus Arsenik, Kali kaustikum früher vielfach gebraucht.

Die elastische Ligatur (Dittel), ein Kautschukschnürchen, welches bei maximaler Spannung um das zu durchtrennende Gewebe geknüpft wird, wirkt durch den kontinuierlichen Druck und schneidet ganz allmählich, in Tagen oder Wochen, durch die Gewebe. Die Wirkung ist eine so allmähliche, dass die Schnittfläche nach erfolgter Abtrennung eine granulierende Wunde darstellt. Die elastische Ligatur ist auch bei derben, fibrösen Stielen von beträchtlicher Ausdehnung mit Erfolg anwendbar (Stielbehandlung bei Uterusmyom).

Das Ekrasement, das Durchquetschen der Gewebe mit Hilfe einer gegliederten Kette, wurde um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in zahllosen Fällen verwendet. Der Ekraseur von Chassagnac gestattet ein ganz allmähliches Zuschnüren der Kette, welche Glied für Glied in den Schaft des Instrumentes gezogen wird. Durch die Methode der Galvanokaustik und Thermokaustik hat das Ekrasement völlig den Boden verloren, und zehrt die Methode heute nur noch von ihrer glänzenden Vergangenheit.

### **Die Durchtrennung der Knochen**

erfolgt mit der Säge, mit Meissel und Hammer, Knochenschere und Knochenzangen. Subkutan werden die Knochen entweder manuell oder mit Hilfe eigener Apparate (Osteoklasten) gebrochen.

Vor jeder blutigen Durchtrennung des Knochens, muss derselbe durch Spaltung und Abhebe-

lung des Periosts im Operationsbereiche blossgelegt werden.

Die Bogensäge (Fig. 29) kommt überall zur Anwendung, wo die Verhältnisse für die freie Exkursion des Instrumentes günstig sind (Durchsägung der Extremitätenknochen bei Amputationen, Absägen der Gelenkenden bei Resektionen).

Bei Handhabung der Bogensäge ist auf die Einhaltung der genauen Richtung der Trennungsebene wohl zu achten. Die Säge wird anfänglich leicht, fast ohne Druck geführt, erst wenn eine Furche als Bahn für das Blatt der Säge geschaffen




Fig. 29.  
Bogensäge.

ist, erscheint ein gewisser Druck beim Sägen angezeigt.

Ist der durchzusägende Knochen derart situiert, dass die freien Exkursionen mit der Bogensäge behindert erscheinen (Durchsägung des Unterkiefers, des Proc. zygomaticus des Oberkiefers etc.), so kommt die Kettensäge resp. die Drahtsäge mit Vorteil zur Anwendung. Die erstere besteht aus einer Reihe von gezähnten Gliedern, die durch Scharniere zusammenhängen; die Drahtsäge (Fig. 30) ist ein rauher

Metalldraht, an dessen Enden, wie bei der Ketten-  
 säge, Oesen zur Aufnahme von Handhaben ange-  
 bracht sind. Diese fadenförmigen Sägen werden,  
 oft mit Hilfe einer gekrümmten Nadel, um den zu  
 durchsägenden Knochen geschlungen, worauf mit  
 Zuhilfenahme der Handhaben, bei gespannter  
 Säge, die Durchtrennung des Knochens erfolgt.




Fig. 30.  
 Drahtsäge.

Am Schädeldache werden zur Resektion in  
 neuerer Zeit gerne Zirkulärsägen (Fig. 31) in  
 Anwendung gebracht. Die Säge wird am besten  
 von einem Elektromotor (Fig. 32) betrieben.  
 Sie arbeitet rasch und exakt, und man vermeidet  
 — am Schädel ist dies von Bedeutung — bei der  
 Durchtrennung jegliche beträchtlichere Erschütte-  
 rung des Knochens.

Meißel und Hammer werden an den Ex-  
 tremitäten vielfach verwendet (lineare Osteotomie,



Aufmeisselung bei Nekrosen etc.). Zur Schädelresektion sind sie weniger geeignet.



Fig. 31.  
Zirkularsäge.

Dünne Knochenspannen (Rippen, Phalangen), vorstehende Splitter an Sägeflächen können mit der Knochenschere oder Knochenzange durchkneipt werden. Zur Anfrischung der Knochen werden scharfe Löffel und kräftige Messer vorteilhaft angewandt.

Die Osteoklase, das Zerschneiden der Knochen, wird aus orthopädischen Gründen, bei fehlerhaft geheilten Frakturen, bei Difformitäten der Extremitäten, entweder manuell oder mit Hilfe von Apparaten (Osteoklasten) vorgenommen. Die manuelle Osteoklase leidet unter dem Uebelstande, dass man die Fraktur nicht an ganz bestimmter Stelle anbringen kann.

Gebräuchlich sind der Osteoklast von Robin und von Lorenz. Ein guter Apparat ermöglicht die Fraktur des Knochens an bestimmter Stelle bei geringster Verletzung der bedeckenden Weichteile.

### C. Blutstillung.

Bei Anlegung von Wunden, wie bei der Versorgung derselben ist die Vermeidung von Blutung, wie die Stillung solcher von entscheidender Bedeutung, sowohl für den Verlauf, wie für die Dauer der Heilung.

Für die Dauer einer Operation wird eine provisorische Blutstillung erzielt, entweder

durch digitale Kompression der Arterie, oder durch Umschnürung der Extremität mit dem ela-

Fig. 32.  
Elektromotor zum Betriebe der Zirkularsäge.



stischen Schlauch (Esmarch'sche Blutleere). Die Unterbindung des Hauptgefäßes zur praeventiven Blutstillung bei Operationen ist nur in beschränktem Maasse anwendbar.

Die Digitalkompression kann nur dort zweckmässig angewendet werden, wo die Arterie zugänglich ist und gegen die feste Unterlage eines Knochens sich andrücken lässt. Sind diese Bedingungen gegeben, so kann man die grossen Gefässe durch Fingerdruck längere Zeit hindurch bis zur völligen Aufhebung ihrer Lichtung komprimieren.

Unter Kompression der Art. femoralis wird man jede Operation an der unteren Extremität bei völliger Blutleere der Gewebe ausführen können. Zunächst wird das Bein einige Zeit vertikal eleviert gehalten, und man beginnt, ehe es horizontal gelagert wird mit der Kompression. Diese wird mit den aufeinander gelegten Daumen beider Hände derart ausgeführt, dass das Gefäss, durch die Pulsation kenntlich, in der Fovea sublingualis gegen den Schambeinast mässig angedrückt wird (Fig. 33).

Zur Kompression der Arter. subclavia sitzt der Kranke, oder ist mit erhobenem Rumpfe gelagert. Der Komprimierende steht zu Häupten des Kranken, so hoch, dass er von oben her die Supraklavikulargrube bequem erreicht. Man tastet die erste Rippe, gegen welche die pulsierende Arterie durch Druck der Daumen beider Hände gedrückt wird.

Zur Kompression der Karotiden steht der Arzt hinter dem Kranken; er umfasst den Hals von hintenher derart, dass der Daumen auf die Nackenmuskel zu liegen kommen, während die übrigen vier Finger in der Furche vor dem Kopfnicker angreifend, die Arterie gegen die Halswirbelsäule pressen.

Bei mageren Kranken tastet man durch die Bauchdecken die Aorta, und kann sie gegen die Lendenwirbelkörper wirksam digital komprimieren.

Die praeventive Blutstillung durch elastische Umschnürung, die Esmarch'sche

Fig. 33.  
Digitale Kompression der Art. femor. vor Amputation des Unterschenkels.



Blutleere wird an den Extremitäten, am Penis, am Schädel anwendbar sein. Die Extremität wird vor Ausführung der Umschnürung vertikal eleviert gehalten, worauf unter beträchtlichem Zuge, die elastische Binde oder der Schlauch zirkulär umwickelt und in dieser Lage fixiert wird (Fig. 34). Die Esmarch'sche Blutleere liefert das vollkommenste Resultat, man operiert in absolut blutleeren Geweben. Die grösseren Gefässe sind dabei sichtbar und können vor Abnahme der konstringierenden Binde definitiv versorgt werden. Nach Abnahme der Binde tritt eine kurz dauernde doch heftige kapilläre Blutung, aus allen Geweben auf.

Zur definitiven Blutstillung müssen wir zwischen kapillären und Blutungen aus sichtbaren Gefässen unterscheiden. Die ersteren stehen, wenn auf das blutende Gewebe ein temporärer oder dauernder Druck (Kompression, Tamponade durch Gazebauschen) geübt wird, oder wenn man die Gewebe mit heissen Lösungen in Berührung bringt. Durch oberflächliche Verschorfung mittelst der Paquelin, mittelst heissen Dampfes, sind auch die Schnittflächen reich vaskularisierter Organe blutleer zu machen.

Aus grösseren Gefässen muss die Blutung mechanisch, durch Verschluss der blutenden Lichtung zum Stillstand gebracht werden. Solche Mittel sind, die Abquetschung, die Torsion und die Unterbindung des blutenden Gefässes.

Für jede der Methoden muss das Gefäss mit entsprechenden Instrumenten (sperrbare Pinzetten, haemostatische Zangen) gefasst werden. Die Blutstillung durch Abquetschung der Gefässe, Angiotripsie hat wenige unbedingte Anhänger; in beschränktem Masse, bei kleineren Gefässen

macht jeder Chirurg Anwendung von der Methode, wenn er blutende Gefäße beim Fassen mit der Zange zusammengequetscht, und nach Ab-




Fig. 34. Anlegung der elastischen Binde zur Esmarch'schen Blutleere.

nahme des Instrumentes, ohne Anlegung einer Ligatur, die Blutung sistieren sieht.

Für diese Zwecke ist die Klemmzange von Doyen (Fig. 35) den Schieberpinzetten weit überlegen, weil die Bauart des Instrumentes eine bedeutende Steigerung der angewendeten Kraft bedingt. Bei Anwendung der Torsion wird das durchschnittene Ende des Gefäßes mit einer sperrbaren Zange gefasst und durch wiederholte Drehung um seine Längsachse verschlossen; man pflegt die Torsion so lange fortzusetzen bis das Gefäß



Fig. 35. Klemmzange von Doyen.

völlig durch Drehung durchtrennt wird, so dass die Torsion in ihrer mechanischen Wirkung der Angiotripsie ähnlich ist. Die meist benützte Methode der Blutstillung ist die Unterbindung. Zur Ausführung derselben wird das blutende Gefäß an seinem Ende, am besten senkrecht zu seiner Achse mit einer sperrbaren Zange (Schieberpinzette, Klemmzange) gefasst. Mit dem Instrumente wird das Gefäß um ein geringes aus dem Gewebe hervorgehoben, mit einem Faden umschlungen und durch Knoten der Schlinge abgeschnürt (pag. 93). Die Kleinheit und Lage eines Gefäßes macht es oft unmöglich, dasselbe

isoliert zu unterbinden, man fasst in solchem Falle das Gefäss samt dem anliegenden Gewebe in die Zange und in die Ligatur. Es ist zweckmässig, sichtbare Gefässe beim chirurgischen Präparieren, zweifach, in der Distanz von etwa einem Zentimeter abzuklemmen, zwischen den Klemmen zu durchschneiden und zu ligieren. An ungünstig situierte blutende Gefässe wird der Ligaturfaden durch Umstechung geschlungen. Eine mit Faden armierte, halbkreisförmige Nadel wird derart durch das dem Gefässe anliegende Gewebe geführt, dass beim Knoten des Fadens die blutende Stelle verschlossen wird.

### **D. Wundversorgung, Wundnaht.**

Die gesetzte Wunde muss nach erfolgter Blutstillung definitiv versorgt werden; sie bleibt entweder offen oder wird durch Naht geschlossen; häufig werden beide Methoden kombiniert. Bleibt die Wunde unvereinigt, so wird sie locker oder fester mit antiseptisch imprägniertem Gaze-stoff ausgestopft (tamponiert), das Ende des Streifens wird zur Wunde herausgeleitet. Die Tamponade wird zweckmässig mit der Drainage der Wunde kombiniert. Dem letzteren Zwecke dienen Röhren aus Glas oder Kautschuk, die bis in den tiefsten Teil der Wunde eingelegt werden, und mit ihrem Ende aus der Wunde herausragen.

Die Vereinigung der Gewebe hat den Zweck, die zur Verheilung geeigneten Schichten der Wunde, für die Dauer des Heilungsprozesses, unverrückbar aneinander zu adaptieren.

Man vereinigt eine Wunde, kurz nachdem sie gesetzt wurde (primäre Naht), oder nimmt die Vereinigung erst zu einer Zeit vor, in welcher



die Wunde sich bereits im Stadium der Granulation befindet (sekundäre Naht). Das unblutige Aneinanderlöten von getrennten Geweben, Hautwunden, durch Klebemittel (Kolloidium, Heftpflaster) ist nur bei ganz geringfügigen Verletzungen, ohne beträchtliche Dislokation der Wundränder, am Platze.




Fig. 36.

Führung von Nadelhalter und Nadel bei der Hautnaht

Erheblichere Wunden erfordern, falls sie zur prima intentio geeignet sind, stets die Vereinigung durch blutige Naht.

Mittels gekrümmter Nadeln (Fig. 41) werden Fäden durch die Wundlippen geführt und geknüpft. Die Naht wird senkrecht auf die Richtung der Wunde, stets an korrespondierenden Punkten der Wundliefzen angebracht.

Die Nadeln werden entweder mit freier Hand geführt, oder mit zangenförmigen Instrumenten, Nadelhaltern, gefasst und dirigiert.

Bilden Nadel und Nadelhalter ein Ganzes, so haben wir die sogenannte gestielte Nadel (Fig. 37, 38) vor uns.

Als Nähmaterial dienen: Seide, Katgut (resorbierbares Material) oder Metalldraht (Silber, Blei).




Fig. 37.

Fig. 38.

Formen gestielter Nadeln.

Bei Verwendung von Nadelhalter und Nadel wird das zu vereinigende Gewebe, ehe es durchstochen wird, stets mit der Pinzette gefasst, emporgehoben und gegen die eindringende Nadel gedrängt (Fig. 36). Die Stielnadeln sind für oberflächliche und tiefe Nähte vorteilhaft verwendbar. Die Nadel wird durch die zu vernähenden Teile gestossen (Fig. 39), der Faden in das Ohr der Nadel eingelegt und hierauf das Instrument,




**Fig. 39. Handhabung mit gestielter Nadel.**

**I. Die Nadel ist durch korrespondierende Stellen der Haut gestochen.**



**Fig. 40. Handhabung mit gestielter Nadel.**

**II. Die Nadel wird nach Einlegung des Fadens entfernt.**



**Fig. 41. Formen von chirurg. Nadeln.**

während der Assistent den Faden festhält, entfernt (Fig. 40).

Vielfach sind derzeit kleine Metallhäkchen (Michel'sche Klammern [Fig. 42 a]) zur Hautnaht in Verwendung. Sie werden auf die adaptierte



Fig 42.

Hautnaht durch Anlegung von Metallklammern.

Hautwunde aufgelegt und mittelst Hakenpinzette in ihrer Mitte derart geknickt (Fig. 42 b), dass sie die Wunde spangenartig überspannen. Kleine am Ende angebrachte Spitzen bohren sich dabei in die Haut und fixieren die Klammer. Dort, wo die Wundränder keiner allzu grossen Spannung ausgesetzt sind, wo die tieferen Schichten durch versenkte Nähte vereinigt sind, kann man die

Klammern vorteilhaft verwenden. Gegenüber der Knopfnahht ist es nicht unwichtig, dass die Metallklammer eigentlich, ohne eine Wunde zu setzen, angelegt wird.

Hat die Wunde bloss geringe Tiefe, so genügt es, die Hautränder durch Nähte zu adaptieren; im allgemeinen ist die Nadel entsprechend der Tiefe der Wunde in grösserer oder geringerer Distanz vom Wundrande einzustechen.

Will man bei sinuösen Wunden die Bildung von Hohlräumen vermeiden, so empfiehlt es sich, entweder die Gewebe in der Tiefe der Wunde für sich zu vereinigen (*versenkte Nähte*), oder breitere Flächen der Wunde aneinander zu adaptieren.

Ist die Wunde komplizierter, handelt es sich um Verletzungen von Muskeln, Sehnen, Nerven, so müssen, ehe an den Verschluss der Wunde gedacht wird, diese Gebilde isoliert durch die Naht vereinigt werden.

Zur Vereinigung von Hautwunden dient die einfache Seidenknopfnahht (Fig. 43). Durch tiefgreifende, und oberflächlich angelegte Nähte sucht man ein möglichst exaktes Aneinanderliegen der Wundflächen und Hautränder zu erzielen; das Einstülpfen der Hautränder soll durch genaues Adaptieren der Wundränder vermieden werden.

Die fortlaufende Naht, mit einem Faden, ohne Unterbrechung ausgeführt, ist zur Hautnaht ebenfalls geeignet. Sie wird in verschiedener Form als Kürschnernahht (Fig. 44), als geschürzte fortlaufende Naht, Languettennahht (Fig. 45) und als Matratzennahht (Fig. 46) angelegt. Die Art der Anlegung ergibt sich aus den Figuren.




Fig. 43. Einfache Kopfnah.




Fig. 44. Fortlaufende Kürschnernaht.




Fig. 45. Languettenah.




Fig. 46. Fortlaufende Matratzenah.

Durchtrennte Muskeln werden mit Katgut- oder Seidenknopfnähten derart vereinigt, dass Wunde an Wunde zu liegen kommt.

Die Vereinigung durchtrennter Sehnen soll womöglich ein Adaptieren der Querschnitte der Sehne bewirken. Bei bandförmigen platten Sehnen

(z. B. Extensoren am Handrücken, an der Streckseite der Finger) wird man sich begnügen, die Sehnen aufeinander zu nähen. Hüter empfahl direkt für alle Fälle diese sogenannte paratendinöse Naht (Fig. 47).

Kräftige walzenförmige Sehnen (Flexoren der Finger, Tibialis ant., post., Peronaei etc.) können durch einfache, in der Längsrichtung angelegte, feine Seidenknopfnähte vereinigt werden; um das Durchschneiden der Fäden zu verhindern, können die Nähte zweckmässig quer durch die Sehnenstümpfe gelegt werden (Fig. 50).



Fig. 47.

Paratendinöse Sehnennaht.

Auch das Anlegen von Halteschlingen und nachträgliche Knüpfen dieser ist ein zweckmässiges Verfahren (Fig. 49).

Vor Anlegung der Naht an den Sehnen sind oft Voroperationen (Spaltung der Haut, der Sehnenscheide) zur Blosslegung des zentralen Sehnenstumpfes erforderlich. Oft lässt sich auch ohne diese, der Sehnenstumpf mittelst zentrifugaler Einwicklung oder mit Hilfe eines eingeführten einfachen spitzen Häkchens aus der Sehnenscheide hervorholen.

Nach Anlegung der Sehnennaht ist es wichtig, das operierte Glied im Verbande derart zu lagern, dass die Sehne in möglichst entspannter Stellung bis zur Heilung fixiert erhalten werde.

Ist wegen Kürze der Sehnenstrümpfe ein Adaptieren derselben in der gewöhnlichen Weise nicht ausführbar, so kann man durch eine Hilfsoperation (Tenoplastik) die Kontinuität der Sehne herstellen. Aus dem Sehnenstrumpf der einen Seite wird ein Lappen ausgeschnitten, herabgeklappt und an den anderen Stumpf durch die Naht befestigt (Hüter). (Fig. 48.)

Die von Robert und Nélaton zuerst geübte Nerven-naht ist sowohl bei frischen Verletzungen, Durchtrennungen der Nerven, als auch sekundär mit Auslösung und Anfrischung der beiden Stümpfe berechtigt.



Fig. 48.

Hüters Tenoplastik.

Die Nerven-naht bezweckt die Annäherung der Querschnitte des durchtrennten Nervenstran-



Fig. 49.

Anschlingen der Sehnenenden.

ges. Zu diesem Zwecke werden feine Fäden entweder direkt durch die Substanz des Nerven geführt, und die Querschnitte der Stümpfe aneinander geheftet, oder man vereinigt die Nervenstümpfe derart, dass sie mit ihren Seitenflächen aneinander liegen (paraneurotische Naht).



Die Vereinigung kann auch derart ausgeführt werden, dass man die Nähte nicht durch die Substanz des Nerven sticht, sondern durch das Bindegewebe um die Nerven führt. Auf diese Weise werden die Nervenstümpfe indirekt einander genähert (perineurotische Naht).

Auch eine der Tenoplastik Hüters nachgebildete Neuroplastik zur Vereinigung getrennter Nervenstrümpfe kann mit Erfolg zur Anwendung kommen.




Fig. 50.

Durchquerung der Sehne durch die Naht

Die Stellung und Fixierung des operierten Gliedes nach der Operation soll jede Zerrung am Nerven verhindern.

Die Vereinigung von Knochen erfolgt in analoger Weise wie die der Weichteile durch die Naht (Fig. 51). Als Nähmaterial wird zweckmässig Metalldraht verwendet. Die Stichkanäle müssen durch den Bohrer oder durch die Ahle gebohrt werden. Die Drähte werden durch Zusammendrehen der Enden fixiert. Auch Klam-

mern können, ähnlich wie man sie zum Fixieren von Brettern an Gerüsten verwendet, hier Anwendung finden (Gussenbauers Klammer, Fig. 52).




Fig. 51.  
Naht der Patella mit Metalldraht,  
abgeschlossen ist, aus dem Knochen entfernt.

Getrennte Knochen können ferner durch Nägel, Elfenbeinstifte (Fig. 53) aneinander-genagelt werden. Auch durch die bedeckenden Weichteile lassen sich Nägel zum Zwecke des Aneinanderheftens in den Knochen eintreiben (perkutanes Nageln der Knochen).

Metallnähte, Stifte und Nagel werden erst nach Wochen, wenn die solide Vereinigung



Fig. 52.  
Knochenklammer.



a. b.  
Fig. 53.  
a. Metallnagel.  
b. Elfenbeinstift.

## Spezieller Teil.

### Die Operationen an den Extremitäten.

#### I. Unterbindungen der Gefässe in der Kontinuität.

Man kann ein verletztes und blutendes Gefäss direkt in der Wunde fassen und durch Abschnürung desselben die Blutung zum Stillstand bringen. Ein anderes Verfahren legt die Arterie zentralwärts von der verletzten Stelle zum Zwecke der Ligatur bloss. Von diesen Unterbindungen in der Kontinuität der Gefässe soll hier die Rede sein.

##### Indikationen:

##### 1. Verletzungen.

a) Stich-, Schussverletzungen, Hieb- und Quetschwunden der grossen Arterien. Wenn möglich, ist die Unterbindung an der verletzten Stelle vorzunehmen. Diese ist schwierig in blutig suffundierten, gequetschten Geweben, bei ungünstiger Situierung der Wunde, oder wenn die Arterie gerade an ihrem Abgange aus dem Hauptstamme verletzt ist.

b) Subkutane Zerreissung grosser Gefässe, ebenfalls wenn die Unterbindung in loco laesionis unmöglich.

2. Blutungen, aus eiternden Wunden, durch Erosion grosser Gefässe bedingt. Ferner arterielle Blutungen aus gangränösem Gewebe oder aus zerfallenden Neubildungen.

3. Um ein blutleeres Operieren zu ermöglichen, wird der arterielle Hauptstamm des Operationsterrains präventiv durch die Ligatur verschlossen. (Art. lingualis vor Zungenexstirpation, Art. cruralis vor Enukeation im Hüftgelenke, Art. iliaca vor Operationen an Organen des Beckens.)

4. Um pathologisch veränderte Organe oder Geschwülste zur Rückbildung zu veranlassen, wird der arterielle Zufluss durch Ligatur der Hauptarterie unterbrochen. (Ligatur der Art. tyreoideae bei Kropf, der Art. spermatica bei Hodengeschwülsten, der Art. iliaca int. bei Hypertrophie der Prostata u. a.)

Hierher gehört die Behandlung der Elephantiasis cruris durch Unterbindung der Art. iliaca ext. oder femoralis, die einzelnen Autoren gute Resultate geliefert hat.

5. Aneurysmen. Nach Hunter wird zur Behandlung der Aneurysmen die zuführende Arterie unterbunden. Wegen der rückläufigen Speisung des aneurysmatischen Sackes auf dem Wege der Kollateralbahnen ist Hunter's Methode weniger zuverlässig, als die des Antyllus.

Bei operativ sonst nicht mehr zu beseitigenden Neuralgien des Trigeminus wurde die Unterbindung der Art. Carotis wiederholt vorgenommen (Patruban).

Der Vorschlag, zur Behandlung der Epilepsie die Arteria vertebralis aufzusuchen und zu unterbinden, ist jüngeren Datums.

### **Ausführung der Unterbindung.**

An genau fixierten Stellen wird von der Oberfläche des Körpers durch die Haut eingegangen, worauf unter möglichster Schonung wichtigerer Gebilde, die Gefäßscheide blossgelegt wird.

Die Gefässscheide wird eröffnet und die Arterie in kurzer Strecke von den angrenzenden Venen isoliert, zum Zwecke der Unterbindung aus ihrem Bette gehoben. Nun folgt die Anlegung zweier Ligaturen, zwischen denen man die Arterie mit einem Scherenschlage quer durchtrennt. Die Hautwunde wird durch Naht verschlossen.

Die Hautschnitte werden an typischen Stellen, in bestimmter Richtung derart angelegt, dass sie es ermöglichen, auf kürzestem Wege zur Arterie zu gelangen. Meist trifft es zu, dass der Hautschnitt dem Verlaufe der Arterie gleich gerichtet ist; so fällt an den Extremitäten — geringe Abweichungen abgesehen — der Hautschnitt mit der Längsrichtung dieser zusammen.

Um den Hautschnitt an richtiger Stelle anzulegen, bedarf es der genauen Orientierung an der Körperoberfläche; wir benützen da vor allem prominente, leicht tastbare Punkte des Skelettes, sowie Wülste der Muskeln und Furchen zwischen diesen.

Die Länge des Hautschnittes richtet sich nach der Tiefe, in welche eingedrungen werden soll; je tiefer die Wunde, um so grösser die Pforte in der Haut. Der Schnitt zur Blosslegung der Arteria iliaca interna misst etwa 15—20 cm, während man an die Arteria radialis über dem Handgelenke, mit einem Schnitt von 1—1,5 cm bequem herankommt.

Ist die Haut und das Unterhautzellgewebe passiert (der Grund der Wunde wird bei Bewegungen der Hautränder nicht mehr mitbewegt), so wird vorsichtig bis an die Gefässscheide vorgedrungen; man präpariert entweder aus freier Hand, zwischen zwei Pinzetten oder auf der Hohlsonde. Muskel, Nerven, Venen, die den Weg versperren, werden mit stumpfen Haken abgezogen; ist ein Gefäss durch seine Lage ein Hindernis für

das Vordringen im Gewebe, so kann es doppelt ligiert und zwischen den Ligaturen durchtrennt werden.

Die Gefässscheide wird, je nachdem sie lockerer oder derber gefügt ist, stumpf, mittelst anatomischer Pinzetten, von der Arterie in kurzer Ausdehnung abgelöst oder auf der Hohlsonde gespalten.

Nach Eröffnung der Scheide liegt nun entweder ein einziges Gefäss bloss, oder aber man übersieht gleichzeitig Arterie und Vene. Die richtigste Orientierung geben da bloss die topographisch-anatomischen Verhältnisse; man muss die Arterie aus ihrem Situs als solche diagnostizieren, da alle sonstigen Merkmale unter Umständen hinfällig sein können. Die Färbung der Gefässwand ist ebenso wenig entscheidend wie die Dicke derselben, da an der Leiche die Arterien- und Venenwände durch Imbibition völlig gleiche Färbung zeigen können; auch ist die Wanddicke grossen individuellen Schwankungen unterworfen; für gewöhnlich sind die Arterien dickwandiger als die Venen, doch finden wir nicht selten bei schwächlichen, namentlich weiblichen Individuen ausserordentlich zarte Arterien mit dünnen Wänden.

Man sollte meinen, dass am Lebenden die Pulsation des Gefässes ein untrügliches Zeichen zur Erkennung der Arterien sein müsse, dem ist aber nicht immer so, da Arterien beispielsweise nach starken Blutverlusten keine Pulsation zu zeigen brauchen und anderseits Venen durch mitgeteilte Bewegung das Gefühl der Pulsation vortäuschen können.

Die anatomischen Verhältnisse sind es also, die allein zur Entscheidung berufen sind, ein Gebilde als Arterie oder Vene anzusprechen.

Ist die Gefäßscheide eröffnet und die Arterie sichtbar, so muss diese zur Anlegung der Ligatur in der Ausdehnung von 1—1,5 cm mit 2 Pinzetten isoliert und aus ihrem Bette gehoben werden; zu diesem Zwecke fasst man mit der Linken die eine




Fig. 54.

Zwischen zwei Ligaturen durchtrennte Arterie.

Lefze der eröffneten Gefäßscheide, zieht diese etwas an und streift das mit den Branschen der anderen Pinzette erfasste lockere Gewebe von der Arterie in der Längsrichtung von dieser ab.

Man wechselt die fixierende und präparierende Hand, wobei das Fassen der Arterie, irgend einer

Vene oder eines Nerven mit der Pinzette zu vermeiden ist.

Von der Venenseite her wird das mit einem Faden armierte Ligaturinstrument unter die Arterie geführt, der Faden um die Arterie geschlungen und geknüpft. Eine zweite Ligatur wird in der Entfernung von etwa 1 cm angelegt und die angeseilte, erhobene Arterie mit einem Scherenschlage zwischen den Ligaturen quer durchtrennt. Die Stümpfe der Arterie weichen nach beiden Seiten etwas zurück (Fig. 54).




Fig. 55.  
Schifferknoten.




Fig. 56.  
Weiberknoten.




Fig. 57.  
Chirurgischer Knoten.

Die Retraktion und Entspannung der Ligaturstümpfe schafft durch Verengerung des Gefäßlumens für die Thrombenbildung günstigere Verhältnisse als die einfache Abschnürung des Gefäßes; ausserdem gewinnen wir bei der Durchtrennung zwischen den Ligaturen einen Ueberblick über die hintere Arterienwand und werden es so vermeiden können, die Ligatur etwa



knapp vor oder nach Abgang eines Seitenastes anzulegen. Beides ist für die Thrombenbildung gleich ungünstig.

Die kleine Wunde wird nun durch Knopfnähte geschlossen.

Die Schürzung des Knotens betreffend ist folgendes zu merken. Der Faden sei um die Arterie gelegt; um richtig vorzugehen, fasse man erst beide Schenkel der Ligatur parallel, die rechte und linke Hälfte in die entsprechende Hand. Ehe man knüpft, kreuzt man die Fäden derart, dass der in der rechten Hand befindliche Schenkel des Fadens unter dem linken Faden in die linke Hand gelegt wird und umgekehrt. Sind die Fäden auf diese Weise gekreuzt, so wird ein einfacher Knoten geschürzt. Ehe der zweite Knoten auf den ersten gesetzt wird, müssen die Fäden abermals gewechselt werden, und zwar derart, dass der in der Linken befindliche Faden nun über den rechten zu liegen kommt; der auf diese Art zu stande gekommene Schifferknoten hält sicherer als der Weiberknoten (Fig. 55 u. 56).

Wird bei der ersten Etage der Knoten nicht einmal, sondern zweimal geschlungen, so haben wir den sogen. chirurgischen Knoten vor uns (Fig. 57).

Des Schifferknotens bedienen wir uns nicht bloss bei Anlegung von Ligaturen, sondern überall, wo es sich um die Schürzung eines sicher schliessenden Knotens handelt.

### **Unterbindungen an den oberen Extremitäten.**

Die den Ober-, Unterarm und die Hand versorgende Arterie kann in der Achselhöhle, am Oberarme, in der Ellenbogenbeuge und am Vorderarme in typischer Weise zum Zwecke der Unterbindung blossgelegt werden.

Die *Arteria brachialis*, die Fortsetzung der *Arteria subclavia*, wird vom unteren Rande der ersten Rippe bis an das *Collum chirurgicum humeri* als *Art. axillaris* bezeichnet. Sie liegt bei abduziertem Oberarme dem Knochen innig an; mit ihrer lateralen Wand ist das Gefäß unterhalb des *Musculus pectoralis minor* dem *M. coraco brachialis* angelagert. Vom *Plexus brachialis* liegt bloss der *Mediannerv* vor der Arterie, die *Vena axillaris* ist medianwärts und in oberflächlicherer Schicht gelegen.

### Unterbindung der *Arteria axillaris*.

Der Körper befindet sich in Rückenlage. Der Arm ist abduziert und wird in rechtem Winkel zum Stamme derart gehalten, dass der gestreckte Vorderarm eine Mittelstellung zwischen Pro- und Supination einnimmt. Der Operateur ist zwischen Thorax und dem abduzierten Arme postiert, der Assistent zur Linken des Operators. Die Achselhöhle präsentiert sich dem Beschauer, mit ihren Begrenzungen, der vorderen (Rand des *M. pectoralis major*) und hinteren Achselfalte (Rand des *M. latissimus dorsi* und *teres major*), zwischen welchen die Haut in Abduktion des Armes zur Achselgrube einsinkt. In dieser ist als Prominenz der Humeruskopf sichtbar und palpabel. Am Oberarme, dessen Innenseite dem Operateur zugewandt ist, ist zwischen den Wülsten des *M. biceps* und *triceps*, der parallel dem Arme verlaufende *Sulcus bicipitalis internus*, das Hauptbett der Gefässe und Nerven des Oberarmes, sichtbar. Diese Furche (*Sulcus bicip. int.*) reicht nicht ganz an die vordere Achselfalte heran, indem der Bauch des *Biceps* sich hier verjüngt, um in die Sehne überzugehen. Der Rand des *M. pectoralis major* bil-

det hier mit dem oberen Ende des Biceps zwei Schenkel eines Dreiecks, dessen Basis vom Musculus coraco-brachialis dargestellt wird (Fig. 58). Dieses durch die Wülste dreier Muskel dargestellte Dreieck ist die Stelle, an welcher wir die Arterie blosslegen.



Fig. 58.

Achselhöhle. Schnitte zur Blosslegung der Art. axillaris und Art. brachialis.

Es wäre verfehlt, das Gefäss in der Achselgrube suchen zu wollen. Geht man in diese ein, so kommt man durch einen Raum, der mit Fett, Zellstoff und Lymphdrüsen erfüllt ist, an die laterale Thoraxwand.

Das Gefäss, welches innig dem Humerus anliegt, ist also an diesem, entsprechend dem Dache der Achselhöhle, zu suchen.

Der Schnitt wird, entsprechend dem M. coraco-brachialis, in der Fortsetzung des Sulcus bicipitalis internus angelegt (Fig. 58). Ist das Unterhautzellgewebe passiert, so liegt die

**Tab. 1. Blosslegung der Art. axillaris und  
Art. brachialis. (Rechter Arm.)**

*Mcb.* Musc. coraco-brachialis. *F.* Innenseite der Oberarm-Fascie. *M.* Nerv. medianus. *Ci.* Nerv. cutan. i. min. *Ca.* Nerv. cut. int. maj. *Ax.* Art. axillaris.

---

*B.* Musc. biceps. *Fb.* Fascia brachii.  
*M.* Nerv. medianus. *A.* Arterie.  
*Vb.* Vena brachialis.

---

dünne Faszie des Oberarmes, durch welche wir die Fasern des *M. coraco-brachialis* durchschimmern sehen, bloss. Die Faszie wird auf der Hohlsonde gespalten und die untere Wundlefe der Haut und Faszie mit Haken abgezogen; es erscheint, in lockeres Zellgewebe gebettet, der *Nervus medianus*, der mit einem einfachen stumpfen Haken nach oben gezogen wird; ist dies geschehen, so liegt die Arterie bloss und kann mit Leichtigkeit isoliert und unterbunden werden (Tab. 1).


Man hat darauf zu achten, dass der Nerv für sich allein gefasst und abgezogen werde, da im anderen Falle die knapp hinter demselben liegende Arterie mit dem Nerven disloziert und aus dem Gesichtsfeld entfernt wird.

Ein Nerv, der bisweilen nach Spaltung der Fascie des *Coraco-brachialis* sich präsentiert, ist der *N. cutaneus int. m.*; dieser dünnere Faden wird mit dem *N. medianus*, der nach weiterem Abziehen des unteren Wundrandes erscheint, nicht zu verwechseln sein.

Die Arterie ist von einer oder mehreren, oft von einem ganzen Plexus von Venen begleitet.

**Unterbindung der Arteria brachialis.**

Vom Collum chirurgicum humeri bis zur Teilung in der Ellenbogenbeuge ist die Fortsetzung der *Art. axillaris* als *A. brachialis* be-





nannt. Die Arterie ist im Sulcus bicipitalis internus gelagert; sie ist von Venen oft in Form eines Geflechtes begleitet; der Nervus medianus liegt in der oberen Hälfte über der Arterie, die er bedeckt, im weiteren Verlaufe aber ist er ulnarwärts von der Arterie verlagert. Die Vena basilica, ebenfalls im Sulcus bicipitalis int., ist durch die Faszie von dem Bündel der grossen Gefässe und Nerven geschieden. Die Gefässscheide ist locker gewebt.

Position wie zur Unterbindung der Art. axillaris. Der Schnitt wird entsprechend der Mitte des Oberarmes etwas über den Sulcus bicipitalis internus, der Richtung dieses entsprechend, angelegt (Fig. 58). Man durchtrennt die Haut, das Unterhautzellgewebe und spaltet in derselben Richtung und Ausdehnung die Faszie des M. biceps. Die Fasern dieses Muskels müssen klar, entblösst zu Tage liegen. Nun wird die untere Wundlücke der Faszie mit dem scharfen Haken nach abwärts verzogen und auf diese Weise der Mediannerv blossgelegt. Derselbe wird aus seinem Bette gehoben, stumpf abgezogen, worauf die dahinter gelegene, von Venen begleitete Arteria brachialis zum Vorschein kommt und mit zwei Pinzetten zur Anlegung der Ligatur isoliert wird (Tab. 1).

Die Regel, etwas über dem Sulcus bicipitalis einzuschneiden, um von da aus absteigend den Mediannerv zu erreichen, ist aus dem Grunde zu empfehlen, weil man beim Schnitte, der direkt auf die Gefässe und Nerven dringt, sich zwischen den verschiedenen Gebilden, N. cutaneus int. maj., N. medianus, Vena basilica, den nicht typisch vorgezeichneten Weg zur Arterie nur mit Schwierigkeiten bahnen muss; fällt der Schnitt unterhalb des Sulcus bicipitalis, so kann der Unerfahrene irren, indem er, den blossgelegten Nervus ulnaris verkennend,

vergebens hinter diesem an die Arterie zu gelangen sucht. Die Beziehung des *N. medianus* zur Arterie ist in gewissen Grenzen variabel; in seltenen Fällen liegt die Arterie vor dem Nerven.

Bei hohem Abgange der *Art. radialis* und *ulnaris* ist das eine der beiden Gefässe vor, das andere hinter dem Nerven gelegen; ein auffallend kleines, im Missverhältnis zum sonstigen Körperbau stehendes Kaliber der hinter dem Mediannerven sichtbaren Arterie legt es nahe, an hohe Teilung der *Art. brachialis* zu denken.

### Unterbindung der *Arteria cubitalis*.

In der Ellenbeuge ist die Fortsetzung der *Art. brachialis*, hier *cubitalis* genannt, im *Sulcus cubitalis int.* gelagert und von der Aponeurose des *M. biceps* gedeckt, in die Furche zwischen *Pronator teres* und *Musc. biceps* eingelagert. Die Arterie ist hier von zwei symmetrisch an das Gefäss gelagerten Venen begleitet. Der *Nervus medianus* steht hier nicht mehr in jener innigen Beziehung zur Arterie wie am Oberarme. Der Nerv ist ulnarwärts von der Arterie verlagert; durch die Faszie und den *Lacertus fibrosus* getrennt, findet sich, subkutan gelagert, das kubitale Venennetz (*mediana-basilica*, *mediana-cephalica*), welches im Bereiche der Ellenbeuge Kommunikationen mit den die Arterie begleitenden Venen eingeht.

Die einfache Modellierung des Oberarmes (Muskelwulst des *Biceps* und *Triceps*, *Sulcus bicipitalis int.* und *ext.*) ist in der Ellenbogenbeuge durch die noch am Oberarme entspringenden zwei grossen Gruppen der Vorderarmmuskeln etwas komplizierter gestaltet. Der spindelförmig sich verjüngende Bauch des *Musc. biceps* ist rechts und links durch je eine Furche von den Muskel-



wülsten der Strecker und Beuger des Vorderarms, die hier ihren Ursprung haben, verschieden. Es resultiert eine Y-Form; die beiden Schenkel, gewissermassen die Ausläufer der Sulci bicipitales des Oberarmes, werden als Sulcus cubitalis internus und externus bezeichnet. Die innere Ellenbogenfurche wird von dem M. biceps, resp. M. brachialis internus und pronator teres begrenzt, die äussere Furche vom M. biceps und Supinator longus; der Sulcus cubitalis internus ist von der in die Vorderarmfaszie ausstrahlenden Aponeurose des Biceps überbrückt. (Fig. 59.)

Zur Unterbindung wird der Vorderarm im Ellbogengelenke gestreckt, in maximaler Supination gehalten.

Durch Tasten sucht man sich über die Richtung und Lage des Sulcus cubitalis internus zu orientieren.




Fig. 59.

Gruppierung der Muskulatur an der oberen Extremität.

Sbi, Sulcus bicipitalis int.  
Sbe, Sulcus bicipit. ext.  
Sci, Sulcus cubitalis int.  
Sr, Sulcus radialis.  
Su, Sulcus ulnaris.

Der Schnitt verläuft, in der Fortsetzung des *Sulcus bicipitalis internus*, von innen oben nach aussen unten, entsprechend der Richtung des *Sulcus cubitalis int.* (Fig. 60).



Fig. 60.

Schnitte zur Blosslegung der *Art. cubitalis* und *Arteriaie radialis* und *ulnaris*.

Nach Durchtrennung der Haut ist auf das Venennetz der Ellenbeuge Rücksicht zu nehmen; wenn möglich, wird der Weg durch Abziehen der Venen mit stumpfen Wundhaken freige-macht.

In der Wunde erscheint die glänzende Aponeurose des *M. biceps*; dieselbe wird in der Richtung des Hautschnittes auf der Hohlsonde gespalten. Knapp unter der Aponeurose liegt die Arterie, von zwei Venen begleitet, in lockerem Zellgewebe bloss. Der *N. medianus* ist ulnarwärts von der Arterie zu finden (Tab. 2). Bei hoher Teilung der *Brachialis* kann einer der beiden Stämme auf den *Lacertus fibrosus* zu liegen kommen. An diese Eventualität ist zu denken, wenn an den Venen der Ellenbeuge der Aderlass vorgenommen werden soll, oder wenn hier eine der Medianvenen zum Zwecke einer Infusion von Kochsalz oder Blut-transfusion blossgelegt und eröffnet wird.

An den in gefülltem Zustande in der Ellenbeuge sichtbaren Venen wird der Aderlass, sowie die intravenöse Einverleibung von Flüssigkeiten vorgenommen. Der Ader-

lass hat die Entnahme von venösem Blute zur Aufgabe, wir machen gegenwärtig seltener die Phlebotomie, die Eröffnung der Vene durch ein spitzes Messer, als die Phlebopunktion, d. i. die Ableitung des Blutes durch eine in die Vene perkutan eingestossene spitze Hohnadel. Zur Ausführung jeder der beiden Operationen wird um den Oberarm ein Tuch geschlungen und derart geknüpft, dann der venöse Rückfluss aus dem Vorderarm gehemmt wird, ohne dass der Radialpuls aufgehoben würde. Bei gestrecktem Arme sieht man nun die subkutanen Venen als prall gefüllte Stränge unter der Haut. Man wählt zum Einstich die Vena mediana basilica. Bei Verwendung des Messers strömt das Blut im Bogen aus der Wunde. Die Hohnadel wird in zentripetaler Richtung eingestochen, eine Aspiration ist nicht nötig; liegt die Nadel richtig, so strömt das Blut im matten Strahle durch dieselbe. Nach Entfernung der Binde wird ein leicht komprimierender Verband angelegt.

Auch zur Bluttransfusion oder venösen Infusion von Kochsalzlösung wird die Vena mediana basilica benützt. Mit einem zur Unterbindung der Arteria cubitalis analogen Schnitt wird die subkutan gelegene Vene in der Ausdehnung von mehreren Zentimetern blossgelegt und stumpf isoliert. Mittelst anatomischer Pinzette wird das Gefässchen gefasst und, ohne völlig durchtrennt zu werden, mit der Schere geschlitzt. Die Vene ist peripher von dieser Stelle durch eine Ligatur zu verschliessen. Durch die so gemachte Oeffnung wird die Kanüle in zentripetaler Richtung in die Vene eingeführt und fixiert. Zur Infusion wird am zweckmässigsten der pag. 21 abgebildete Apparat benützt, dessen Schlauch mit der zur Einführung in die Vene bestimmten Kanüle armiert ist. Man lässt 0,5—1,5 Liter Flüssig-

**Tab. 2. Blosslegung der Art. cubitalis.  
(Rechter Arm.)**

**L.** Aponeurose des *M. biceps*. **A.** Arteria cub. von Venen begleitet. **M.** Nervus medianus. **V.** Cubitale Venen.

**Blosslegung der Art. radialis und ulnaris.**

**Ar.** Art. radialis, **Au.** Art. ulnaris an der Innenseite der Sehne des *Musc. ulnaris int.* (**U.**)

---



**Fig. 61.**

**Phlebotomie in der Ellenbeuge.**

**Eröffnung der Vena mediana basilica durch Einstich mit dem spitzen Messer.**





keit unter geringem Drucke langsam in die Vene einströmen. Zur Infusion dienen sterilisierte physiologische Kochsalzlösung oder defibriniertes Menschenblut. Nach vollendeter Infusion wird die Vene zentralwärts von der eröffneten Stelle ligiert und die kleine Wunde durch die Naht geschlossen.

### **Unterbindung der Art. radialis und ulnaris.**

Am Vorderarme ist die Muskulatur volarwärts in drei Gruppen zu sondern; die Hauptmasse derselben wird von den Beugern der Finger dargestellt, die mit einem gemeinschaftlichen Kopfe von der Innenseite des unteren Endes vom Humerus entspringen. Ulnarwärts ist der Vorderarm durch den *Flexor carpi ulnaris*, radialwärts durch den *M. supinator longus* begrenzt. Zwischen den Sehnen dieser Muskel und der Masse der Fingerbeuger kommt auf diese Weise im unteren Drittel des Vorderarmes je eine Längsrinne zu stande, welche von den beiden Hauptarterien des Vorderarmes als Bahn benützt werden (Fig. 59).

Die *Arteria radialis* entspricht in ihrem Verlaufe der Richtung des Radius. Im oberen Drittel des Vorderarmes ist die Arterie, dem *Musc. supinator longus* angelagert, tiefer gelegen. Im unteren Drittel liegt sie oberflächlich in der Furche zwischen den Sehnen der Flexoren und der des *Supinator longus*; knapp oberhalb des Handgelenkes ist die Arterie, mit den begleitenden zwei Venen, dem unteren Radiusende aufliegend, nur von Haut und der dünnen Faszie bedeckt.

Die *Arteria ulnaris* kreuzt nach ihrem Abgange aus der *Brachialis* den gemeinschaftlichen Kopf der Flexoren, unter dem sie verläuft, und kommt an die Sehne des *Flexor carpi*

ulnaris, an dessen Innenseite sie bis ans Handgelenk gelangt.

Die typische Unterbindungsstelle für beide Arterien ist knapp oberhalb des Handgelenkes. Der Vorderarm ist maximal supiniert. Die Hand in leichter Dorsalflexion. Zur Blosslegung der Art. radialis wird oberhalb des Handgelenkes entsprechend der Furche zwischen der Sehne des M. supinator l. und der Flexoren eingeschnitten (Fig. 60). Man durchtrennt die Haut, worauf die, von der zarten, durchscheinenden Faszie bedeckte Arterie, zwischen 2 Venen gelagert, sichtbar wird. Nach Spaltung der Faszie kann die Arterie isoliert und ligiert werden (Tab. 2).

Art. ulnaris. Kurzer Schnitt im Sulcus ulnaris, knapp oberhalb des Handgelenks, radialwärts von der leicht palpablen Sehne des M. ulnaris internus. Der radiale Rand dieser Sehne wird blossgelegt und mit einem spitzen Häkchen abgezogen, das tiefe Blatt der Faszie, welche die Flexoren einschliesst, wird sichtbar und auf der Hohlsonde gespalten, worauf die Arterie, von zwei Venen begleitet, blossliegt; an die Arterie gelagert, sehen wir ulnarwärts den Nerv. ulnaris.

Die Radialarterie ist in ihrem weiteren Verlaufe am Handrücken zwischen den Sehnen des M. abductor pollicis longus und M. extensor pollicis brevis, in der sogenannten Tabatière bequem zugänglich.

In der Hohlhand kann der Arcus volaris sublimis der Art. ulnaris nach Spaltung der derben Aponeurosis palmarig blossgelegt werden. Der Hautschnitt in der Hohlhand zieht von der Mitte der Handwurzel gegen die Basis des vierten Fingers.



## Unterbindungen an den unteren Extremitäten.

Die Muskulatur am Oberschenkel ist derart gruppiert, dass zwischen den Extensoren und Beugern, die symmetrisch an der Vorder- und Rückseite des Femur angeordnet sind, an der medialen Seite, vom Becken her, eine Muskelgruppe, die Adduktoren, an die Innenfläche des Femur heranzieht und hier den Quadriceps von den Flexoren trennt.

Die auf diese Weise zwischen Extensoren und den Adduktoren gebildete Furche (Fig. 62) dient den vom Beckenrand herabziehenden Gefäßen als Bahn und entspricht ihrer Richtung nach dem Verlaufe der Gefäße.

Der *M. sartorius* überbrückt diese Rinne (Fig. 63) und wird uns demnach bei Auffindung der Gefäße als wichtiger Orientierungspunkt dienen.

Die *Arteria femoralis*, die Fortsetzung der *A. iliaca externa*, tritt unter dem Poupart'schen Bande, durch die *Lacuna vasorum* aus dem Becken in die *Fovea subinguinalis*. Sie kreuzt das Poupart'sche Band in einem Punkte, der der Mitte einer von der *Symphysis ossium pubis* zur *Spina ilei ant. sup.* gezogenen Linie entspricht. Die *Vena femoralis* ist medialwärts von der Arterie gelagert und benützt dieselbe Pforte, um vom Schenkel ins Becken zu gelangen. Die Arterie verläuft in der Richtung der erwähnten Muskelfurche.

Vom mittleren Dritteile des Oberschenkels an liegt der *M. sartorius* über der Arterie, die hier von den straffen Zügen des tiefen Blattes der *Fascia lata* bedeckt erscheint. Um in die Kniekehle zu gelangen, passiert die Arterie den sogen. Adduktorenschlitz. Dieser Kanal (Hunter) ist zwischen *M. adductor magnus*

und *M. vastus internus* gelegen und wird durch fibröse Streifen, die zwischen den beiden Muskeln ausgespannt sind, überbrückt. Die Arterie passiert mit der sie begleitenden Vene diesen Kanal, hierauf eine Lücke in der Adduktorensehne und kommt dadurch an die hintere Fläche des Femur, in die Kniekehle zu liegen.




Fig. 62.

Gruppierung  
der Muskulatur am  
Oberschenkel.

A. Gruppe der Adduktoren.  
Q. Quadriceps femoris.

Die *Vena femoralis* liegt in der *Fovea subinguinalis* medialwärts von der Arterie; im weiteren Verlaufe kreuzen sich die Gefäße derart, dass die Vene unter die Arterie zu liegen kommt. Schon in der Mitte des Oberschenkels ist dieser Situs vorhanden; in derselben Weise passieren die Gefäße den *Hunter'schen Kanal*. Dringt man demnach von der Haut der Kniekehle an die Gefäße vor, so wird man folgerichtig erst auf die Vene stossen, unter welcher die Arterie, der Vene knapp anliegend, gefunden wird.

Man unterbindet die *Arteria femoralis*:

1. in der *Fovea subinguinalis*, knapp unter dem *Poupart'schen Bande*.

2. in ihrem Verlaufe hinter dem Musculus sartorius, an der Grenze zwischen mittlerem und oberem Drittel des Oberschenkels,
3. im Hunter'schen Kanale.

### 1. Unterbindung der Art. femoralis unter dem Poupart'schen Bande.

Hautschnitt parallel der Achse des Oberschenkels vom Poupart'schen Bande 5—8 cm nach abwärts. Das obere Ende des Schnittes entspricht dem Halbierungspunkte einer von der Symphyse zur Spina ant. sup. gezogenen Geraden. (Figur 64a.)

Nach Durchtrennung der Haut und des Fettgewebes wird vorsichtig präparierend senkrecht in die Tiefe vorgedrungen, bis in der Wunde die durch ihre fibröse Struktur und weissliche Färbung kenntliche Gefässscheide vorliegt.

Dieselbe wird auf der Hohlsonde gespalten und die Arterie mit zwei Pinzetten auf kurzer Strecke isoliert, aus ihrem Bette gehoben.

An der Medialseite des Gefässes kann die Vena femoralis sichtbar gemacht werden: das Bündel des Nervus cruralis ist von den Gefässen gesondert, lateralwärts, vom tiefen Blatte der Fascia lata gedeckt, zu finden.




Fig. 63.  
Verlaufsrichtung  
des Musc. Sartorius. (S)

## 2. Unterbindung der Arteria femoralis an der Grenze zwischen mittlerem und oberem Drittel des Oberschenkels.



Fig. 64  
Hautschnitte  
zur Unterbindung der  
Art. femoralis.  
a) unter dem Poupart'schen  
Bande, b) unter d. Sartorius,  
c) im Adduktorenschlitz.

Durch Einwärtsrotation des Oberschenkels kann man sich an der Innenseite des Femur die dem Verlaufe des M. sartorius entsprechende, von aussen oben nach innen unten ziehende  
*a* Furche sichtbar machen.

Der Hautschnitt wird an der Grenze zwischen mittlerem und oberem Drittel des Femur, entsprechend dieser Rinne am Innenrande des M. sartorius angelegt (Fig. 64b). Hat man das Unterhautzellgewebe passiert, so wird die zarte Faszie des Oberschenkels sichtbar, die in der Richtung des Hautschnittes gespalten werden soll.  
*b*  
*c*

Bei richtiger Anlegung des Schnittes liegt nach Spaltung der Faszie der M. sartorius, kenntlich an seiner dem Hautschnitte parallelen Faserrichtung, bloss.

Ziehen die Fasern des blossgelegten Muskels von innen oben nach aussen unten, oder umgekehrt,

so ist der Schnitt zu weit medial oder lateral angelegt, und wir haben die Fasern des *M. adductor magn.*, resp. des *M. vastus int.* vor uns. Der mediale Rand des *M. sartorius* wird, mit dem Messer präparierend, blossgelegt, der Muskel von seiner Unterlage abgehoben und lateralwärts verzogen, worauf das tiefe Blatt der *Fascia lata*, straff über die Gefäße gespannt, sichtbar wird. Nach Spaltung der Faszie auf der Hohlsonde wird die Arterie, die hier bereits auf der Vene gelagert ist, stumpf isoliert und unterbunden (Tab. 3).

### **3. Unterbindung der Arteria femoralis im Adduktorenschlitz.**

Das Bein im Knie und Hüftgelenke gebeugt und im letzteren leicht abduziert und auswärts rotiert.

Schnitt an der Grenze zwischen mittlerem und unterem Drittel des Oberschenkels entsprechend dem lateralen Rande des *M. sartorius* (Fig. 57). Es wird in das Interstitium zwischen *M. vastus int.* und *M. sartorius* vorgedrungen, bis die silberglänzenden fibrösen Streifen, die zwischen *M. adductor magn.* und *M. vastus int.* ausgespannt sind, klar vorliegen; diese Fasern, welche das Dach des Adduktorenkanals darstellen, werden gespalten, worauf zu oberst die Arterie sichtbar wird.

Die Vene befindet sich unterhalb der Arterie und ist mit dieser durch Bindegewebe innig verbunden (Tab. 4).

### Tab. 3. Blosslegung der Art. femoralis.

Unter dem Poupart'schen Bande sieht man in der eröffneten Gefäßscheide medialwärts die Vene, lateralwärts die Art. femoralis. In der Mitte des Oberschenkels ist der Sartorius (S) lateralwärts verzogen, das tiefe Blatt der Fascie (f) ist gespalten. Man sieht die Arterie, unter welcher die Vene gelegen ist.




Fig. 65.

Muskulatur der Kniekehle und des Unterschenkels (Rückseite)

S. Semimembranosus.

B. Biceps femoris.


T. T. Köpfe d. Gastrocnemius.

Unterbindung der Vena saphena magna: von Trendelenburg zur Behandlung von Varizen an den unteren Extremitäten empfohlen. Der Hautschnitt wird an der Grenze zwischen mittlerem und oberem Drittel des Oberschenkels an dessen Innenseite etwa 3 cm lang angelegt. Um die isolierte Vene wird ein Katgutfaden geschlungen, das Bein erhoben, um das Blut abfließen zu lassen. Die Vene wird doppelt ligiert und zwischen den Ligaturen durchtrennt. Die kleine Hautwunde durch Naht geschlossen.

### Unterbindung der Arteria poplitea.

Die Kniekehle wird nach oben vom M. biceps femoris und semimembranosus, nach unten zu von den beiden Köpfen des M. gastrocnemius begrenzt. (Fig. 65.)

In der Tiefe der Kniekehle verlaufen, der Längsachse der rautenförmig begrenzten Grube entsprechend, die Arteria und Vena poplitea derart,







dass die zu tiefst gelegene Arterie der Kapsel des Kniegelenkes fast angelagert erscheint.

Die Fortsetzung des N. ischiadicus liegt über den Gefässen knapp unter der oberflächlichen Faszie.

Zur Unterbindung der Arteria poplitea wird der Kranke in Bauchlage gebracht. Längsschnitt in der Kniekehle der Mittellinie entsprechend (Fig. 66); nach Durchtrennung der Haut und der Faszie gelangt man alsbald an den oberflächlich gelagerten Nervus tibialis. Dieser dient uns als Wegweiser zu den Gefässen; wir finden diese, wenn wir neben dem genannten Nerven im Fettgewebe der Kniekehle direkt in die Tiefe vordringen. Die Vene liegt über der Arterie, mit welcher sie durch Zellstoff innig verbunden ist.



Fig. 66.  
Hautschnitt zur Unterbindung  
der Art. poplitea.

Ein anderer Weg, um an die Gefässe der Kniekehle zu gelangen, führt von der Medialseite des untersten Endes des Oberschenkels, hinter der Sehne der Adduktoren, zwischen dieser und den Sehnen des Gracilis, Sartorius in die Kniekehle. Das Bein ist im Kniegelenke gebeugt, in der Hüfte

und den Sehnen des Gracilis, Sartorius in die Kniekehle. Das Bein ist im Kniegelenke gebeugt, in der Hüfte

**Tab. 4. Blosslegung der Art. femoralis im Adduktorenschlitz.**

**Vi. Musc. vastus int. S. Sartorius.** Die fibröse Decke des Hunter'schen Kanals (f, f) ist gespalten, wodurch Art. und Vena femoralis blossgelegt erscheinen.

---


abduziert und auswärts rotiert; man tastet an der Medialseite oberhalb des inneren Kondyls die Adduktorenhaut, hinter welcher die Haut in einer seichten Grube einsinkt. Hier wird, entsprechend der Längsachse des Oberschenkels eingeschnitten. Nach Trennung der Faszie kann die Adduktorenhaut stumpf von den M. M. sartorius und gracilis getrennt werden; in dem nun blossliegenden Fette der Kniekehle geht der Operateur seitlich ein und findet dem Planum popliteum femoris entsprechend, das Bündel der Gefässe.

**Unterbindung der Art. tibialis antica und postica.**

Die Muskulatur ist am Unterschenkel derart angeordnet, dass auf das Ligamentum interosseum an der Vorderseite die Strecker, an der Rückseite die Beuger zu liegen kommen. Die Beuger sind von der Gruppe der Wadenmuskeln bedeckt. Um das Wadenbein sind die M. M. peronei angeordnet.

An der Vorderseite ziehen die Gefässe, dem Lig. interosseum direkt aufliegend, zwischen den Muskeln, gegen den Fussrücken zu. An der Rückseite ist es der Raum zwischen der Wadenmuskulatur und den Flexoren, welcher den Gefässen und Nerven als Bahn dient.

Die Arteria poplitea teilt sich, am unteren Rande des M. popliteus angelangt, in den Truncus tibio-peroneus und in die Art. tibialis antica. Die Art. tibialis postica und Art. peronea, die Aeste des genannten





Truncus, verlaufen zwischen oberflächlicher und tiefer Schicht der Muskulatur an der Beugeseite des Unterschenkels, durch ein Faszienblatt von der Wadenmuskulatur geschieden, nach abwärts.

Die *Art. tibialis postica*, näher dem Schienbeine verlaufend, kommt hinter dem Malleolus internus zu liegen, wo sie entsprechend dem Ursprunge des *M. abductor hallucis* in die *Arteria plantares* sich teilt. Die *Arteria peronea* zieht in derselben Schicht, längs des Wadenbeins gegen den äusseren Knöchel, wo sie in einigen Aesten endet.

Die *Art. tibialis antica* durchbohrt von der Beugeseite her das Ligamentum interosseum und kommt so auf die vordere Fläche des Zwischenknochenbandes unter die Muskulatur zu liegen. Das Gefäss verläuft, hier dem lateralen Rande des *M. tibialis ant.* angelagert, gegen den Fuss. Am Dorsum pedis angelangt, ist die Arterie (hier *A. pediae* genannt) an der Aussenseite der Sehne des *M. extensor hallucis l.* zu sehen; entsprechend dem Interstitium zwischen dem Metatarsus der gr. Zehe und dem Metatarsus II steigt die Arterie in die Tiefe gegen die Fusssohle ab, wo sie mit der *Art. plantaris ext.* (einem der beiden Endäste der *A. tibialis post.*) sich vereinigt.

Die *Art. tibialis antica* wird vom *Nervus peroneus profundus*, die *Art. tibialis postica* vom *Nervus tibialis posticus* begleitet.

Die *Art. tibialis antica* wird typisch in ihrem Verlaufe, entsprechend der Grenze zwischen mittlerem und unterem Drittel des Unterschenkels, und als *Dorsalis pedis* am Fussrücken unterbunden.

Die *Art. tibialis postica* wird in ihrem Verlaufe am Unterschenkel und hinter dem Malleolus internus zur Unterbindung blossgelegt.

## Tab. 5. Blosslegung der Art. poplitea.

Linkes Bein, Beugeseite.


S. Semimembranosus, B. Biceps femoris, T. Triceps surae,  
I. Aeste des N. Ischiadicus, A. Arteria, V. Vena poplitea.

Fig. 67.

Muskulatur des Unterschenkels (Vorderseite).

## Tibialis antica.

Schnitt an der Vorderseite des Unterschenkels entsprechend der Grenze zwischen mittlerem und unterem Drittel, einen Querfinger lateralwärts der Tibiakante (Fig. 68a). Durchtrennung der straffen und derben Faszie, entsprechend der Länge des Hautschnittes. Lateralwärts von der Sehne des M. tibialis anticus wird zwischen diesem und dem angrenzenden Musc. extensor hallucis longus bis auf das Lig. interosseum vorge-  
drungen. Ehe man an die Gefässe gelangt, erscheint der Nerv. peroneus profundus; unter diesem liegt die Arterie, von einem Geflechte von Venen umgeben (Tab. 6, I). Zur Isolierung ist es zweckmässig, dass die Muskeln, Tibialis ant. und Extensor hallucis, kräftig mit scharfen Haken abgezogen werden.


T. a. Tibialis anticus.

E. d. Extensor digitorum.

E. h. Extensor hallucis.

Um mit Leichtigkeit an die Arterie zu gelangen, ist es wichtig, genau dem Muskelinterstitium zu folgen, da im anderen Falle der Weg zum

Bündel der Gefässe Schwierigkeiten bereitet. Man geht an der lat. Begrenzung des M. tib. post ein.







Um die *Arteria tibialis postica* in ihrem Verlaufe am Unterschenkel blosszulegen, wird im mittleren Drittel des Unterschenkels ein Längsschnitt fingerbreit nach einwärts von der medialen Schienbeinkante angelegt (Fig. 69 a).

Es wird die Haut und Faszie durchtrennt; die an der Tibia inserierenden Fasern des *Muscul. soleus* müssen vom Knochen abgelöst sein, ehe die durch lockeren Zellstoff markierte Grenze der oberflächlichen und tiefen Gruppe der Wadenmuskeln sichtbar wird. Lässt man die Muskulatur der Wade mit Haken von der Unterlage im Bereiche der Wunde stumpf abheben, so wird alsbald unter dem Faszienblatte, welches die tiefe Muskelgruppe deckt, die vom *Nervus tibialis post.* und mehreren Venen begleitete Arterie zwischen *M. tibialis posticus* und *Flexor hallucis longus* sichtbar (Tab. 7).

Zur Unterbindung der *Art. tibialis post.* hinter dem *Malleolus internus* wird der Fuss maximal auswärts rotiert; in der Halbierungslinie zwischen Spitze des *Malleolus int.* und medialem Rande der Achillessehne wird ein den *Malleolus* umkreisender bogenförmiger Schnitt angelegt (Fig. 69 b). Liegt die fibröse Faszie bloss, so sieht man bereits die von zwei Venen begleitete Arterie. Nach Spaltung der Faszie kann




Fig. 68.

Hautschnitte

zur Unterbindung der *Art. tibialis antica* (a) und *Art. dorsalis pedis* (b).

Tab. 6. I. Blosslegung der Art. tibialis antica am linken Unterschenkel.

Die Faszie ist durchtrennt und der *Musc. tibialis ant.* (Ia.) medial- und der *M. extensor hallucis* (E. h.) lateralwärts verzogen. Im Spalte zwischen den beiden Muskeln sieht man zu oberst den *Nerv. peroneus prof.* (P. p.), unter welchem die Arterie, von Venen umgeben, sichtbar ist.

II. Blosslegung der Art. tibialis postica hinter dem inneren Knöchel.

Unter der gespaltenen Faszie (F) ist die geschlängelte Arterie, von zwei Venen begleitet, sichtbar.

die Arterie stumpf isoliert werden. Bei richtigem Vorgehen wird die Scheide der Muskeln (*tibialis post.*, *flexor hallucis l.*, *flexor digit.*) nicht eröffnet. Der *Nerv. tibialis* liegt nach aussen von den Gefässen (Tab. 6, II).

Die *Arteria dorsalis pedis* wird am Fussrücken, bei starker Plantarflexion, vor den Knöcheln unterbunden. Die Sehne des *M. extensor hallucis* ist palpabel, man schneidet an der Aussenseite der Sehne, dem Verlaufe derselben entsprechend ein, spaltet die Faszie und findet, dem Skelette dicht aufliegend, die von zwei Venen begleitete Arterie lateralwärts von der Sehne des *M. ext. hall. long.*






Fig. 69. Hautschnitte zur Unterbindung der Art. tibialis postica am Unterschenkel (a) und hinter dem Malleolus int. (b).

Tab. 6.



II

With Aust. E. Reichardt München.

I



## II. Amputationen und Enukleationen.

Die kunstgerechte Absetzung einer Extremität oder eines Teiles derselben wird, wenn sie in der Kontinuität der Knochen erfolgt, als *Amputation*, wenn sie entsprechend den Gelenkfugen vorgenommen wird, als *Enukleation* bezeichnet.

Man schneidet die Weichteile verschieden zweckentsprechend zu, damit sie nach Durchsägung oder Auslösung des Knochens, zur Bedeckung der Wundfläche sich eignen.

### Indikationen.

1. *Bildungsanomalien*, überzählige Finger, oder erworbene unkorrigierbare Formfehler (Kontrakturen, atrophische Glieder).

2. *Verletzungen*, wie Ausreissungen der Glieder, Zermalmungen der Extremitäten, Zerstörung der Haut in grossem Umfange; im allgemeinen, wenn die Wiederherstellung eines funktionsfähigen Gliedes aus dem Grade und der Art der Verletzung als ausgeschlossen erscheint.

3. *Karies der Gelenke*, der Erwachsenen, wenn konservierende Operationen nicht mehr möglich sind, oder wenn die Erkrankung des Gelenkes zu einer bestehenden Tuberkulose der Lungen oder eines anderen Organs hinzutritt.

4. *Infektionen*, phlegmonöse Entzündungen der Gewebe, Verjauchung der Gelenke, Osteomyelitis mit Epiphysenlösung und Vereiterung der Gelenke, stets wenn der Prozess nicht lokalisiert werden kann.

5. *Neoplasmen*, maligne, der Knochen und Weichteile. Selten bieten auch benigne Geschwülste, wie die Enchondrome an den Fingern,

**Tab. 7. Blosslegung der Art. tibialis post.  
am linken Unterschenkel.**

Der Soleusansatz (S.) ist von der Tibia abgetrennt. Die Muskulatur der Wade ist durch einen Haken abgezogen. Man übersieht, von einer Faszie gedeckt, auf der Gruppe der Reuger die von zwei Venen begleitete Arterie (A. t. p.) lateralwärts den Nervus tibialis posticus (N. t. p.).

die Veranlassung zur Amputation resp. Enukleation.

6. Gangrän (demarkierte) der Extremitäten.

7. Unheilbare zirkuläre Ulcera cruris und Elephantiasis.

8. Unheilbare Pseudoarthrosen.

Zur Reamputation geben Veranlassung:

1. Stumpfnuralgien, als Folge von Neuomen des Amputationsstumpfes.


2. Konische Amputationsstümpfe.

Zur Ausführung der Amputation wird der Kranke derart gelagert, dass das zu amputierende Glied bequem zugänglich ist. Die oberen Extremitäten werden in die Horizontale erhoben und durch Assistenten in dieser Lage erhalten. Bei Absetzungen an den unteren Extremitäten überragt das Bein, welches horizontal gehalten wird, den Tischrand.

Ein Assistent fasst die Extremität an ihrem peripheren Ende, ein zweiter fixiert dieselbe zentralwärts vom Orte der Abtragung.

Die provisorische Blutstillung wird für die Dauer der Operation erzielt, entweder durch digitale Kompression der Arterie, oder durch Umschnürung der Extremität mit dem elastischen Schlauch (pag. 31).

Stellung des Operators. Der rechts-







händige Operateur stellt sich derart, dass das zu amputierende Glied zu seiner Rechten abfällt.

Bei Amputationen an der rechten oberen Extremität ist diese abduziert und in die Horizontale erhoben. Der Operateur steht an der Aussenseite, das Gesicht den Füßen des Kranken zugekehrt. An der linken oberen Extremität steht der Operateur zwischen Rumpf und dem abduzierten Arme, mit dem Gesichte gegen das Haupt des Kranken. An der rechten unteren Extremität ist der Operateur an der Aussenseite derselben, an der linken zwischen die abduzierten Beine des Kranken postiert.

Der Operateur steht mit leicht vorgeschobenem rechten Fusse und stützt sich, während er schneidet, mit der Linken auf den Stumpf (Fig. 70).

### **Ausführung und Amputation.**

Die Operation umfasst die folgenden vier Akte: 1. Durchtrennung der Haut und Muskulatur; 2. Absetzung des Gliedes, Durchsägung des Knochens; 3. definitive Blutstillung durch Ligatur der Gefäße und 4. Wundversorgung.

Die Durchtrennung der Weichteile wird derart vorgenommen, dass nach erfolgter Absetzung die Vereinigung der Wunde durch die Naht ermöglicht ist, dass der Stumpf entsprechend mit Weichteilen bedeckt, und dass die Narbe, namentlich an den Amputationen im Bereiche der unteren Extremität günstig situiert sei.

Man durchtrennt die Weichteile entweder mehr oder minder quer zu der Längsachse des Gliedes (Zirkelschnitt), oder man bildet aus den Weichteilen Lappen, welche nach vollführter Absetzung aneinandergeklappt und vereinigt

werden. Eine Mittelform zwischen Zirkelschnitt und Lappenbildung ist der Raketten- resp. Ovalairschnitt.

**Zirkelschnitt.** Je nachdem die Weichteile in einer zur Längsachse queren oder geneigten Ebene durchtrennt werden, unterscheiden wir den **queren oder schiefen Zirkelschnitt**. Die Durchtrennung kann bis auf den Knochen in



Fig. 70.

Stellung zur Amputation des rechten Unterschenkels.


einem Tempo erfolgen (einzeitiger Zirkelschnitt), oder aber es wird die Haut und die Muskulatur, in verschiedener Höhe, in zwei Tempis durchschnitten (zweizeitiger Zirkelschnitt).

Die erstere Methode, die dem Celsus zugeschrieben wird, hat nur beschränkte Verwendbarkeit.

Der zweizeitige Zirkelschnitt (J. L. Petit, Cheselden) wurde ursprünglich derart geübt, dass vorerst die Haut zirkulär umschnitten wurde. Die Muskulatur wurde in einem zweiten Tempo unter Retraktion entsprechend zentralwärts durchtrennt. In dieser Form stellt der zweizeitige Schnitt nur eine Modifikation des Verfahrens von Celsus dar.

Zweckmässiger wird beim zweizeitigen Schnitt zunächst die Haut peripherwärts von jener Stelle, wo der Knochen durchsägt werden soll, zirkulär umschnitten. Das Messer wird zu diesem Zwecke mit der Basis, die Spitze dem Operateur zugewandt, angesetzt und um die untere Peripherie des Gliedes geführt (Fig. 71). Das Messer wird nun mit vom Operateur abgewandter Spitze mit der Basis abermals in den Ausgangspunkt des Schnittes eingesetzt und über die obere Begrenzung des Gliedes geführt (Fig. 72). Es resultiert auf diese Weise aus zwei einander zugekehrten Halbkreisen ein zirkulärer Hautschnitt; ist die Haut allenthalben gleichmässig bis auf die Muskelfaszie durchtrennt, so wird sie im ganzen Bereiche des Zirkelschnittes zentralwärts von der Unterlage abpräpariert, wodurch ein aus Haut und Unterhautfettgewebe bestehender Hohlzylinder — die Manschette — entsteht. Das Präparieren der Manschette geschieht derart, dass der Operateur an dem von ihm entferntesten Punkte des Zirkelschnittes von oben her mit Daumen und Zeigefinger den Wundrand ergreift und von der Unterlage abzuziehen sucht, die von der Haut zur Faszie ziehenden gespannten Fasern werden mit senkrecht gegen die Unterlage geführten Zügen des Messers durchtrennt (Fig. 73). Nun wird die benachbarte Hautpartie in derselben Weise gefasst und von ihrer Unterlage gelöst. Der Operateur umkreist so allmählich die ganze Peripherie der

Extremität. Ist der Ausgangspunkt erreicht, so wird in zweiter Tour die Ablösung der Haut fortgesetzt so lange bis die Manschette entsprechende Höhe hat und umgekrämpt werden kann; es ist wichtig, dass die Umschlagstelle der Manschette in eine zur Längsachse des Gliedes senkrechte




Amputation des Unterschenkels I.

Fig. 71. Zirkuläre Umschneidung der Haut; erstes Tempo.

Ebene zu liegen komme. Die Höhe der Manschette richtet sich nach dem Durchmesser des zu amputierenden Gliedes; im allgemeinen wird der Hautschnitt peripherwärts von der Amputationsstelle in einer Entfernung angelegt, die etwa zwei Dritteile des Durchmessers der Extremität

an der Amputationsstelle beträgt. Entsprechend der Umschlagsstelle der Manschette werden die Muskeln mit langen Zügen des Amputationsmessers durchschnitten, so dass die Schnittfläche der Muskeln eine glatte Ebene darstellt.

Man legt das Messer mit der Basis an (Fig. 74) und drückt, indem man es zu sich zieht, die Stärke der Klinge gegen die Muskelmassen; so schneidet man, indem man das Messer in horizontaler Ebene




Amputation des Unterschenkels II.

Fig. 72. Zirkuläre Umschneidung der Haut; zweites Tempo.

vom Heft zur Spitze an sich zieht, die Muskel an der Unterseite in einem Zuge durch. Man schiebt nun abermals in horizontaler Richtung, ohne die Stellung des Messers zu ändern, die Klinge bis an die Basis vor, worauf, mit der Stärke der Klinge beginnend, während die Faust erhoben wird, der Rest von Muskulatur an der unteren und der dem Operateur zugekehrten Peripherie durchschnitten wird. Dann werden

die Muskeln der Oberseite durchtrennt; zu diesem Zwecke wird das Messer von oben her mit der Basis in den Ausgangspunkt des Schnittes derart eingelegt, dass die Spitze vom Operateur abgewandt ist, und über die obere Begrenzung durch die Muskeln geführt.




**Amputation des Unterschenkels III.**

**Fig. 73. Präparieren der Manschette.**

Am Unterschenkel und Unterarm bedarf es zur Durchschneidung der Teile zwischen den beiden Knochen noch eines besonderen Kunstgriffs. Nachdem die Muskeln in der eben angegebenen Weise zirkulär durchtrennt wurden, wird ein schmales Messer in den Zwischenknochenraum eingestossen, mit der Kante senkrecht zu den Knochen gestellt, worauf in typischen, gegen beide

Knochen gerichteten Zügen die Muskeln und Bänder des Zwischenknochenraumes durchtrennt werden. (Die Details dieses Schnittes vide Amputation des Unterschenkels.)



**Amputation des Unterschenkels IV.**

**Fig. 74. Muskelschnitt. Erstes Tempo zur Durchschneidung der Wadenmuskulatur.**

**Lappenschnitt.** — Bei dieser Methode werden die Weichteile in Form von Lappen zugeschnitten und zur Bedeckung des Stumpfes verwendet. Die Lappen können ihrer Form nach verschieden, halbkreisförmig, zungenförmig, mit parallelen Seiten und abgerundeten Ecken, gebildet werden; sie bestehen aus Haut, aus Haut und Muskulatur, Haut und Periost, und wir benennen sie demnach als Hautlappen, Haut-

muskellappen, Hautperiostlappen etc. Auch Knochensegmente können im Zusammenhange mit der Haut in Lappen enthalten sein, und an Wundflächen anderer Knochen adaptiert, hier zur Anheilung gebracht werden.



Amputation des Unterschenkels V.


Fig. 75. Absägung der Unterschenkelknochen.

Die Lappen sind an ihrer Basis stets reicher an Substanz als an ihrem Ende. Man deckt die Stümpfe mit einem einzigen (Lowdham, Verduin) oder zwei Lappen (Ravaton). Die Lappen sind von gleicher oder ungleicher Grösse. Nach der Situierung der Lappen spricht man von vorderen, seitlichen und hinteren Lappen.

Die Lappenbildung kann erfolgen: durch Schnitt von aussen nach innen



(Langenbeck) oder umgekehrt durch Ausschnitt von der Basis zur Peripherie des Lappens (Transfixion) und endlich durch Kombination des Zirkelschnittes mit zwei an entgegengesetzten Punkten der Zirkumferenz angesetzten Längsschnitten, wobei man von den seitlichen Schnitten aus die Knochen subperiostal ausschält, so



Lappenbildung I.


Fig. 76. Oberschenkel. Bildung eines vorderen Hautmuskellappens vermittelt Transfixion in zwei Zeiten.

dass die Substanz der Lappen in ihrer natürlichen Verbindung mit dem Perioste bleibt (Bruns).

Beim Schnitt von aussen nach innen wird die Form des Lappens mit dem Messer vorgezeichnet, die Haut und Faszie in diesem Schnitte bis auf den blossliegenden Muskel durchtrennt, worauf der Hautlappen sich etwas retrahiert. Von der Retraktionsstelle aus wird die Muskulatur mit

langen Zügen des Messers bis an die Basis durchtrennt, worauf der Lappen aufgeklappt werden kann. Soll ein Hautlappen gebildet werden, so wird nach Vorzeichnung der Form mit dem Messer der Wundrand mit der Rechenpinzette oder dem spitzen Haken gefasst, abgehoben und die Haut sukzessive von ihrer Unterlage abpräpariert.

Bei der Transfixionsmethode lassen sich glattere Schnittflächen erzielen. Man kann dabei auf zweierlei Weise verfahren; man bildet



Lappenbildung II.

Fig. 77. Lappen aus der Muskulatur des Oberschenkels.

den Lappen durch direkte Transfixion, indem man mit dem Messer in querer Richtung knapp vor dem Knochen durch die Muskulatur sticht und gegen die Haut ausschneidet. Bei der anderen Methode zeichnet sich der Operateur mit dem Messer die Form des Lappens vor, so dass die Haut sich etwas retrahiert. Nun wird das Messer an der Basis wie oben eingestochen und durch die Muskulatur bis an das Ende des Lappens geführt, an welcher Stelle ausgeschnitten wird. Auf diese Weise erzielt man die zweckmäs-

sigste Verteilung der Muskulatur im Lappen, der an seinem Rande nur aus Haut und Fett bestehen soll (Fig. 76, Fig. 77).

Hat man auf eine der genannten Arten zwei Lappen gebildet, so werden sie aufgeklappt, und es wird die noch am Knochen befindliche Muskulatur mit einem Zirkelschnitte durchtrennt (Fig. 78).




Fig. 78. Oberarm. Zirkuläre Durchtrennung der Muskulatur nach Bildung zweier Hautmuskellappen.

Handelt es sich um den Unterschenkel oder den Vorderarm, so muss, ehe die Absägung des Knochens erfolgt, die Durchtrennung der Muskulatur im Zwischenknochenraum nach den hiefür geltenden Regeln vorgenommen werden.

Zur Lappenbildung nach Bruns, werden die Weichteile zirkulär bis auf den Knochen durchtrennt, hierauf an entgegengesetzten Punkten der Peripherie dem Zirkelschnitt je

ein Längsschnitt angefügt, die ebenfalls bis auf den Knochen dringen. Von diesen Schnitten aus wird der Knochen mit dem Raspatorium sorgfältig seiner Periosthülle entblösst, so dass in den




Fig. 79.

Unterschenkel.

Bildung zweier seitlicher  
Hautlappen.

Lappen, von der Haut bis aufs Periost, die ganze Substanz erhalten bleibt. Derartige Lappen geben eine gute Form des Stumpfes; bei dieser Lappenbildung vermisst man sekundäre Atrophie des Knochenstumpfes, wie der Substanz des Lappens, was für die Tragfähigkeit des Stumpfes von Bedeutung ist. Es eignet sich daher die Bruns'sche Methode vornehmlich zur Amputation am Unterschenkel.

Der Ovalairschnitt entsteht, wenn wir in den Zirkelschnitt an einem Punkte seiner Peripherie einen Längsschnitt einmünden lassen. Der Längsschnitt wird ebenso wie der zirkuläre durch das Periost bis auf den Knochen geführt. Die Spitze des Ovals wird entweder an die Streckseite

des Gelenkes oder an die Seiten desselben verlegt. Von der Spitze des Ovals gehen zwei divergierende Schnitte aus, die an der entgegengesetzten Umrandung der Peripherie in querer Rich-

tung ineinander übergehen (Methode von Scou-tetten). Die Form der Wunde entspricht der eines Kartenherzens, die Spitze des Ovals ist stets der zentralste Punkt der Wunde, die Absetzung im Knochen wird entsprechend der Spitze vorgenommen (Fig. 80).

Nach Vereinigung durch die Naht ist die Wunde linear. Der Ovalairschnitt findet seine Anwendung vorwiegend bei Eukleationen der



Fig. 80. Ovalairschnitt zur Amputation des Zeigefingers im Metakarpus.

Finger und Zehen, seltener zur Auslösung in der Schulter, im Hüftgelenke.

**Durchsägung des Knochens.** Nach vollendeter Durchtrennung der Weichteile wird das Periost zirkulär an jener Stelle, wo die Absetzung des Knochens erfolgen soll, sauber umschnitten. Beim Absägen ist darauf zu achten, dass der Knochen möglichst zentral durchtrennt werde, dass die Sägefläche senkrecht auf die Längsachse des Knochens gerichtet sei, und dass die Weichteile

vor jeder Verletzung während des Sägens geschützt bleiben. Die Muskulatur wird mit spitzen Haken aus dem Bereiche der Säge verzogen, oder aber der Stumpf wird während des Absägens in gespaltene Kompressen gehüllt, geschützt.

Um mit dem Sägen zu beginnen, setzt der Operateur den Daumennagel der linken Hand dem entblössten Knochen senkrecht auf (Fig. 75) und benützt die so geschaffene Wand als Leitung für das Blatt der Säge. Im Beginne wird die Säge ohne Druck geführt; erst wenn eine Furche im Knochen geschaffen ist, kann die Durchsägung mit raschen Zügen unter Anwendung eines gewissen Druckes zu Ende geführt werden. Der an der Peripherie postierte Assistent hält die Extremität in Extension und sucht sie in der Sägefläche abzuknicken, damit nicht das Blatt der Säge zwischen den Sägeflächen des Knochens eingeklemmt werde. Der Knochen wird mittelst der Knochenzange am Rande geglättet; spitze Knochenvorsprünge werden abgeknüpft.

**Wundversorgung.** Nach vollendeter Absetzung des Gliedes wird nun an die definitive Blutstillung geschritten. Die ihrer Lage nach bekannten arteriellen und venösen Hauptstämme werden am Stumpfe mittelst zweier anatomischer Pinzetten isoliert, durch Zangen abgeklemmt und ligiert; ausser den Hauptstämmen der Arterien werden alle sichtbaren, meist in den bindegewebigen Interstitien der Muskulatur verlaufenden Gefässe unterbunden (Fig. 81). Hierauf wird der Esmarch'sche Schlauch gelüftet. Dabei kann sich die Notwendigkeit weiterer Ligaturen herausstellen; parenchymatöse Blutung wird durch Kompression zum Stillstand gebracht.

Die Wundversorgung bezweckt ein genaues Adaptieren der Wundflächen, mit Vermei-

dung von toten Räumen, sowie ein exaktes Anliegen der Hautränder.




Fig. 81. Blutstillung am Amputationsstumpf. Ligatur der mit Klemmzangen armierten durchschnittenen Gefäße.

Man kann durch versenkte Nähte die Muskeln für sich vereinigen, oder man adaptiert durch tiefgreifende Nähte breitere Flächen der Wunde und

vereinigt die Haut durch oberflächliche Knopfnähte oder durch die fortlaufende Naht (Fig. 82 und 83).

Ist die Möglichkeit gegeben, völlig aseptisch zu amputieren, so kann die Amputationswunde vollkommen durch die Naht vereinigt werden; im anderen Falle werden Drains aus der Tiefe der Wunde zur Haut herausgeleitet. Denselben Dienst leisten eingelegte Streifen von steriler resp. antiseptisch imprägnierter Gaze oder Dochte.



Fig. 82.

Wundnaht nach Amputation des Unterschenkels  
mit dem Zirkelschnitte.

Für die **Exartikulationen** gelten im allgemeinen die für Amputation hervorgehobenen Grundsätze. Der Operateur ist an die Peripherie der Extremität postiert; er hält, während er mit der Rechten die Exartikulation vornimmt, mit der Linken das abzutragende Glied umfaßt.

In der Mehrzahl der Fälle wird das Gelenk von der Streckseite her eröffnet. Es kommen Lappen- und Ovalairschnitte zur Anwendung, seltener



Zirkelschnitte mit Manschettenbildung. Die Lappen sind derart angelegt, dass ihre Basis in der Höhe der Trennungsfläche des Gelenkes, in dem die Absetzung erfolgt, gelegen ist.

Gewöhnlich werden ungleich grosse Lappen zugeschnitten. An jener Seite des Gelenkes, wo die Kapsel zuerst eröffnet wird, kann der Lappen




Fig. 83.

Wundnaht nach Lappenamputation des Oberschenkels.

durch Transfixion oder Präparation von aussen nach innen gebildet werden; ist die Auslösung nun beendet, so werden, als letzter Akt der Operation, die Weichteile an der entgegengesetzten Seite des Gelenkes von der Wunde her durchschnitten. Zu diesem Zwecke zieht der Operateur an der mit der linken Hand gefassten, im Gelenke

bereits ausgelösten Extremität an und hält sie derart, dass die Hautbrücke, durch welche die Extremität noch mit ihren zentralen Teilen zusammenhängt, völlig glatt und faltenlos ausgespannt ist. Das Messer wird in die Wunde eingelegt und durchtrennt von da aus in querer Richtung die ausgespannte Hautbrücke. Beim Ausschneiden ist darauf zu achten, dass in erster Linie die Muskulatur und etwas peripherwärts von dieser die Haut durchtrennt werde. Die Methoden der Exartikulation sind zum Teil derart konstruiert, dass mit dem letzten Messerschnitte, der von der Wunde aus den Lappen bildet, die Hauptgefässe durchtrennt werden. Während des Ausschneidens kann die Arterie durch Fingerdruck von der Wunde aus verschlossen gehalten werden.

Eine Methode der Exartikulation (Esmarch), an den grossen Gelenken gerne angewendet, besteht darin, dass nach Anlegung des Esmarch'schen Schlauches, mit einem zirkulären Schnitte die Weichteile im oberen Dritteile der Extremität bis auf den Knochen durchschnitten werden.

Auch der Knochen wird im Niveau des Muskelschnittes durchsägt; nach Unterbindung der Gefässe wird der konstringierende Schlauch gelöst. Ein Längsschnitt wird vom Gelenke bis in die Wunde durch die Weichteile bis auf den Knochen derart angelegt, dass grössere Gefässe oder Nerven nicht in seinen Bereich kommen. Nun wird das Gelenk, während die Längswunde durch Haken klaffend erhalten wird, kunstgerecht eröffnet und der Rest des Knochens möglichst schonend ausgelöst. Aus der hier geübten Kombination von Zirkel- und Längsschnitt resultiert eine Form des Schnittes, die dem Rakettenschnitt ähnelt.

## **Amputationen und Exartikulationen an der unteren Extremität.**

### **Exartikulation der Zehen in den Interphalangeal- oder Metatarso-phalangealgelenken.**

Dorsale Eröffnung des Gelenkes und Bildung eines plantaren Hautlappens durch Ausschnitt von innen nach aussen. Der Operateur erfasst die im abzusetzenden Gelenk gebeugte Zehe mit Zeigefinger und Daumen der linken Hand. Ein Querschnitt an der Streckseite etwas peripher von der höchsten Prominenz des Gelenkes eröffnet dieses; man trennt die Seitenligamente völlig durch, bis das Gelenk maximal klafft; nun wird von der Wunde her ein Lappen aus der plantaren Haut durch Ausschnitt gebildet. Die Länge des Lappens wird dem Querschnitte des betreffenden Fingers angepasst.

Ein grösserer dorsaler und kürzerer plantarer Hautlappen kann zur Auslösung der Zehen ebenfalls zweckmässig in Anwendung kommen, ebenso wie zwei gleich grosse seitliche oder ein einziger seitlicher Hautlappen. In allen Fällen werden die Lappen sorgfältig mit dem Messer vorgezeichnet, von der Unterlage abgelöst und das Gelenk von der Streckseite her quer eröffnet. Die Lappen sollen stets derart situiert sein, dass ihre Basis der Gelenklinie, in welcher die Absetzung erfolgen soll, entspricht. Bei Ausführung des Ovalairschnittes setzt der Operateur das Messer an der Dorsalseite zentralwärts von der Gelenklinie an; er schneidet parallel der Längsachse des Fingers in der Mittellinie, bis er das Gelenk passiert hat; jenseits des Gelenkes weicht der Schnitt nach rechts ab, um an der Beugeseite völlig quer zu

verlaufen. Der Operateur nimmt den queren Schnitt in der Mitte der Beugefalte wieder auf und lässt ihn in den Ausgangspunkt des Schnittes einmünden.

Das Gelenk wird an der Dorsalseite durch Zurückpräparieren der beiden Zwickel des Ovals freigelegt, quer eröffnet, worauf die Absetzung nach Durchtrennung der plantaren Sehnen erfolgen kann.

Amputation einer Zehe im Metatarsalknochen. Ovalairschnitt. Die Spitze des Ovals entspricht der Stelle, wo der Metatarsalknochen durchsägt werden soll. Der Schnitt zieht der Länge nach über den Metatarsus bis jenseits des Metatarso-phalangealgelenkes, wo er an die Beugeseite desselben gelangt, um wiederum zu seinem Ausgangspunkte zurückzukehren. Vom Längsschnitte aus wird der Metatarsus freipräpariert und mit der Phalangen- oder Fadensäge durchtrennt. Das periphere Ende wird gefasst und ausgeschält; ist dies bis an den queren Schnitt in der Beugefalte des Gelenkes zwischen Metatarsus und Grundphalange erfolgt, so ist die Absetzung vollendet.

Amputation sämtlicher Zehen in den Metatarsen. Halbkreisförmiger, größerer plantarer, kürzerer dorsaler Hautlappen. Der Operateur steht an der Peripherie des Fusses. Bei maximaler Dorsalflexion wird der plantare Lappen umschnitten und von den Metatarsen abgelöst. Der dorsale Hautlappen wird vorgezeichnet und ebenfalls abpräpariert. Die Metatarsen sind in toto zirkulär umschnitten, die Muskulatur wird in den Interstitien zwischen den Knochen durchtrennt, das Periost an jedem Knochen einzeln an der Stelle, wo abgesägt werden soll, zurückgeschoben und die Durchsägung vom Fussrücken

her an allen Knochen gleichzeitig vorgenommen (Fig. 84).

Der plantare Lappen kann auch nach erfolgter Durchsägung durch Ausschnitt von der Wunde her gebildet werden.

Zu unterbinden sind die Arteria dorsalis pedis und die Digitalarterien.

Exartikulation der grossen Zehe samt dem Metatarsusknochen.




Fig. 84. Amputation der Zehen in den Metatarsen.  
Plantarer Hautmuskellappen.

Ovalairschnitt mit lang ausgezogener Spitze des Ovals. Der Dorsalschnitt beginnt an der Streckseite über dem Metatarso-phalangealgelenke und zieht in der Längsrichtung des Metatarsus bis an das Köpfchen des letzteren, hier weicht der Schnitt seitlich ab, umkreist die ganze Basis der Zehe und gelangt so wiederum auf die dorsale Fläche der Zehe, wo er in den Längsschnitt einmündet. Der Schnitt führt allenthalben bis auf

7\*

den Knochen; in den Längsschnitt werden beiderseits Haken eingesetzt, und es wird die Muskulatur vom Metatarsus abgelöst, während die Zehe erhoben wird, kann der Metatarsus auch an seiner unteren Fläche vom Muskel entblösst werden, worauf das Gelenk zwischen erstem Keilbein und Basis des Metatarsus dorsalwärts eröffnet wird. Lineare Vereinigung der Wunde.

Exartikulation der fünften Zehe samt ihrem Metatarsus. Bildung eines seitlichen Lappens nach Walther.

Der Operateur umfasst die abduzierte fünfte Zehe und setzt die Schneide des Messers senkrecht auf die Interdigitalfalte zwischen den beiden Zehen auf, worauf die Weichteile des Zwischenraumes mit sägenden Zügen des Messers näher dem Metatarsus der fünften Zehe bis an den Tarsus durchtrennt werden; hier angelangt, wird bei Abduktion der Zehe und des Metatarsus in das Gelenk zwischen fünftem Metatarsus und Os cuboideum eingedrungen, worauf die Zehe bis zum rechten Winkel und darüber im Gelenke nach aussen geknickt wird. Der Operateur umschneidet die Tuberositas metatarsi knapp am Knochen und trennt, wieder mit sägenden Zügen, die Weichteile von der Aussenseite des Metatarsusknochens so weit ab, bis die Haut der äusseren Seite zur Deckung der gesetzten Wunde genügt; der Lappen wird von der Wunde aus quer ausgeschnitten.

Auch mittelst des Ovalairschnittes kann die fünfte Zehe im Tarsometatarsalgelenke ausgelöst werden, dabei kann die Spitze des Ovals, wie an der grossen Zehe beschrieben, am Dorsum pedis angelegt werden; ganz zweckmässig kann man auch die Spitze des Ovals, sowie den Längsschnitt an den seitlichen Fussrand verlegen.




Fig. 85. Verlauf der Lisfranc'schen Gelenklinie.  
(Nach van Walsem.)

Cu. Os cuboideum.

K<sub>1</sub> K<sub>2</sub> K<sub>3</sub> Ossa cuneiformia.

I II III IV V. Artikulationsstelle der betreffenden Metatarsus-Knochen.

I. Metatarsus der grossen Zehe.

### Absetzung des Fusses im Tarsometatarsalgelenke. Lisfranc'sche Operation.

Es ist wichtig, dass man sich die Enden der tarso-metatarsalen Gelenklinie am medialen und lateralen Fussrande an die Oberfläche projiziere. Das laterale Ende entspricht dem Punkte knapp hinter der stets palpablen Tuberosität des fünften Metatarsus, während das mediale Ende zwei Querfinger breit vor dem prominenten Höcker des Os naviculare zu liegen kommt.

Die tarso-metatarsale Gelenklinie stellt nicht eine quere Verbindung zwischen den beiden erwähnten Endpunkten dar, sondern zeigt einen komplizierten Verlauf; vom Metatarsus quintus zieht das Gelenk im Winkel von etwa 45° nach vorne, wendet sich entsprechend der Basis des vierten Metatarsus medialwärts. Das folgende Gelenk zwischen drittem Keilbein und der Basis der mittleren Zehe ist rein quer gestellt und springt etwas peripherwärts vor. Die zentral vorgeschobene, ebenfalls quere Artikulation der zweiten Zehe liegt genau in der Verlängerung der Gelenklinie zwischen Metatarsus IV und Os cuboideum. Das erste Keilbein prominiert nach vorne (Tab. 8, Fig. 85).

### Tab. 8. Lisfranc'sche Gelenklinie.


Cu. Os cuboideum. E., M., K. Ossa cuneiformia. I. Metatarsus der grossen Zehe.

---

**Ausführung der Operation.** Prinzip derselben: Dorsale Eröffnung der Gelenke und Bildung eines Hautmuskellappens an der Sohle durch Ausschnitt von der Wunde her.


Der Operateur steht an der Peripherie des zu amputierenden Fusses. Er umfasst denselben von der Sohle her, markiert mit Daumen und Mittelfinger die Endpunkte der Lisfranc'schen Gelenklinie. Zunächst wird von diesen Endpunkten — medial daumenbreit vor dem Tuber naviculare, lateral knapp hinter der Tuberositas metatarsi quinti —, entsprechend dem Fussrande je ein Schnitt bis über die Köpfchen der Metatarsen, durch Haut und Faszie bis in die Muskulatur geführt. Ein flach nach vorne konvexer, über das Dorsum pedis geführter Schnitt verbindet die hinteren Endpunkte der Lateralschnitte. Nach Durchtrennung der Haut und des Unterhautzellgewebes retrahiert sich der dorsale Hautlappen um ein geringes. An der Retraktionsstelle werden die Sehnen und Muskeln des Fussrückens genau der Richtung des Hautschnittes entsprechend durchtrennt. Es liegt nun am Fussrücken das Skelett und der Bandapparat der Gelenke in geringem Umfange frei vor. Man schlitzt die zarten dorsalen Kapseln der Gelenke bei leichter Plantarreflexion des Fusses. Die Eröffnung der Gelenke beginnt stets am Lateralrande, an der Artikulation zwischen Metatarsus V und lateraler Facette des Os cuboideum, da dieses leicht auffindbar ist, wenn man das Messer hinter der Prominenz des fünften Metatarsus einsetzt und den Schnitt schief nach vorne und innen zu führt. Nach Bergmann fällt dieses Gelenk mit der Richtung einer







# Exartikulation des Fusses nach Lisfranc.



**Fig. 86.** Der Fuss ist im Lisfranc'schen Gelenke nach abwärts geknickt. Bildung des plantaren Hautmuskellappens durch Ausschnitt.



**Fig. 86a.** Stumpf nach Lisfranc.

Linie zusammen, welche von der Tuberositas metatarsi V zum Köpfchen des ersten Mittelfussknochens ziehend gedacht wird. Ist dieses erste Gelenk eröffnet, so ergibt sich der Verlauf der ganzen komplizierten Gelenklinie aus den erwähnten Merkmalen dieser. Der Operateur wendet also das Messer mehr gegen die Mittellinie des Fusses und eröffnet die fast quer gestellte Gelenklinie zwischen Os cuboideum und Metatarsus IV. Das folgende quere Gelenk springt gegen die Peripherie etwas vor. Die ebenfalls quergestellte Gelenklinie zwischen dem zweiten Metatarsus und



Fig. 87.

Form und Ausdehnung des Sohlenlappens bei  
Lisfranc.

mittlerem Keilbeine ist leicht zu finden; man braucht bloss die Gelenklinie des Metatarsus IV zu verlängern, um die Höhe des Gelenkspaltes zu bekommen (Fig. 85). Das Gelenk zwischen erstem Metatarsus und Keilbein ist peripherwärts vorgeschoben; man muss durch kurze, gegen den Knochen gerichtete Schnitte die Gelenkfuge blosszulegen suchen. Es werden die longitudinal gestellten Gelenkfugen ebenfalls eröffnet und bei zunehmender plantarer Knickung des Fusses die kurzen Bandapparate, die die Knochen in der

Tiefe aneinander fixieren, sowie die Bänder der Sohle, soweit sie in den Bereich des Schnittes fallen, durchtrennt, bis der ganze Gelenkskomplex maximal zum Klaffen gebracht werden kann. Es erübrigt nur noch den plantaren Lappen zu bilden; derselbe soll derart zugeschnitten werden, dass er, seiner Basis entsprechend, die Weichteile der ganzen Sohle enthält; die Substanz des Lappens soll gegen die Begrenzung desselben allmählich abnehmen, so dass er an seinem Ende nur aus Haut und Unterhautfettgewebe besteht und auf diese Weise leicht mit der stets zarten Haut des Fussrückens vereinigt werden kann.

Man schneidet mit einem längeren Messer flach durch die Sohle, umgeht am Metatarsusköpfchen der grossen Zehe die Sesambeine und schneidet, wenn man die Höhe der Köpfchen passiert hat, quer aus (Fig. 86).

Am Stumpfe sind die Art. Art. dorsalis pedis und plantaris int. zu unterbinden.

Die Stümpfe nach Lisfranc (Fig. 86 a) geben gute funktionelle Resultate. Der Lappen ist derb und gut gepolstert, die Narbe ist an der Dorsalseite ausser dem Bereiche der Gehfläche gelegen. Die Extensoren des Fussgelenkes (M. tibialis anticus, peroneus brevis), wichtig als Antagonisten des Triceps surae, sind in ihren Ansätzen erhalten.

### **Amputatio intertarsea.**

Eröffnung des Gelenkes zwischen der vorderen Fläche des Os naviculare und den drei Keilbeinen; quere Durchsägung des Os cub. in der lateralen Verlängerung des eben erwähnten Gelenkes. Die Hautschnitte wie bei Lisfranc; das Gelenk vor dem Os naviculare, an der dreifach facettierten Gelenkfläche des Naviculare als solches leicht kenntlich, wird vom Dorsum pedis her eröffnet und

**Tab. 9. Chopart'sche Gelenklinie.**


T. Talus. N. Os naviculare. K. Calcaneus. C. Os cuboideum.  
L. Ligam. calcaneo-naviculare.

zum Klaffen gebracht; das Periost an der Dorsalfläche des Os cuboideum wird quer eingeschnitten und der Knochen quer mit der Phalangensäge durchtrennt. Abknickung des Fusses und Ausschneidung des Lappens wie bei Lisfranc.

**Exarticulatio pedis intertarsea. Operation  
nach Chopart.**

Die Articulatio talo-navicularis und calcaneo-cuboidea stellen eine annähernd quere Fuge dar, in welcher der Fuss innerhalb des Tarsus abgesetzt werden kann. Das Ende der Gelenklinie am medialen Fussrande ist knapp hinter dem Tuber ossis navicularis gelegen; lateralwärts treffen wir gerade in die Articulatio calcaneo cuboidea, wenn wir daumenbreit hinter der Tuberositas metatarsi quinti quer einschneiden. Das Chopart'sche Gelenk stellt keine quere Verbindung dieser beiden Endpunkte dar, sondern ist S-förmig geschwungen. Der Taluskopf ist mit seiner Konvexität nach vorne gerichtet, die vordere Gelenkfläche der Kalkaneus dagegen ist konkav gehöhlt (Tab. 9). Das Ligamentum calcaneo-naviculare interosseum sichert nach Durchtrennung der Kapsel den Zusammenhang der Knochen.

Stellung des Operateurs wie bei Lisfranc. Seitliche Begrenzungsschnitte des Plantarlappens. Die hinteren Endpunkte dieser werden durch einen quer über den Fussrücken ziehenden Schnitt verbunden; stets wird zuerst das Gelenk zwischen Taluskopf und Kahnbein eröffnet. Dieses Gelenk ist nicht zu verfehlen, man kann sich ebenso nach







dem prominierenden Taluskopf, vor dem man quer einschneidet, als auch nach der Tuberositas navicularis, hinter welcher einzugehen ist, orientieren.

Um den Schlüssel des Chopart'schen Gelenkes (Ligament. calcaneo-naviculare interosseum) zu durchtrennen und die *Articulatio calcaneo-cuboidea* zu eröffnen, setzt man die Spitze des Messers in das laterale Ende der bereits offenen *Articulatio talo-navicularis*, wendet die Schneide gegen die Mitte der kleinen Zehe und durchtrennt mittelst eines Druckes das straff gespannte Band.

Der Fuss wird in der eröffneten Gelenklinie abgeknickt; die Ränder der Fusssohle werden im Bereiche des Schnittes durchtrennt und der Lappen aus der Sohle wie bei der Lisfranc'schen Operation, nur entsprechend kürzer, querfingerbreit zentral von den Metatarsusköpfchen ausgeschnitten. Am Stumpfe unterbinden wir die *Art. Art. dorsalis pedis*, *plantaris int.* und *ext.*

Hält man sich nicht strikte an die gegebenen Regeln, so kann es vorkommen, dass man, anstatt ins Gelenk, zwischen Talus und *Os naviculare* zu treffen, in das Gelenk zwischen der vorderen Fläche des Navikulare und den drei Keilbeinen kommt. Die Zurücklassung des Kahnbeines wäre schliesslich kein Unglück, da mit diesem der Ansatz des *Musc. tibialis posticus* erhalten bleibt. Jobert hat diese *Enucleatio praescaphoidea* als Methode empfohlen.

Der Stumpf nach der Chopart'schen Exartikulation hat die Tendenz, in Spitzfussstellung sich zu fixieren. Diesem Mangel sollen die Modifikationen des Verfahrens, die Jobert'sche *Exarticulatio praescaphoidea*, sowie die *Amputatio intertarsea* (pag. 108) wirksam begegnen, indem mit dem *Os naviculare* der an diesem

Knochen inserierende *Musc. tibialis posticus* erhalten bleibt, wodurch eine im Sinne der Dorsalflexion wirksame Kraft gewonnen ist.

### **Enucleatio pedis sub talo.**

(Textor, Günther, Malgaigne.)

Entfernt man nach E nukleation des Fusses im Chopart'schen Gelenke noch den Kalkaneus, so bleibt vom Tarsus bloss der Talus im Zusammenhang mit dem Bein; diese Art der Auslösung des Fusses, *Exarticulatio pedis sub talo* genannt, wurde von Malgaigne als typische Operation geübt und eingeführt.

Bei der ursprünglichen Methode war die Schnittführung ähnlich wie bei der Operation nach Syme (pag. 123), doch wurde der dorsale Hautlappen bis über das Chopart'sche Gelenk geführt. Der Fuss wurde im Chopart abgetragen und hierauf das Fersenbein exstirpiert.

Die beste Schnittführung zur *Enucleatio sub talo* ist die nach Günther, welcher zur Deckung der Wunde einen medialen Lappen, der bis in die Sohle reicht, verwendet.

Der Schnitt (Fig. 88) beginnt an der *Tuberositas calcanei* gerade in der Mittellinie in der Ferse, zieht von da bogenförmig unter dem Malleolus externus und wendet sich in der Höhe des Chopart'schen Gelenkes medialwärts, zieht quer über den Fussrücken und in direkter Fortsetzung über den inneren Fussrand zur Sohle; in der Mitte dieser angelangt, wird der Schnitt in scharfem Winkel nach rückwärts sich wendend, durch die Haut der Ferse bis in den Ausgangspunkt am *Tuber calcanei* geführt.

Der Schnitt dringt allenthalben bis auf den Knochen.

Vorerst wird das Gelenk zwischen Taluskopf und Os naviculare eröffnet und im Sinus tarsi die Verbindung zwischen Talus und Kalkaneus getrennt; ist auf diese Weise auch die untere Fläche des Talus frei, so wird, während der Fuss um seine Längsachse nach



Fig. 88.

**Enucleatio pedis sub talo. Hautschnitt.**

aussen gedreht wird, der vorgezeichnete Lappen knapp am Knochen von der Innenfläche des Fersenbeines abgelöst (Fig. 89).

Bei Eröffnung des Gelenkes zwischen Taluskopf und der Konkavität des Os naviculare soll die *Articulatio calcaneo-cuboidea* nicht in den Bereich des Schnittes kommen; ebenso muss das Gelenk zwischen der Rolle des Talus und dem Unterschenkel geschont bleiben.




Fig. 89. Enucleatio pedis sub talo.

Die Exarticulation ist ausgeführt, der Fuss hängt durch den an der medialen Seite des Fersens befestigten Lappen mit dem Unterschenkel zusammen. Am Unterschenkel die beiden Gelenkflächen des Talus; am Fusse die Gelenkflächen des Kalkaneus und des Os naviculare sichtbar. An der medialen Seite des Talus die Stümpfe der Flexoren, Tibialis post., Extensor hallucis und Ext. digiti. Im Lappen verläuft die Art. tibialis post. mit den begleitenden Venen und dem Nervus tibialis. An der Aussenseite des Fusses die durchschnittenen Sehnen der Peronei, an der Dorsalseite die der Extensoren.

## Amputation des Unterschenkels.

Die Absetzung des Unterschenkels kann in beliebiger Höhe vorgenommen werden. Man war in früherer Zeit gewöhnt, den Unterschenkel unter allen Umständen im oberen Dritteile, fünf Querfinger unter dem Kniegelenke, am „Orte der Wahl“ zu amputieren. Diese Methode sollte es ermöglichen, nach erfolgter Heilung den Stelzfuss in Anwendung zu bringen, auf dem das Knie in gebeugter Stellung bequem aufruhet. Heutzutage haben wir es zum Prinzip erhoben, bei der Amputation des Unterschenkels möglichst konservativ vorzugehen, und die Absetzung mit denkbarster Schonung der gesunden Partien des Beines vorzunehmen. Wir amputieren auch am Unterschenkel nicht mehr am „Orte der Wahl“, sondern stets am „Orte der Notwendigkeit“.



Fig. 90.

Wenn der Amputationsstumpf zur Stütze dienen soll, muss er eine breite Gehfläche besitzen und die Last des Körpers schmerzlos ertragen können.

Nach den an anderen Gliedmassen üblichen Methoden der Amputation mit Bildung der Manschette oder von Weichteillappen, sehen wir mit der Zeit am Stumpfe Erscheinungen der Atrophie auftreten, die vermöge der so bedingten Formveränderung seine Tragfähigkeit gefährden. Derartige Stümpfe

sind überdies stets mehr oder minder druckschmerzhaft. Diese Erscheinungen vermisst man an Stümpfen, bei denen an die Sägefläche ein Knochenstück zur Anheilung gebracht und auf diese Weise ein Verschluss der Markhöhle des amputierten Knochens erzielt wurde, bei den sog. osteoplastischen Amputationsverfahren. Stümpfe nach der Pirogoff'schen Unterschenkelamputation (pag. 125) lassen selbst nach Jahren keine Veränderungen erkennen, sie sind in vollendetem Maasse tragfähig geblieben. Bier hat das Problem, in der Diaphyse des Unterschenkels, die gleichen, dauernd tragfähigen Stümpfe zu erzielen, in glücklicher Weise gelöst. Ursprünglich wurde nach geheilter, gewöhnlicher Unterschenkelamputation eine Keilexzision aus dem Knochen in der Weise ausgeführt, dass das Stumpfende bis zum rechten Winkel umgeknickt, nach der Heilung eine Art Fuss darstellte, auf dem der Kranke eine entsprechende Stütze fand. Zur Gehfläche diente also die Hinterseite der Unterschenkelknochen in ihrer natürlichen Verbindung mit den deckenden Weichteilen.

Aus weiteren Versuchen ergab sich die bemerkenswerte Tatsache, dass die Tragfähigkeit eines Stumpfes ausschliesslich von der Versorgung der Sägefläche des Knochens abhängig ist. Der Verschluss desselben durch ein Periost-Knochenstück ist von entscheidender Bedeutung. Ebenso wichtig ist die Situierung der Narbe, sowie die Forderung, dass die zur Gehfläche dienenden Weichteile in ihrer natürlichen Verbindung mit dem Knochen belassen werden. Bier hat seine ursprüngliche Methode verlassen und eine einzellig ausführbare osteoplastische Amputation des Unterschenkels beschrieben.

Doch sind es nicht nur die osteoplastischen Methoden, die tragfähige Stümpfe liefern.

Hirsch hat gezeigt, dass bei geeigneter mechanischer Nachbehandlung gewöhnliche Diaphysenstümpfe tragfähig werden, namentlich wenn man bei der Amputation Rücksicht darauf nimmt, das Periost in der Höhe der Sägefläche abzuschneiden. Bunge hat überdies die Auslöfflung des Knochenmarks bis auf eine kurze Strecke ober der Knochenwundfläche empfohlen. So resultiert durch Wegfall des prominierenden Mark- und Periostkallus eine glatte Narbenfläche des Knochens, die bei entsprechender Nachbehandlung als gute Stütze dient.

Auch die Bruns'sche subperiostale Amputation des Unterschenkels (pag. 122) gibt hinsichtlich der Tragfähigkeit gute Resultate.

Von Methoden kommen bei Amputation des Unterschenkels zur Anwendung:

Der zweizeitige Zirkelschnitt mit Bildung einer Manschette.

Zweiseitliche, gleich oder ungleich grosse Hautmuskellappen.

Ein vorderer Hautperiostlappen und hinterer kurzer Hautmuskellappen aus der Wade (Heine).

Ein vorderer innerer Haut-Periost-Knochenlappen (Bier-Eiselsberg).

Ein vorderer und hinterer gleich langer Haut-Muskel-Periostlappen (Bruns).

Bei den supramalleolären Amputationen:

Ein Lappen aus der Haut der Ferse (Syme).

Ein Haut-Knochen-Periostlappen aus der Ferse (Pirogoff).

**Tab. 10. Querschnitt durch den rechten Unterschenkel im mittleren Drittel.**


- t. Tibia, f. Fibula.
- E. Gruppe der Extensoren (Tibialis anticus, Ext. digitorum com, Ext. hallucis).
- S. Musc. soleus. G. Musc. gastrocnemius.
- T. p. Musc. tibialis posticus.
- Pr. Gruppe der M. peronei.
- T. a. Art. tibialis antica mit der entsprechenden Vene und dem N. peroneus profundus.
- T. Art. tibialis postica mit den entsprechenden Venen und dem Nervus tibialis posticus.
- P. Art. und Vena peronea.

**Amputation des Unterschenkels mit dem zweizeitigen Zirkelschnitt.**

Zirkulärer Hautschnitt. Der Assistent rotiert das Bein gegen den Operateur. Dieser beginnt an dem ihm entferntesten Punkte die Präparation der Manschette; er umkreist, indem er zu sich präpariert, die ganze Peripherie. Ist die Manschette in entsprechender Höhe freipräpariert und umgeschlagen, liegt die Umschlagstelle in einer Ebene, so wird die Muskulatur durchtrennt. Schnitt durch die Muskulatur der Wade in drei Tempos. Es folgt nun der Schnitt durch die Muskulatur, die zu beiden Seiten dem Zwischenknochenbände aufliegt.

Dieser kompliziertere Schnitt soll exakt in einer Ebene geführt werden, damit nicht die Gefäße in verschiedenen Höhen mehrfach durchtrennt werden. Zur Ausführung der sogenannten *Achtertour* wird das Messer horizontal mit der Basis der oberen Fläche der Tibia derart aufgelegt, dass die Spitze gegen den Operateur gerichtet ist. Das Messer wird nun stets in horizontaler Richtung von der Basis zur Spitze ausgezogen, knapp an der Tibia in den Zwischenknochenraum bis an das Heft eingestossen, und schneidet die Weichteile zwischen beiden Knochen durch. Der Operateur zieht nun, an der Fibula angelangt, das







Messer vom Heft zur Spitze aus, umkreist die Fibula und stösst in horizontaler Richtung das Messer mit abgewendeter Spitze und nach oben gewendeter Schneide abermals in den Zwischenknochenraum ein und durchtrennt endlich, von der Fibula gegen die Tibia schneidend, etwa noch vorhandene Muskeln.

Der Operateur greift mit dem Zeigefinger und Daumen in die Wunde, umfasst das Zwischenknochenband, um sich von der erfolgten queren Durchtrennung aller Muskel zu überzeugen, und durchschneidet an beiden Knochen zirkulär das Periost.

Zur Absägung rotiert der Assistent das Bein nach einwärts. Die Säge wird bei einwärts rotiertem Beine der Tibia aufgelegt, doch derart geneigt, dass die Fibula auch alsbald in den Bereich der Säge kommt. An der Tibia wird durch vorsichtiges Sägen eine Furche geschaffen. Hat das Sägeblatt einmal die sichere Bahn, so wird auch die Fibula in den Bereich der Säge gebracht, und beide Knochen werden gleichzeitig durchtrennt. Das Knochenmark wird auf kurze Strecke ausgelöffelt.

Am Stumpfe (Tab. 10) sehen wir die Querschnitte der beiden Knochen, das Lig. interosseum zwischen beiden ausgespannt. Nach vorne, dem Bande aufliegend, die Gruppe der Strecker, an der entgegengesetzten Seite die Beuger. Um das Wadenbein ist die Gruppe der Peronaei sichtbar. Die mächtigen Muskelmassen der Wade bilden die oberflächlichste Schicht an der Beugeseite. Zwischen Wadenmuskulatur und den Beugern verlaufen die Art. tibialis post. und peronea. Der oberen Seite des Lig. interosseum aufliegend, sieht man die Art. tibialis antica. Das Zentrum der ganzen Figur wird vom M. tibialis posticus gebildet, der als Orientierung beim Aufsuchen der Gefässe benützt werden kann. Vor

diesem finden wir durch das Zwischenknochenband vom Muskel getrennt die Art. tibialis antica, seiner unteren Seite dicht angelagert tibial- und fibularwärts die Arteriae tibialis postica und peronea.




Fig. 91.

Schnitte zur Amputation des Unterschenkels.

a) Zirkelschnitt zur Amputation am Orte der Wahl.

b) Seitliche Lappenschnitte.

### Lappenamputationen am Unterschenkel.

1. Zweiseitliche, gleich lange Hautlappen. Die Basis der Lappen entspricht der Höhe, in welcher die Absetzung erfolgen soll; an der Vorderseite stoßen die Lappen entsprechend der Tibiakante zusammen; die Form der Lappen wird mit dem Messer, bis auf die Faszie dringend, vorgezeichnet, worauf die Lappen von der Unterlage präpariert und aufgeklappt werden (Fig. 79). Die Muskelschnitte sind in der angegebenen typischen Weise senkrecht auf die Achse des Beines zu führen. Wir durchtrennen in erster Linie die Muskulatur der Wade in drei Tempis, dann die des Zwischenknochenraumes mit der Achtertour. Absägung der Knochen wie oben.

Um das Vorragen der spitzigen vorderen Kante der Tibia nach Absägung zu verhindern, wird dieselbe abgekneipt oder besser abgesägt; zu diesem Zwecke wird die Kante, noch ehe der Knochen abgesetzt ist, in schiefer Richtung von oben nach unten hinten in einige Tiefe eingesägt.

Wird nun die Tibia quer durchtrennt, so fällt ein Stückchen des Knochens an der Crista tibiae ganz aus, wodurch die vordere Prominenz beseitigt erscheint.

2. Zwei seitliche Hautmuskellappen. Form der Lappen wie im vorhergehenden Falle. Schnitt durch Haut und Faszie bis auf den blossliegenden Muskel; ist die Haut retrahiert, so werden die Lappen entweder durch Transfixion oder durch Schnitt von aussen nach innen hergestellt. Sind die Lappen aufgeklappt, so wird die Muskulatur mit der Achtertour umschnitten und der Knochen in der Höhe der Lappenbasis durchsägt.

Soll ein einziger seitlicher Lappen gebildet werden, so wird er entsprechend länger und breitbasig angelegt. Derselbe kann aus Haut, an der Innenseite aus Haut und Periost, endlich aus Haut und Muskel gebildet werden; ist der Lappen abpräpariert, so wird an der entgegengesetzten Peripherie des Unterschenkels, die beiden Enden des Lappens verbindend, ein Schnitt zirkulär durch die Haut geführt und nach Retraktion derselben die Muskulatur in typischer Weise durchtrennt.

### **Amputation des Unterschenkels nach Heine.**

Vorderer längerer Haut-Periostlappen, hinterer kurzer Haut-Muskellappen. Breiter, viereckiger Lappen mit abgerundeten Ecken aus der Vorderseite des Unterschenkels (Fig. 92, 93). An der Stelle, wo der Lappen nach Durchtrennung der Haut sich retrahiert, wird das Periost der vorderen Tibialfläche parallel der unteren Begrenzung des Lappens gegen die Tibia von der Unterlage abpräpariert und das Periost an der Tibia, entsprechend

der seitlichen Begrenzung dieser, der Länge nach gespalten. Während der Ablösung des Lappens wird das Periost mittelst Raspatorium vom Knochen abgehoben und bleibt so in Verbindung mit




Fig. 92.



Fig. 93.

**Schnittführung zur Amputation des Unterschenkels  
nach Heine**  
Vorder- und Seitenansicht.

der abgelösten Haut. Das Bein wird nun, nachdem der vordere Lappen bis an seine Basis präpariert ist, erhoben und an der Rückseite des Unterschenkels ein kürzerer, bogenförmiger Lappen, aus der Haut und Muskulatur der Wade be-

stehend, durch Schnitt von aussen nach innen hergestellt. Es folgt die Durchschneidung der Muskel im Zwischenknochenraume und die Absägung




Fig. 94.




Fig. 95.

### Osteoplastische Unterschenkelamputation.


Fig. 94. Hautlappen, Umschneidung des Periosts.

Fig. 95. Periostknochenlappen aus der Schienbeinfläche, nach aufwärts geschlagen.

in der typischen Weise.


König sägt bei der Amputation am Unterschenkel, um die Fibula aus dem Stumpfe zu eliminieren, diese 5—6 cm höher als die Tibia mit der Stichsäge weg.

## Osteoplastische Amputation des Unterschenkels nach Bier-Eiselsberg.



Osteoplastische Unterschenkelamputation.  
Fig. 96. Unterschenkel, entsprechend der Umschlagstelle des  
Knochenlappens abgesetzt.

Ein vorderer innerer Hautlappen,  
dessen Basis die Hälfte des Unterschenkelumfan-  
ges, dessen Länge dem Durchmesser des Unter-



Osteoplastische Unterschenkelamputation.  
Fig. 97. Fixierung des Periostknochenlappens auf der Säge-  
fläche des Unterschenkels.



schenkels entspricht, wird umschnitten. Der so gebildete zungenförmige Hautlappen wird von der Unterlage abpräpariert und nach aufwärts geschlagen (Fig. 94).

Das Periost über der Tibia wird, der Spitze des Lappens entsprechend, quer eingeschnitten und an den Kanten der Länge nach gespalten. Entsprechend dem Querschnitte wird ein kleiner Keil



Osteoplastische Unterschenkelamputation.

Fig. 98. Amputationsstumpf.

aus dem Knochen ausgesägt und von der so geschaffenen Rinne aus parallel der vorderen Fläche des Schienbeines eine 2—4 mm dicke Lamelle aus dieser gesägt. Die Länge des Knochenlappens beträgt 5—8 cm, je nachdem nur die Sägefläche der Tibia oder auch die der Fibula gedeckt werden soll.

Ist die Lamelle des Knochens in entsprechender Länge ausgesägt, so wird dieselbe an der Basis eingebrochen und nach oben geklappt (Fig. 95).

Die seitlichen Längsschnitte am Perioste werden wenige Centimeter nach aufwärts ver-

längert; indem man das Periost über der Basis des Knochenlappens um ein geringes von der Schienbeinfläche abhebelt, ist der Lappen entsprechend mobil geworden.

Die beiden oberen Endpunkte des Hautlappens werden durch einen um die hintere Peripherie des Beines geführten Halbzirkelschnitt verbunden, und in derselben Ebene erfolgt die Absetzung des Unterschenkels nach den Regeln der Kunst. Der Periostknochenlappen lässt sich wie ein Deckel über die Sägefläche breiten und wird hier nach Unterbindung der Gefäße, mit Seidennähten, die das Periost des Lappens an das des Tibiasstumpfes und an die Muskeln heften, fixiert.

Die Hautwunde wird durch Nähte geschlossen (Fig. 97, 98).

### **„Subperiostale“ Amputation des Unterschenkels nach Bruns.**

Der Operateur retrahiert die Haut am Unterschenkel und durchtrennt mit einem Zirkelschnitte alle Weichteile bis auf den Knochen. An der Innen- und Aussenseite wird der Tibiakante, resp. der Fibula entsprechend je ein 4 cm langer Längsschnitt angefügt. Von diesen Längsschnitten aus werden die Knochen mit dem Raspatorium sorgfältig aus der Periosthülle geschält, so dass in den Lappen die Muskeln in ihrem natürlichen Zusammenhange mit dem Periost bleiben. Entsprechend dem oberen Ende der Längsschnitte erfolgt die Absetzung der Knochen; versenkte Periostmuskelnähte, und Naht der Haut. Nach übereinstimmenden Berichten resultieren bei dieser Methode tragfähige Stümpfe; die gute Form derselben ist dauernd und steht denen der osteoplastischen Verfahren nicht nach.

### Supramalleoläre Amputation des Unterschenkels nach Syme.

Eröffnung des Sprunggelenkes, Absägung des Unterschenkels knapp oberhalb der Malleolen und Deckung der Wunde mit einem der Ferse entnommenen Hautlappen. Der zu operierende Kranke befindet sich in Rückenlage. Der Fuss wird über die Horizontale erhoben; der Operateur ist peripherwärts vom Fusse postiert.




Fig. 99.

Amputation nach Syme. Auslösung des Tuber calcanei aus der Fersenkappe.

Während der Operateur den Fuss mit der linken Hand an der Ferse fasst und fixiert, schneidet er, stets an der linken Seite beginnend, von der Spitze des einen Malleolus vertikal gegen die Fusssohle, dann quer durch die Sohle und wieder senkrecht hinauf zum anderen Knöchel, die Weichteile bis auf den Kalkaneus durch (Steigbügelschnitt,

Strupfenschnitt). Ein zweiter Schnitt, der über der vorderen Seite des oberen Sprunggelenkes angelegt wird, verbindet die Enden des Steigbügelschnittes, mit dem er einen rechten Winkel einschliesst, und dringt ebenfalls bis auf den Knochen. Dieser Schnitt soll das Gelenk zwischen der Rolle des Talus und der Unterschenkelgabel eröffnen. Um das Gelenk aufklappen zu können, müssen jederseits auch die Seitenbänder des oberen Sprunggelenkes durchtrennt werden. Der Schnitt durch die Kapsel hat demnach  $\sqcap$ -Form, wobei die seitlichen Schenkel die lateralen Bänder treffen.

Erst wenn die Seitenbänder (am äusseren Knöchel die Lig. Lig. talo-fibulare ant., post. und calcaneo-fibulare, am inneren Knöchel das Lig. deltoideum) durchtrennt sind, wird der Kopf des Talus, bei geringer Plantarflexion des Gelenkes frei; durchtrennt man die hintere Wand der Kapsel, so wird die obere Fläche des Fersenbeines sichtbar. Der Tuber calcanei wird bei maximaler Plantarflexion des Fusses durch dichte, senkrecht auf den Knochen gerichtete Schnitte aus der Fersenkappe geschält (Fig. 99).

Ist der Fuss auf diese Weise ausgelöst und entfernt, so wird die Gabel des Unterschenkels von den Weichteilen befreit, zirkulär umschnitten und quer abgesägt.

Der Operation sind gewisse Nachteile eigen, der hohle Fersenlappen ist zur Adaptierung an den Unterschenkel nicht recht geeignet, auch ist die Höhlung des Lappens für die Ansammlung von Wundsekreten förmlich prädestiniert. Wenn die Syme'sche Operation auch heute nicht mehr jene Bedeutung wie ehemals beansprucht, so verdient sie unsere Berücksichtigung, da sich an diese eine Reihe von vorzüglich verwendbaren Amputationsmethoden (Pirogoff, Gritti u. a.) angliedern.

### Amputation des Unterschenkels nach Pirogoff.

Die Pirogoff'sche Operation ist eine osteoplastische, supramalleoläre Amputation des Unterschenkels, mit Bildung eines Hautknochenlappens aus der Ferse. Pirogoff vermeidet die Nachteile und Schwierigkeiten der Syme'schen Operation, indem er den Höcker des Kalkaneus nicht auslöst, sondern



Fig. 100.

Amputation nach Pirogoff. I.  
Hautschnitte.

derart durchsägt, dass dessen hinteres Segment im Zusammenhange mit der Haut belassen, in dem Lappen enthalten bleibt.

Die Stellung des Operators wie bei der Operation nach Syme, ebenso die Schnittführung durch die Haut. Der Operator fixiert den Fuss mit der linken Hand und schneidet, an der linken Seite beginnend, von der Spitze des einen Malleolus vertikal gegen die Fusssohle

(Fig. 100), dann quer durch die Sohle und wieder senkrecht hinauf bis zur Spitze des anderen Malleolus, die Weichteile bis auf den Knochen durch (Steigbügelschnitt).

Ein vorderer Querschnitt verbindet die Enden des Steigbügelschnittes. In diesem Schnitte werden die Sehnen der Strecker quer durchtrennt und die Kapsel des Talo-kruallgelenkes eröffnet. Um das Gelenk zwischen Talus-




Fig. 101.

Amputation nach Pirogoff. II.

Durchsägung des Fersenhöckers.

rolle und Unterschenkel zum Klaffen zu bringen, müssen die Lateralligamente durchschnitten werden. Bei Trennung der Seitenbänder soll man, namentlich an der Innenseite bedacht sein, die Schnitte knapp am Talus zu führen, damit nicht die Arteria tibialis post. verletzt werde.

Ist das Gelenk maximal aufgeklappt, so wird

die hintere Kapselwand des Sprunggelenkes sichtbar, nach deren Durchtrennung die obere Fläche




Fig. 102.

Amputation nach Pirogoff. III.

**Ablösung der Weichteile von der Rückseite der Unterschenkelgabel. Die Schneide des Messers ist gegen den Knochen gerichtet.**

des Fersenhöckers freiliegt. Der Operateur, der bis zu diesem Momente an der Peripherie des Fusses postiert war, wechselt die Stellung, erfasst

**Tab. 11. Amputation nach Pirogoff.**  
(Rechter Fuss.)

Konfiguration der Wunde nach erfolgter Absetzung. Man übersieht die Sägeflächen der Unterschenkelknochen (T. F.), den herabhängenden Fersenlappen mit der Schnittfläche des Kalkaneus (C.). An der Innenseite des Lappens die Gefässe Art. und Vena tibialis postica (Tp.). An der Streckseite des Unterschenkels zwischen Extensor hallucis l. und Extensor digit. com. die Art. tibialis ant. (T. a.).


den Fuss mit der linken Hand und setzt die Säge der oberen Fläche des Fersenhöckers auf (Fig. 101).

Der Fersenhöcker wird genau entsprechend der Ebene des Steigbügelschnittes durchsägt, worauf der Fuss abgesetzt erscheint. Die Unterschenkelgabel wird nun zur Absägung vorbereitet, indem die Weichteile dicht am Knochen vorerst an der Rückseite abgelöst werden; dieser Schnitt bedarf besonderer Sorgfalt, damit nicht die für die Ernährung des Fersenlappens so wichtige Art. tibialis postica dabei durchtrennt werde. Der Operateur fasst den Fersenlappen zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand, biegt den Lappen maximal nach rückwärts und trennt die Weichteile von der Hinterseite der Tibia derart ab, dass er die Schneide des Messers direkt gegen den Knochen wirken lässt (Fig. 102).

An der Vorderseite genügt es, die Sehnen etwas zurückzustreifen, worauf die Unterschenkelknochen knapp oberhalb des Ansatzes der Mallaeolen zirkulär umschnitten werden.

Zur Absägung wird das Bein abermals horizontal gelagert, der Operateur stellt sich wie zur Amputation, so dass das zu amputierende Glied zu seiner Rechten fällt. Ein Assistent erfasst den äusseren Mallaeolus mit der Langenbeck'schen Zange, worauf die Absägung, quer auf die Längsachse des Unterschenkels vor sich gehen kann








(Fig. 103). Die Sehnenstümpfe werden mit der Pinzette gefasst und im Niveau der Wunde mit der Schere abgetrennt. Die Gefässe durch Ligatur geschlossen.

Es handelt sich da bloss um die *Art. tibialis antica und postica*. Die erstere ist an der oberen Fläche der Tibia, der Sehne des *Extensor hallucis* anliegend, leicht auffindbar. Wenn bei der Operation korrekt vorgegangen wurde, so soll der Querschnitt der *Art. tibialis postica* an der Innenseite des Fersenlappens, etwa in der Mitte des senkrechten Schenkels des Steigbügelschnittes, gefunden werden (Tab. 11).

Zur Vereinigung der Wunde wird die Ferse um  $90^{\circ}$  gedreht und die Sägefläche des Kalkaneus an die des Unterschenkels einfach adaptiert oder durch Knochennaht resp. perkutane Nagelung fixiert. Die Hautwunde wird in querer Richtung vereinigt (Fig. 104).

Die Methode hat gegenüber der tiefen Amputation des Unterschenkels, wie der Syme'schen Operation unleugbare Vorteile. Die Verkürzung ist hier durch die Erhaltung des hinteren Fortsatzes vom Fersenbein, welcher den Unterschenkelknochen verlängert, bis auf einen geringen Rest korrigiert. Zur Gehfläche wird die derbe, gut gepolsterte Haut der Ferse verwendet. Die Narbe liegt nicht im Bereiche der Gehfläche. Der Pirogoffstumpf ist von eminenter Tragfähigkeit.

Schon Pirogoff hat in seiner ersten Veröffentlichung über den Gegenstand bemerkt, dass man nach Führung des Schnittes in der Fusssohle sogleich die Durchsägung des Fersenbeines von der Sohle aus vornehmen könne (Fig. 105 u. 106), um alsdann erst an die Exartikulation im Sprunggelenke zu schreiten; ebenso hat bereits Pirogoff den Vorschlag gemacht, dem Fersenlappen eine schiefe Richtung zu geben, um einen grösseren



Amputation nach Pirogoff. IV.

Fig. 103. Absägung des Unterschenkels; derselbe ist am äusseren Knöchel mit der Langenbeck'schen Zange gefasst und fixiert.

Teil des Fersenbeines und der Sohlenhaut in den hinteren Lappen zu kriegen. Diese Modifikationen wurden von Günther und Lefort im Detail ausgearbeitet.

Während bei Pirogoff die Hautschnitte und die Ebenen der beiden Sägeflächen senkrecht aufeinander stehen (Fig. 107), wird bei Günther der Fersenhöcker schief von hinten oben nach vorne unten durchsägt, ebenso wird die Unterschenkelgabel nicht als eine Scheibe, sondern als ein Keil abgetragen, und zwar derart, dass die Basis des Keils der hinteren, die Schneide der vorderen Begrenzung der Tibia entspricht. (Fig. 108.) Selbstverständlich sind demnach auch die Hautschnitte zu modifizieren; der Steigbügelschnitt zieht hier von der hinteren Begrenzung der Malleolen, nicht senkrecht nach abwärts, sondern schief nach vorne gegen die Sohle, so dass ein grösserer Teil der Sohlenhaut in dem Fersenhappen enthalten ist.



Fig. 104.

Der Stumpf ist hier insofern verändert, als nicht nur der Tuber calcanei die Gehfläche darstellt, sondern als auch ein Teil der Sohle, der natürlichen Gehfläche, dem Stumpfe zur Stütze dient.

Noch breiter wird die Gehfläche, wenn man, nach Lefort den Kalkaneus fast horizontal durch-


sägt (Fig. 109). Der Steigbügelschnitt zieht hier schief nach vorne bis an das Chopart'sche Gelenk, ebenso ist der Dorsalschnitt in einen nach vorne konvexen Lappen umgewandelt, der am Fussrücken ebenfalls bis über die Chopart'sche Gelenklinie sich erstreckt. Der Dorsallappen wird zurückpräpariert, das Sprunggelenk eröffnet und der Kalkaneus bei maximaler Plantarflexion vom Tuber nach vorne in der Richtung gegen den Hautschnitt bis in das Gelenk zwischen Kalkaneus und Os cuboideum durchsägt. Der Fuss wird hierauf im Chopart'schen Gelenk ausgelöst und die Unterschenkelgabel wie oben abgesägt.

Bruns durchsägt das Fersenbein horizontal, doch bogenförmig. Die Sägefläche des Kalkaneus ist konkav, während die der Tibia eine entsprechende Konvexität zeigt.


Die Grenzen der Lefort'schen Operation sind selbstverständlich enger als die der typischen Methode von Pirogoff; ist das Fersenbein in toto gesund, dies ist die Voraussetzung für die Anwendbarkeit von Lefort's Operation, so wird man es vorziehen, die weniger eingreifende Exartikulation im Chopart'schen Gelenke zu wählen.

Als Vorakt der Pirogoff'schen Amputation ist die Durchtrennung der Achillessehne vorzunehmen. Diese wird subkutan von einer Einstichstelle aus mittelst des Tenotoms von der Oberfläche her oder in der Richtung zur Haut durchschnitten. (Vide pag. 211.)

**Amputation nach Pirogoff, modifiziertes Verfahren  
nach Günther.**



**Fig. 105.** Durchsägung des Fersenhöckers von der Fusssohle her.



**Fig. 106.** Konfiguration des Fusses nach Durchsägung der Ferse.

Richtung der Sägeflächen bei der Pirogoff'schen Operation.




Fig. 107. Originalmethode.




Fig. 108. Modifikation nach Günther.




Fig. 109. Modifikation nach Lefort.



### **Auslösung des Unterschenkels im Kniegelenke. Exarticulatio genus.**

Vorderer Hautlappen aus der Streckseite des Unterschenkels. Eröffnung des Gelenkes von der Streckseite her. Bildung eines kürzeren Hautmuskellappens aus der Beugeseite durch Ausschchnitt von der Wunde aus.




Fig. 110.

Enukleation im Kniegelenke. Konturen der Lappen.

Der Hautlappen ist breitbasig und reicht mit seinem unteren Ende bis unterhalb der *Tuberositas tibiae*.

Der Operateur steht an der Peripherie des Beines; der vordere Lappen wird mit dem Messer umschnitten. Die von den lateral am meisten prominierenden Punkten der Femurkondylen, senkrecht nach abwärts geführten Schnitte reichen

jederseits bis etwa 3—4 Querfinger unter die *Tuberositas tibiae*, in welcher Höhe sie durch einen Querschnitt verbunden werden; die beiden Ecken des so umschnittenen Lappens sind abgerundet. Der Lappen wird von seiner Unterlage bis in die Höhe des *Lig. patellae proprium* abpräpariert; der Operateur erfasst mit seiner Linken das im Knie gebeugte Bein am Unterschenkel, durchtrennt mit einem queren Schnitt das *Ligamentum patellae* und dringt ins Gelenk ein. Es werden die Lateralligamente, die Kreuzbänder durchtrennt, so dass der Unterschenkel nur noch durch die hintere Kapselwand und die Weichteile der Kniekehle mit dem Oberschenkel in Zusammenhang bleibt.

Man setzt in der Wunde ein längeres Messer hinter der Tibia ein, wendet die Schneide desselben gegen die Peripherie des Beines und bildet, nachdem man das Köpfchen der Fibula umgangen hat, aus den Weichteilen der Beugeseite einen kurzen Hautmuskellappen durch Ausschnitt. So wird die *Arteria poplitea* erst im letzten Momente der Operation durchtrennt.

Die Patella bleibt in Verbindung mit dem dorsalen Lappen.

Ein Nachteil der Operationsmethode ist die häufig zu beobachtende Gangrän am Rande des Hautlappens.

### **Amputation des Oberschenkels.**

Von Methoden können zweckmässig zur Anwendung kommen: der zweizeitige Zirkelschnitt mit Manschette, ferner von Lappenschnitten ein vorderer und hinterer gleich grosser Hautmuskellappen, ein grösserer vorderer und kurzer hinterer Hautmuskellappen. Man

kann den Oberschenkel in jeder Höhe amputieren. Bei den Operationen im Bereiche der Kondylen, wie bei den transkondylären Amputationen kommen osteoplastische Verfahren, zur Erzielung grösserer Tragfähigkeit, zweckmässig in Anwendung.

**Amputation des Oberschenkels mit dem zweizeitigen Zirkelschnitt.** Das Becken des zu operierenden Kranken wird bis an den Tischrand vorgezogen. Bei Amputation des rechten Oberschenkels steht der Operateur an der Aussenseite, bei Amputation des linken Oberschenkels an der Innenseite des Beines, welches in horizontaler Richtung fixiert gehalten wird.

Entsprechend peripher von derjenigen Stelle, an welcher der Knochen durchsägt werden soll, wird der Zirkelschnitt durch die Haut bis auf die Faszie angelegt. Präparation der Manschette; entsprechend der Umschlagstelle der Manschette wird die Muskulatur in vier Tempos mit energischen Zügen des langen Messers bis auf den Knochen durchtrennt. Der Knochen soll etwas zentralwärts von der Schnittfläche der Muskeln durchsägt werden; zu diesem Zwecke schiebt der Operateur mit Zeigefinger und Daumen der linken Hand die Muskeln etwas zurück und umschneidet entsprechend zentralwärts den Knochen. Das Periost wird zirkulär umschnitten und der Knochen, bei Retraktion der Muskeln des Stumpfes, mittelst Wundhaken oder einer gespaltenen Kompresse, durchsägt.

Am Stumpfe (Tab. 12) sehen wir im Zentrum den Querschnitt des Femurknochens; um denselben ist die Muskulatur derart gruppiert, dass an der Vorderseite der *Quadriceps femoris*, an der Rückseite die *Beuger* angeordnet sind. An der Medialseite ist keilförmig zwischen Beu-

**Tab. 12. Querschnitt durch den linken Oberschenkel im mittleren Drittel.**

- Q. *Musc. quadriceps cruris.*  
 S. *M. sartorius.*  
 Ad. Gruppe der Adduktoren. G. *Musc. gracilis.*  
 F. Gruppe der Flexoren.  
 A. C. *Art. cruralis* in gemeinsamer Gefäßscheide mit der *Art. profunda*, den Kruralvenen und dem *N. saphenus.*  
 N. i. *Nervus ischiadicus.*
- 


ger und Strecker die Gruppe der Adduktoren eingeschoben. Die Furche zwischen Adduktoren und Streckern ist durch den *M. sartorius* gedeckt. In dem am Querschnitte dreieckigen Raum, der von diesen Muskeln eingeschlossen ist, befinden sich die *Art. und Vena femoralis*, sowie der *Nervus saphenus*. Zwischen den Beugern finden wir den *N. ischiadicus* stets von Gefäßen begleitet. In den bindegewebigen Interstitien der Muskeln sind kleinere arterielle Gefäße, der Quere nach getroffen oder im Längsschnitte sichtbar. Die Muskeln sind nach erfolgter definitiver Blutstillung durch versenkte Nähte derart zu vereinigen, dass die Bildung von Nischen und toten Räumen vermieden wird.

Die Haut wird durch tiefgreifende und oberflächliche Nähte vereinigt.

### **Lappenamputationen am Oberschenkel.**

Vorderer und hinterer Hautmuskelappen. Die Lappen sind halbkreisförmig, wohlgerundet; die beiden Lappen stossen an den Seiten des Schenkels zusammen, derart, dass die Basis des einzelnen Lappens der halben Peripherie des Beines entspricht.

Der Operateur umschneidet die Form der Lappen und dringt mit den Schnitten durch Haut, Fettgewebe und *Fascia lata* bis auf den Muskel.





Beide Lappen können durch Transfixion oder durch Schnitt von der Peripherie zur Basis gebildet werden. Die Lappen werden an ihrer Basis umgestülpt und die noch am Knochen haftenden Muskeln zirkulär durchtrennt.

Die Absägung des Knochens erfolgt in üblicher Weise, ebenso die Vereinigung durch die Naht.




Fig. 111.

**Amputation des Oberschenkels nach Gritti.**  
Der vordere Lappen ist aufpräpariert, die Patella angefrischt.

### **Osteoplastische Amputationen des Oberschenkels.**

**Suprakondyläre Amputation nach Gritti.** Gritti hat in sinnreicher Weise Pirogoff's osteoplastisches Verfahren für das Kniegelenk verwertet; an die Sägefläche des Oberschenkels wird die angefrischte Patella adaptiert und zur Anheilung gebracht.

**Ausführung.** Ein vorderer Lappen wie zur Exarticulatio genus (pag. 135); derselbe wird bis an das Lig. patellae propr. zurückpräpariert und

das Gelenk an dieser Stelle quer eröffnet; gleichzeitig werden die seitlichen Ansätze der Kapsel an den Femurknorren durchtrennt, so dass der Lappen mit der darin enthaltenen Patella aufgeklappt werden kann. Die Patella wird an der synovialen Fläche des Lappens umschnitten und, indem




Fig. 112.



Fig. 113.

Amputation des Oberschenkels nach Gritti.

Konfiguration des Stumpfes vor und nach der Vereinigung.

ihre knorpelige Gelenkfläche mit der Phalangen-  
säge abgetragen wird, angefrischt (Fig. 111). Der  
Lappen wird nun etwas retrahiert, so dass der  
suprakondyläre Anteil des Femur freiliegt. Der  
Knochen wird an dieser Stelle umschnitten, durch-  
sägt und ein kurzer Hautmuskellappen aus den  
Weichteilen der Kniekehle durch Ausschnitt ge-



bildet. Die Patella wird an die Sägefläche des Femur adaptiert und durch Knochennähte oder perkutane Nagelung fixiert. Der Stumpf (Fig. 112, 113) ist durch den Verschluss der Markhöhle des Femur mit Knochen und durch die günstige Situierung der Narbe tragfähig.

**Modifikationen der Gritti'schen Operation.** An die Gritti'sche Operation



Fig. 114.




Fig. 115.

#### Schema der Gritti'schen Operation.

**Fig. 114.** Richtung der Sägeflächen am Femur und an der Patella.

**Fig. 115.** Konfiguration des Stumpfes.

schlossen sich eine Anzahl von Modifikationen osteoplastischer Amputationen des unteren Femurendes an, bei denen an Stelle der angefrischten Patella, Segmente des oberen Tibiaendes zur Anheilung an die Sägefläche des Femur gebracht werden sollen. Von prinzipieller Wichtigkeit ist, dass im letzteren Falle durch die Erhaltung des oberen Tibiaendes Muskeln in ihren Ansätzen geschont bleiben, die bei der Gritti'schen Operation

ihrer Insertion beraubt werden müssen, was für das funktionelle Resultat nicht ohne Bedeutung ist.

Bei S s a b a n a j e f f ist im Lappen eine Scheibe aus der vorderen Begrenzung der Tibia mit dem Ansätze des M. rectus femoris enthalten. Von den vorspringendsten Punkten der Femurknorren werden zwei Längsschnitte bis zwei Querfinger unter die Tuberositas tibiae geführt und hier durch einen Querschnitt verbunden. In der Kniekehle wird



Fig. 116.




Fig. 117.

#### Schema der Operation von Ssabanajeff.

Fig. 116. Richtung der Sägeflächen.

Fig. 117. Konfiguration des Stumpfes.

ein kürzerer Lappen bogenförmig umschnitten, aufpräpariert und das Kniegelenk von der Kniekehle her eröffnet. Der Unterschenkel wird im Kniegelenke derart umgeknickt, dass er mit seiner Schienbeinfläche an die Vorderseite des Oberschenkels zu liegen kommt. Von der Gelenkfläche her wird aus dem oberen Ende der Tibia in fron-

taler Richtung eine Scheibe bis unter das Tuber ausgesägt, welche in Verbindung mit dem vorderen Lappen bleibt. Der Oberschenkel wird noch im Bereiche der Kondylen quer durchsägt. Die Gehfläche des Stumpfes wird von der Tuberositas tibiae gebildet und soll nach übereinstimmenden



Fig. 118.



Fig. 119.

### Schema der Operation nach Djelitzyn.

Fig. 118. Richtung der Sägeflächen. Nebst dem *Musc. rectus* sind *Sartorius* *Gracilis* und die Beuger in ihren Ansätzen erhalten.

Fig. 119. Konfiguration des Stumpfes.

Berichten (Koch, Ehrlich) als solche besonders geeignet sein (Fig. 116, 117).

In noch grösserem Masse werden bei Djelitzyn die Insertionen der Muskel an der Tibia geschont. Jedenfalls wird die Funktionstüchtigkeit eine bessere, indem die, Hüft- und Kniegelenk gleichzeitig beherrschenden Muskeln, wenn sie erhalten bleiben, im Stumpfe ihrer Aufgabe als

Strecker oder Beuger des Hüftgelenkes gerecht werden können.

Ein vorderer Lappen wird wie bei S s a b a n a - j e f f umschnitten und von aussen her ein Keil aus dem oberen Tibiaende ausgesägt, so dass auch das Fibulaköpfchen erhalten bleibt. An dem so gebildeten keilförmigen Segmente der Tibia sind neben dem Rektus noch die Ansätze des Sartorius, Gracilis, Semitendinosus



Fig. 120.




Fig. 121.

Schema der Operation nach Abrashanow.

Fig. 120. Richtung der Sägeflächen.

Fig. 121. Konfiguration des Stumpfes.

und Semimembranosus, am Köpfchen der Fibula auch der des Biceps femoris erhalten.

Der Hautknochenlappen wird nach aufwärts geklappt, der Femur im Bereiche der Kondylen senkrecht zur Fläche der Tibia durchsägt und ein kürzerer Lappen aus den Weichteilen der Kniekehle ausgeschnitten (Fig. 118, 119).

Für Fälle, in denen die Vorderfläche des Unterschenkels zur Lappenbildung ungeeignet

wäre, passt die Modifikation von A b r a s h a n o w. Ein vorderer kürzerer Lappen enthält die wie bei G r i t t y angefrischte Patella. In einem grösseren hinteren Lappen ist ein Tibiassegment enthalten. Die Tibia wird mit ihrer breiten Fläche an den Femur adaptiert, während die Patella an die periphere Sägefläche der Tibia zur Anheilung gebracht wird (Fig. 120, 121). Die bessere Ernährung des hinteren Lappens, der die Kniekehlengefässe enthält, sichert hier vor Nekrosen des Lappens, die bei den übrigen Methoden eintreten können.

### **Auslösung des Beines im Hüftgelenke, Kombination von hoher Amputation und subperiostaler Ausschälung des Schenkelkopfes.**

Die aus zirkulärer Amputation des Oberschenkels durch Hinzufügung eines Längsschnittes kombinierte Methode gestattet die Vornahme der eingreifenden Operation unter Blutspargung.

Das Becken überragt den Tischrand. Der Operateur stellt sich wie zur Amputation und führt, nachdem ein E s m a r c h'scher Schlauch möglichst zentral angelegt ist, im oberen Drittel des Oberschenkels einen Zirkelschnitt durch die Haut bis auf den Muskel. An der Retraktionsstelle der Haut wird die Muskulatur zirkulär typisch bis auf den Knochen durchtrennt. Das Periost wird ebenfalls umschnitten und der Knochen durchsägt. Der nächste Akt ist die exakte Unterbindung der Gefässe am Querschnitte. Sind alle sichtbaren Lumina der Gefässe durch Ligatur geschlossen, so wird der Schlauch entfernt.

Ein Längsschnitt, der, vom Hüftgelenke seitlich über den grossen Trochanter ziehend, die Weichteile an der Lateralseite des Oberschenkels allenthalben bis auf den Knochen durchtrennt,

wird bis in die Wunde geführt (Fig. 122). Es werden Haken eingesetzt und der Knochen aus seinen Verbindungen gelöst. Ist der Knochen in genügender Länge ausgelöst, so erfasst der Operateur denselben mit seiner Linken, eröffnet das Gelenk, luxiert den Femurkopf, durchtrennt das Lig. teres, worauf das zentrale Ende des Femur entfernt werden kann. Der ganze Akt kann ohne nennenswerte Blutung zu Ende geführt werden.

### **Auslösung des Femur im Hüftgelenke mittelst des Exstirpationsverfahrens.**

Am raschesten lässt sich der Oberschenkel unter Bildung zweier Hautmuskellappen durch Transfixion enukleieren. Diese Methode hatte in jener verflossenen Periode der Chirurgie ihre Bedeutung, in welcher die möglichst rasche Beendigung der Operation das erste Erfordernis darstellte. Heute, wo wir unter Narkose arbeiten, erscheint es uns wichtiger, die Operation möglichst blutleer durchzuführen. So verzichten wir an der Hüfte auf die schneidige Enukleation mit grossen Zügen des Messers und gehen nach Verneuil und Rose derart vor, dass wir mit dem kleinen Skalpell nach praeventiver Ligatur der *Art. femoralis* die Weichteile Schritt für Schritt durchschneiden, verletzte Gefässe dabei fassen oder vor der Durchtrennung unterbinden.

Diese Methode, bei welcher wir die Trennung der Gewebe nach den für die Auslösung von Geschwülsten üblichen Regeln, Schritt für Schritt vornehmen, wird aus diesem Grunde als **Exstirpationsverfahren** bezeichnet.

Der erste Akt der Oberschenkelexstirpation ist stets die Unterbindung der *Art. und Vena femoralis* unter dem Poupart'schen

Bande. Bei den nun folgenden Muskeldurchschneidungen kann man es nur mehr mit blutenden Aesten der Art. obturatoria, wie der Art. gluteae zu thun haben. Die gebräuchlichste Schnittführung ist die eines Ovalairschnittes, dessen Spitze entweder mit dem Schnitte zur Unterbindung der Vasa femoralia zusammenfällt, oder über den Trochanter verlegt wird. Die Basis des Schnittes reicht bis an die Grenze zwischen oberem und mittlerem Drittel des Oberschenkels. Die Haut wird etwas zurückpräpariert und die Durchtrennung der Muskel mit einem Skapelle schrittweise, unter steter Rücksichtnahme auf sofortige exakte Blutstillung vorgenommen. So gelingt es allmählig, alle Weichteile fast ohne Blutverlust bis auf den Knochen zu durchschneiden. Der letzte Akt der Operation ist die Eröffnung des Hüftgelenkes und Auslösung des Femur.

**Exartikulation in der Hüfte mittest der Lappentransfixion.**

Die beiden zungenförmigen Lappen reichen bis an die Grenze zwischen mittlerem und oberem Drittel des Femur. Man sticht stets mit dem Messer von rechts nach links ein. Sollte z. B.



Fig. 122.  
Exartikulation im  
Hüftgelenke.  
Kombination von Zirkel-  
schnitt u. äusserem Längs-  
schnitt.

das linke Bein ausgelöst werden, so wird das Messer an der Aussenseite, in dem Halbierungspunkt zwischen Spina ilei anterior und Spitze des Trochanter major, horizontal eingestochen, knapp vor der Kapsel des Hüftgelenkes durch die Weichteile des Oberschenkels hindurchgeführt und der Genitokruralfalte entsprechend ausgestochen. Der Lappen wird in entsprechender Länge ausgeschnitten und aufgeklappt. Der Operateur erfasst den Oberschenkel mit seiner linken Hand, führt im Hüftgelenke eine maximale Streckung aus und eröffnet das Gelenk durch einen bogenförmigen Schnitt, der die vordere Wand der Kapsel des Hüftgelenkes durchdringt. Der Femurkopf wird aus der Wunde vorgewälzt, das Ligam. teres durchschnitten. Nun folgt die Durchtrennung der hinteren Kapselwand von der Gelenkhöhle aus; der Trochanter major wird mit einigen Schnitten freigelegt und ein Hautmuskellappen aus den Weichteilen der Beugeseite durch Ausschnitt hergestellt. Die Lappen dürfen nicht zu kurz ausfallen, ausserdem ist es wichtig, beim Ausschneiden darauf zu achten, dass die Muskulatur, entsprechend zugeschnitten, nicht den Rand des Lappens überrage.

### **Amputationen und Exartikulationen an der oberen Extremität.**


#### **Exartikulationen der Finger in den Interphalangealgelenken und in den Metakarpo-phalangealgelenken.**

Zur Eukleation eines Fingergliedes wird das Interphalangealgelenk an der Dorsalseite quer eröffnet, und aus der Haut der Beugeseite ein Lappen durch Ausschnitt gebildet.

Der Operateur erfasst den im abzusetzenden Gliede gebeugten Finger mit dem Daumen und



Zeigefinger der linken Hand. Ein Querschnitt an der Dorsalseite peripher von der höchsten Prominenz des Gelenkes eröffnet dieses. Man durchtrennt die Seitenbänder der Kapsel und bildet, wenn das Gelenk maximal klafft, den kurzen Hautlappen aus der palmaren Haut durch



### Enukleationen im Bereiche der Finger.

Fig. 123.

**Enukleation des Mittelfingers im Interphalangealgelenke;** Eröffnung des Gelenkes an der Dorsalseite, Bildung eines palmaren Lappens durch Ausschnitt von der Wunde her. **Am Daumen:** Schnittführung zur Auslösung des Daumens im Karpo-metakarpalgelenke mittelst Ovalairschnitt. **Am Zeigefinger** Lappenschnitte.

Ausschnitt von der Wunde her (Fig. 123). Die Länge des Lappens wird der Grösse der zu deckenden Wunde angepasst.

Ein grösserer dorsaler und kürzerer palmarer Hautlappen kann ebenfalls zweckmässig zur Anwendung kommen, ebenso wie zwei gleich grosse seitliche, oder ein einziger seitlicher Hautlappen.

Stets wird die Form mit dem Messer sorgfältig vorgezeichnet, der Lappen von der Unterlage abpräpariert und das Gelenk von der Streckseite her eröffnet. Die Lappen sollen derart situiert sein, dass ihre Basis der Gelenklinie, in welcher die Absetzung erfolgt, entspricht.

Bei Ausführung des Ovalairschnittes setzt der Operateur das Messer an der Streckseite, zentralwärts von der Gelenklinie an, er schneidet parallel der Längsrichtung des Fingers in der Mittellinie, bis er das Gelenk passiert hat; jenseits des Gelenkes weicht der Schnitt nach rechts ab, um in der Beugefalte des betreffenden Gelenkes völlig quer zu verlaufen.


Der Querschnitt wird um die andere Seite des Gelenkes herumgeführt und mündet in den Längsschnitt ein (Fig. 124).

Durch Ablösung der beiden Zwickel des Ovals von ihrer Unterlage wird das Gelenk an der Streckseite freigelegt, worauf die Auslösung des Fingers erfolgen kann.

Zur Blutstillung ist die Ligatur der an beiden Seiten palmarwärts verlaufenden Digitalarterien vorzunehmen. Die Wunde nach dem Ovalairschnitt kann linear vereinigt werden.

Zur Enukeation des Daumens im Karpo-metakarpalgelenke ist der Ovalairschnitt am besten geeignet. Die Spitze des Ovals ist an die Streckseite des Daumens entsprechend der Stelle, an welcher die Auslösung erfolgen soll,

zu verlegen; der Schnitt weicht entsprechend dem Metacarpo-phalangealgelenke an die Beugeseite ab und zieht quer durch die Beugefalte dieses Gelenkes, um von da spitzwinkelig abwärts in den



### Enukleationen im Bereiche der Finger.

Fig. 124.

Am Zeigefinger Schnittführung zur Anlegung des Ovalairschnittes für die Enukleation im Metacarpo-phalangealgelenke.

Am Daumen ist zur selben Operation die Haut bereits abgehoben und das Gelenk dorsalwärts eröffnet.

Hautschnitt zur Resektion des 1. Interphalangealgelenkes am Mittelfinger.


Hautschnitt zur Resektion der Mittelphalange des Zeigefingers.

Längsschnitt überzugehen (Fig. 123). Die Schnitte reichen allenthalben bis auf den Knochen, von dem die Weichteile des Thenar sorgfältig abpräpariert werden. Erst wenn der Metakarpus freiliegt, wird das Gelenk zwischen Os multangulum

majus und der Basis des Metacarpus pollicis von der Dorsalseite her eröffnet und der Finger ausgelöst.

Exartikulation des kleinen Fingers samt dem Metacarpus mittelst eines Lappens aus dem Ulnarrand der Haut nach Walther.

Der vierte und fünfte Finger sind gestreckt und in maximaler Abduktion festgehalten; das Dorsum manus ist dem Operateur zugewandt; das




### Enukleationen im Bereiche der Finger.

Fig. 125.


Dorsaler Längsschnitt zur Excision eines Metacarpusknochens. Ovalairschnitt zur Enukleation des Zeigefingers im Metakarpo-phalangealgelenke.

Ungleich grosse seitliche Lappen zur Enukleation im Interphalangealgelenke.

Längerer Dorsal-, kürzerer Volarlappen zur Enukleation des Daumenendgliedes.




Exartikulation des kleinen Fingers mit dem Metakarpus.  
Fig. 126. Erster Akt der Operation. Durchtrennung der Weichteile zwischen viertem und fünftem Metakarpus.



Exartikulation des kleinen Fingers mit dem Metakarpus.  
Fig. 127. Bildung des Hautmuskellappens aus dem Antithenar durch Ausschnitt.

Messer wird mit der Schneide an die Mitte der Kommissur zwischen viertem und fünftem Finger angesetzt (Fig. 126) und mit sägenden Zügen durch die Weichteile des Spatium interosseum zwischen viertem und fünftem Metakarpus, näher dem letzteren, bis an die Handwurzel geführt. Mit der Spitze des Messers, welches nun radialwärts gerichtet ist, werden bei starker Abduktion des fünften Fingers vorerst die Ligamente, welche die Basis der Metakarpen verbinden, getrennt, worauf



**Exartikulation des kleinen Fingers mit dem Metakarpus.**

**Fig. 128., Wunde, nach vollendeter Operation.**

durch Zug in der Richtung der Abduktion, der Finger im Gelenke zwischen Os hamatum und Metakarpus nach aussen umgeknickt werden kann.

Der Operateur umgeht nun die Basis des Metakarpusknochens und bildet den Lappen aus den Weichteilen des Antithenar durch Ausschnitt (Fig. 127). Der Lappen wird oft zu kurz zugeschnitten.

Die Operation kann auch mit Hilfe eines Ovalaischnittes durchgeführt werden.

Die Spitze des Ovals und der Längsschnitt

desselben können sowohl auf die Dorsalseite, als auch auf den Ulnarrand des Metakarpus verlegt werden.

Die Amputation eines Fingers im Metakarpus wird, wie bei den Zehen beschrieben, mit dem Ovalairschnitt vorgenommen. Die Spitze des Ovals ist an die Dorsalseite, der Amputationsstelle entsprechend, verlegt; der am Metakarpus longitudinale Schnitt zieht bis über das Metakarpo-phalangealgelenk, wo er, den Finger umkreisend, der Beugefalte folgend, an der entsprechenden Seite wiederum in den Längsschnitt einmündet. Vom Metakarpus werden die Muskeln abgelöst, der Knochen mit der Phalangen- oder Drahtsäge durchtrennt. Das periphere Ende wird ausgeschält und abgetragen.

Die Amputation der vier dreigliedrigen Finger in den Metacarpen wird, wie die analoge Operation am Fusse, am besten mittelst eines kürzeren dorsalen und längeren palmaren Hautlappens vorgenommen. Nach Bildung dieser werden die Metacarpen mit einem Schnitte umkreist, die Muskeln in den Interossealräumen mit dem Messer durchtrennt und die Absägung vorgenommen.

Beim Ovalairschnitt ist die Spitze des Ovals an den einen oder anderen Rand der Hand zu verlegen.

### **Exartikulation im Handgelenk.**

Vom Skelette dienen uns die Processus stiloidei radii und ulnae als Orientierung für die Lage der Gelenklinie. Das Radiokarpalgelenk, in welchem die Absetzung der Hand erfolgen soll, entspricht bei palmar flektierter Hand genau der queren Verbindungslinie der beiden Proc. stiloidei am Handrücken.



Enukleation der Hand mittelst Zirkelschnitt und Bildung einer Manschette. Der Vorderarm wird in einer Mittelstellung zwischen Pro- und Supination gehalten. Der Operateur stellt sich wie zur Amputation. Zirkelschnitt durch die Haut zwei Querfinger vor der Spitze des Stilus radii (Fig. 129).



Fig. 129. Exartikulation der Hand: zweizeitiger Zirkelschnitt.



Fig. 130. Exartikulation der Hand; dorsaler und palmarer Lappen.

Präparation der Manschette, Durchschneidung der Sehnen mit langen Zügen des Amputationsmessers; der Operateur tritt an die Peripherie, erfasst die zu entfernende Hand mit der Linken und eröffnet bei maximaler Palmarflexion das Handgelenk am Dorsum manus und durchtrennt

die Kapsel an der Palmarseite. Die Arteriae radialis und ulnaris sind an der Palmarseite des Vorderarmes im Sulcus radialis und ulnaris quer durchtrennt.

### Enukleation der Hand mittelst der Lappenschnitte.




Fig. 131.

Exartikulation der Hand;  
Hautlappen dem Thenar  
entnommen.


Die Spitzen der beiden Proc. stiloidei stellen die Endpunkte der Basis der Lappen dar. Der dorsale Hautlappen (Fig. 130) reicht bis an die Mitte des Handrückens. Derselbe wird bis auf die Gelenklinie aufpräpariert, das Gelenk dorsalwärts quer eröffnet; die seitlichen und palmaren Bänder durchtrennt man, worauf durch Zug an der Hand die vorliegenden Sehnen der Fingerbeuger gespannt werden. Quere Durchtrennung der Sehnen und Bildung eines kurzen palmaren Hautlappens durch Ausschnitt (Fig. 132 u. 133).

Nötigenfalls kann zur Deckung der Wunde nach Enukleation der Hand die Haut des Thenar verwendet werden (Fig. 131). Die Form des Hautlappens wird umschnitten, der Lappen selbst von

der Unterlage abpräpariert und von den Endpunkten ein Zirkelschnitt um das Handgelenk geführt. Die Durchschneidung der Sehnen und Auslösung der Hand in typischer Weise.

### Amputation des Vorderarmes.

Mit dem Zirkelschnitte. Der Arm wird in horizontaler Abduktion vom Rumpfe, in einer Mittelstellung zwischen Pro- und Supination gehalten, derart, dass der Daumen nach oben gerichtet ist; Zirkelschnitt und Manschettenbildung



Exartikulation der Hand.


Fig. 132.

Der dorsale Hautlappen ist aufpräpariert. Eröffnung des Handgelenkes an der Streckseite.

in typischer Weise; die Muskulatur wird wie die des Unterschenkels durchschnitten. (Achttertour zur Durchschneidung der Muskel im Zwischenknochenraum.) Zur Absägung kommt der Vorderarm in volle Supination, worauf beide Knochen von der Volarseite her, gleichzeitig durchtrennt werden.

Am Querschnitte (Tab. 13) orientieren wir uns

nach den Knochen, dieselben müssen maximal supiniert, parallel liegen. Zwischen Ulna und Radius ist das Zwischenknochenband ausgespannt, an dessen volarer Fläche wir die Arteria interossea mit der sie begleitenden Vene und dem Nerv wahr-



Exartikulation der Hand.

Fig. 133.

Bildung eines kurzen palmaren Hautlappens durch Ausschnitt von der Wunde.

nehmen. Die Beuger sind an der Ulnar- und Volarseite, die Strecker an der Radial- und Dorsal-seite des Stumpfes angeordnet. In der Mitte des Stumpfes finden wir zwischen der oberflächlichen und tiefen Gruppe der Beuger den quer getroffenen N. medianus. Der Bindegewebsspalt, in dem der

Nerv gelegen ist, führt ulnar- und radialwärts zum Bette der betreffenden Arterien.

Von Lappenschnitten eignen sich zur Amputation des Vorderarmes, zwei gleich grosse Hautmuskellappen aus der Volar- und Dorsalseite. Auch ein einziger grösserer volarer Hautmuskellappen wird sich zweckmässig zur Bedeckung der Wunde verwenden lassen (Fig. 134).

### Enukleation im Ellbogengelenke.

An den Seiten des Gelenkes sind die beiden Epikondylen palpabel; knapp unter dem äusseren




Fig. 134.

- a. Lappenschnitt zur Vorderarmamputation.
- b. Exartikulation im Ellbogengelenke; Zirkelschnitt.

Kondyl ist bei Pro- und Supinationsbewegungen das Capitulum radii fühlbar; der obere Rand desselben zeigt die Lage der Gelenklinie an.

Am besten eignet sich zur Ausführung der Operation die Bildung eines breiten, wohlgepolsterten Hautmuskellappens aus den Weichteilen der Beugeseite des Vorderarmes. Der Operateur fasst den in maximaler Supination befindlichen Vorderarm mit seiner Linken. Ein längeres, spitzes Messer wird von rechts nach links unter-

Tab. 13. Querschnitt durch den linken  
Vorderarm im mittleren Drittel.

- r. Radius. u. Ulna.  
 F. s. Flexor digitorum sublimis.  
 F. p. Flexor digitorum profundus.  
 U. i. Musc. ulnaris int.  
 R. i. „ radialis int.  
 P. l. „ palmaris long.  
 S. l. „ supinator long.  
 Ext. Gruppe der Extensoren.  
 U. Art. ulnaris in gemeinsamer Scheide mit den entsprechenden Venen und dem Nerv. ulnaris.  
 R. Art. radialis mit den entsprechenden Venen und dem Nerv. radialis.  
 M. Nerv. medianus.  
 J. Art. interossea.





Fig. 135.

Exartikulation im Ellenbogengelenk; Lappenschnitt.

halb der Epikondylen entsprechend der Gelenk-  
linie eingestochen und knapp an der Vorderseite  
des Gelenkes quer durch den Vorderarm geführt.  
Mit sägenden Zügen des Messers wird ein Lappen  
gebildet, welcher bis an die Grenze zwischen mitt-  
lerem und oberem Drittel des Vorderarmes reicht  
(Fig. 135). Der Lappen wird aufgeklappt, hier-  
auf mit einem Skalpelle die vordere Kapsel des  
Ellbogengelenkes quer gespalten, so dass die  
Rolle und die Eminentia capitata (Capitulum hu-  
meri) sichtbar werden. Während das Gelenk über-  
streckt ist, durchtrennt der Operateur das Ligam.  
laterale externum (Fig. 136), ebenso das Seiten-

*Tab. 13.*








Fig. 136.  
Exartikulation im Ellbogengelenke.  
Durchtrennung des Lig. lat. ext.

band der anderen Seite, führt eine maximale Hyperextension im Gelenke aus, so dass das Olekranon in der Wunde erscheint. Der Ansatz des M. triceps wird dicht am Knochen abpräpariert und ein kurzer Hautlappen aus der Dorsalseite durch Ausschnitt gebildet. An der Beugeseite sind die beiden Aeste der Art. brachialis zu unterbinden.

Zur Exartikulation mit dem Zirkelschnitte wird dieser etwa 3—4 Querfinger unterhalb der Gelenklinie angelegt, die Manschette in typischer Weise bis an die Gelenklinie präpariert und umgeschlagen. Die Eröffnung des Gelenkes und Exartikulation wie oben beschrieben.

### **Amputation des Oberarmes.**



Fig. 137.

Oberarmamputation. Zirkelschnitt.

Es kann zur Anwendung kommen: der Zirkelschnitt, sowie die Bildung zweier Hautmuskellappen.

Der Zirkelschnitt (Fig. 137) wird entweder in der üblichen Weise zweizeitig, mit Bildung einer Manschette oder bei starker Retraktion der Weichteile, in einem Tempo ausgeführt.




Fig. 138 und 139.

#### Lappenschnitte zur Amputation und Enukleation des Oberarmes.

Am Amputationsstumpfe (Tab. 14) ist die medial im Spalte zwischen M. biceps und triceps gelegene Art. brachialis zu unterbinden. Der an der Aussenseite des Stumpfes im Triceps verlaufende N. radialis ist von einem Gefässe begleitet.

Von Lappenschnitten ist am zweck-

**Tab. 14. Querschnitt durch den rechten Oberarm im mittleren Drittel.**

- B. Musc. biceps.  
 Br. i. „ brachialis int.  
 T. „ triceps.  
 A. b. Art. brachialis in gemeinsamer Scheide mit der entsprechenden Vene und dem Nerv. medianus (M).  
 U. Nerv. ulnaris.  
 R. „ radialis, MC. Nerv. musc. cutaneus.
- 


mässigsten die Bildung je eines medialen und lateralen Hautmuskellappens. Die Lappen stossen am M. biceps und an der Rückseite, der Mitte des M. triceps entsprechend, zusammen. Der mediale Lappen enthält die Art. brachialis (Fig. 138, 139).

**Exartikulation des Humerus.**

An der Schulter stösst die Anwendung der Esmarch'schen Blutleere, ebenso wie am Hüftgelenke, auf grosse Schwierigkeiten. Die Methoden nehmen auf dieses Moment Rücksicht. Die Arterie wird entweder präventiv unterbunden oder erst im letzten Momente der Operation bei digitaler Kompression durchschnitten.

Exartikulation mittelst eines deltoidealen Hautmuskellappens.

Der Kranke liegt mit erhobenem Oberkörper, der Operateur umschneidet aus der Regio deltoidea einen U-förmigen Lappen, dessen obere Enden vom Akromion und der Spitze des Processus coracoideus ausgehen, und der nach unten bis an den Ansatz des M. deltoideus reicht (Fig. 138, 139); wenn die Haut bis auf den blossliegenden Muskel durchtrennt ist, weicht der Lappen etwas zurück. Der Hautmuskellappen wird mit langen Zügen des Messers vom Knochen abpräpariert.





Durch Aufpräparierung des Lappens wird das Schultergelenk freigelegt. Der Operateur erfasst den Oberarm mit seiner Linken, durchtrennt die Gelenkkapsel, indem er das Messer vertikal auf den Humeruskopf aufsetzt und im Bogen über die




Fig. 140.

**Exartikulation der Schulter.**

**Bildung des axillaren Hautmuskellappens durch Ausschnitt von der Wunde.**

höchste Wölbung desselben führt (Fig. 142). Der Kopf wird aus der Wunde vorgewälzt, der Ansatz der hinteren Kapselwand vom Knochen gelöst und das Collum chirurgicum humeri, sowie das oberste Ende des Humerusschaftes von Weichteilen befreit. Damit ist aus den Weichteilen der Achsel

eine Brücke formiert, in welcher die Gefäße enthalten sind. Während ein Assistent diese Brücke derart zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände fasst, dass er die Arterie durch Fingerdruck komprimiert, wird der Lappen aus den Weichteilen der Achsel, dem Ansätze des Pectoralis major am




Fig. 141.

**Exartikulation der Schulter: Kombination von Zirkel- und Längsschnitt.**

Oberarme entsprechend, von der Wunde her ausgeschnitten (Fig. 140). Bei Fortdauer der Digitalkompression wird die Art. axillaris unterbunden.

An der Innenseite des deltoidealen Lappens sind Äste der Arteria circumflexa humeri post. durch die Ligatur zu schliessen.






Fig. 142.  
Exartikulation der Schulter.  
Spaltung der Gelenkkapsel.

Exartikulation mittelst Zirkelschnitt und angesetztem Längsschnitte. Um den Arm wird möglichst hoch ein Esmarch'scher Schlauch geschlungen. Lagerung des Kranken wie zur Amputation des Oberarmes. Zirkelschnitt unterhalb des Deltoidesansatzes durch die Haut, an der Retraktionsstelle werden die Muskeln zirkulär durchschnitten und der Knochen abgesägt. Blutstillung am Querschnitte und Lüftung des elastischen Schlauches. Der Oberkörper wird nun erhöht gelagert und aus dem Interstitium coraco-acromiale ein Längsschnitt bis in die Wunde geführt (Fig. 141). Derselbe durchdringt den M. deltoideus und legt die Kapsel des Gelenkes frei. Die Ränder des Schnittes werden durch Wundhaken abgehalten und die Muskel vom Schaft des Knochens abgetrennt. Das Gelenk wird wie oben eröffnet und der Knochen aus seinen Verbindungen schonend ausgelöst.

Der Ovalairschnitt lässt sich am Schultergelenke auch in der Weise ausführen, dass der Längsschnitt des Ovals von der Mitte zwischen Proc. coracoides und Akromion bis an den Ansatz des Deltoides durch den Muskel bis auf das Gelenk geführt wird, während der Querschnitt durch die Beugeseite nur die Haut betrifft. Der Längsschnitt wird durch eingesetzte Wundhaken zum Klaffen gebracht, das Gelenk eröffnet, der Humeruskopf und Hals freigelegt und zur Wunde herausgewälzt. Während die Arterie in der Wunde komprimiert wird, schneidet der Operateur gegen die Achselhöhle zu die Basis des Ovals in den vorzeichneten Schnitt aus.

### **Exartikulation des Armes mit dem Schultergürtel.**

Diese eingreifende Operation, die wegen Tumoren nötig werden kann, wird am schonendsten nach dem von Rose an der Hüfte geübten Ex-

stirpationsverfahren, schrittweise, unter steter Rücksichtnahme auf die Blutstillung, mit dem Skalpelle vorgenommen.

Die Haut wird in Form eines Ovals mit lang ausgezogener Spitze (Berger) umschnitten; die Spitze des Ovals liegt auf der Klavikel nahe dem Sternalende dieses Knochens. Der Schnitt verläuft auf dem Schlüsselbeine und lenkt von diesem vorne über den Brustmuskel fast senkrecht nach abwärts zur Achselhöhle ab, durchquert diese, um an der Rückseite der Schulter zum akromialen Ende der Klavikel emporzusteigen, wo er in den Längsschnitt mündet.

Zunächst wird im Längsschnitte das Schlüsselbein blossgelegt, subperiostal von allen Seiten schonend frei gemacht und mit der Drahtsäge in seinem mittleren Drittel durchtrennt. Lässt man mit einem Haken das laterale Knochenfragment stark emporheben, so wird der Zugang zu den grossen Gefässen und zum Nervenplexus frei. Man isoliert und unterbindet die Art. und Vena subclavia an der ersten Rippe. Um blutleer zu operieren, ist es erforderlich, noch die Art. transversa scapulae und cervicalis superficialis (vor dem Scalenus anterior), weiters jenseits der hinteren Skalenuslücke, also hinter dem Musc. scalenus ant., die Art. transversa colli, die zwischen den Strängen der Nerven verschwindet, zu unterbinden. Die Nerven des Plexus werden einzeln durchschnitten. Im vorderen Schnitte erfolgt nun schrittweise die Durchtrennung der beiden Brustmuskel und nach Vertiefung des axillaren Schnittes, des Latissimus dorsi.

Es erübrigt nur noch, die am akromialen Ende der Klavikel, ferner an der Spina, am oberen und medialen Rande des Schulterblattes sich ansetzenden Muskel (Kukullaris, Serratus ant., Rhomboideus, Omohyoideus und Leva-

tor scapulae) zu durchschneiden, was am besten unter forcierter Abhebung und Auswärtsrollung des Armes mit der Schulter bewerkstelligt wird.

Die Hautwunde wird entsprechend der Längsachse des Ovals linear vernäht.

### **III. Resektionen an den Gelenken der Extremitäten.**

Wir verstehen unter Gelenkresektion die kunstgerechte, mit möglichster Schonung der umgebenden Gewebe ausgeführte Entfernung der Konstituentien eines Gelenkes.

Bei den tuberkulösen Erkrankungen, sowie bei den schweren Verletzungen im Bereiche der grossen Gelenke schien es den Resektionen bestimmt zu sein, an Stelle der Amputation als konservatives Verfahren zu treten. Dass die Resektion in diesem Sinne sowohl für die Friedens-, als Kriegspraxis von einschneidender Bedeutung zu werden versprach, ist nur begreiflich.

Die Methoden wurden derart gewählt, dass der Wiederersatz des operativ Entfernten möglichst gesichert erschien. Langenbeck bildete in diesem Sinne für alle Gelenke Operationsmethoden aus, bei welchen die Kapsel im Zusammenhange mit dem Perioste, für dessen osteoplastische Wirkung der experimentelle Beweis erbracht war, belassen wurde (subperiostale Resektion). Langenbeck's Schnitte sind heute noch die für die Resektionen meist benützten. Die Einführung der Antisepsis, sowie die genauere Erkenntnis über die Natur und Ausbreitung des tuberkulösen Prozesses in den Gelenken haben unsere Anschauungen über diese Operationen von Grund aus verändert. Die Antisepsis gestattet uns, Verletzungen der Gelenke, die ehemals die Ampu-

tation als indiziert erscheinen liessen, konservativ auch ohne Resektion mit Erfolg zur Heilung zu bringen.

Die Natur des tuberkulösen Prozesses, die Ausbreitung desselben in den Gelenken lässt es weiters als unangebracht erscheinen, in jedem Falle typisch vorgehend, die das Gelenk konstituierenden Knochen zu entfernen, während die Kapsel als solche erhalten bleibt.

Die Resektion bei Tuberkulose der Gelenke ist heute ebenso wenig eine typische, in jedem Falle gleich vorzunehmende Operation, als beispielsweise die Exstirpation einer Geschwulst.

Dennoch üben wir die Eröffnung der Gelenke an der Leiche in typischer Weise, da wir uns auf diese Weise die Methoden aneignen, mittelst welcher wir die Gelenke möglichst schonend eröffnen und uns die Gelenkkonstituentien, sowie die synovialen Flächen der Kapsel in ihrer ganzen Ausdehnung zugänglich machen. So führen wir gewissermassen die Voroperation aus, an welche wir in der Klinik, dem jeweiligen Falle entsprechend, den eigentlichen Eingriff, die Entfernung des tuberkulös Erkrankten, anschliessen. Die Kapsel des Gelenkes wird breit eröffnet (*Arthrotomie*), der Synovialsack seiner ganzen Ausbreitung nach blossgelegt und, je nach der Ausdehnung des Krankheitsprozesses, die Exstirpation der Synovia (*Arthrectomia synovialis*) die Exkochleation von Herden im Knochen, eventuell nach Blosslegung derselben mittelst Meissel und Hammer, oder die Resektion der Gelenkenden vorgenommen (*Arthrectomia ossalis*).

Die Knochen werden bei vorgeschrittenen Graden der Erkrankung abgesägt; in einzelnen Gelenken muss die Absägung eines der Gelenkkörper vorgenommen werden, damit auf diese Weise das Gelenk in seiner ganzen Ausdehnung

zur Vornahme der nötigen Eingriffe zugänglich werde (Hüftgelenk).

#### Indikationen:

1. Verletzungen, komplizierte Zertrümmerungen der Gelenkskörper, namentlich wenn grössere Teile der Knochen völlig aus ihrem Zusammenhange gelöst erscheinen.

2. Tuberkulose der Gelenke, wenn die konservierenden Methoden (Ruhigstellung und Fixierung des Gelenkes, Jodoformtherapie, Stauungsmethode, kleinere lokale Eingriffe) im Stiche gelassen haben.

3. Akut entzündliche Prozesse der Knochen. Osteomyelitis mit Epiphysenlösung und Vereiterung des betroffenen Gelenkes.

4. Difformitäten der Gelenke. Orthopädische Resektionen zur Behebung schwerer, sonst irreparabler Formveränderungen (Kontrakturen, Anchylosen).

5. Luxationen, wenn sie irreponibel sind und mit schweren Funktionsbeschränkungen einhergehen.

6. Schlottergelenke, die operativ anchylosiert werden sollen (Arthrodesen).

Endlich können Tumoren der Gelenkenden die Veranlassung zur Resektion abgeben.

Die Schnitte werden mit kurzen, kräftigen Messern durch die Weichteile bis auf den Knochen geführt. Nach Spaltung der Kapsel wird diese im Zusammenhange mit dem Periost entsprechend dem Ansatz am Knochen abgelöst und die Absägung der Knochen vorgenommen.

Die Weichteilschnitte sind derart gewählt, dass die quere Durchtrennung namentlich von Muskeln, Sehnen, grösseren Nerven und Gefässen tunlichst vermieden wird. Langenbeck's Re-

sektionsschnitte entsprechen meist der Längsrichtung der Extremitäten.

Die Gelenkkapsel wird in der Richtung des Hautschnittes möglichst ausgiebig gespalten; indem die Kapselwunde durch eingesetzte Haken aufgespannt wird, beginnt der Operateur mittelst dicht aneinander gereihter Schnitte des Resektionsmessers, welches stets in senkrechter Richtung auf den Knochen geführt wird, den Ansatz der Kapsel im Zusammenhange mit dem Perioste abzulösen. Die Knochen werden zur Wunde herausgewälzt und mittelst der Bogen-, der Stichsäge resp. der Draht- oder Kettensäge abgesetzt.

Die Richtung der Sägeflächen ist bei den einzelnen Gelenken verschieden.

Zur Behebung winkelliger Kontrakturen ist die keilförmige Excision der Knochen erforderlich. An Stelle derselben kann die bogenförmige Resektion (Helferich) in Anwendung kommen, bei welcher Methode die Verkürzung eine geringere ist.

Nach geschehener Resektion der Knochen werden die Bruchstücke aneinander adaptiert und durch Nägel, Klammern oder auch ohne diese im Verbande fixiert.

Der Kapselspalt, die Muskeln und die Haut werden durch Naht vereinigt. Durch Einlegung von Drainröhren oder durch die Anlegung von Drainagelücken soll Sekreten Abfluss geschaffen werden.

## **Resektionen an den Gelenken der oberen Extremität.**

### **Resektion des Schultergelenkes nach Langenbeck.**

Der Kranke ist in sitzender Stellung derart auf den Operationstisch gelagert, dass die Schulter den Tischrand etwas überragt. Der Opera-

teur steht an der Seite des Rumpfes, das Gesicht der Schulter zugewandt; mit der Linken umfasst er den Oberarm, entsprechend der Mitte, und stösst bei natürlich herabhängendem Arme das fast vertikal gehaltene (Fig. 16) Resektionsmesser ins Trigonum coraco-acromiale ein. Der Schnitt wird in der Richtung des Oberarmes durch den M. deltoideus bis nahe an den Ansatz dieses Mus-




Fig. 143. Resektion der Schulter: Längsschnitt.

kels am Humerus, bis auf die Kapsel geführt (Fig. 143); das obere Ende des Schnittes hat das zwischen Akromion und Proc. coracoideus gespannte Band quer durchtrennt. Ist die Wunde durch Haken zum Klaffen gebracht, so liegt die laterale Wand der Kapsel frei vor. Durch eine geringe Auswärtsrollung des Armes werden die beiden Tubercula humeri, der Sulcus intertubercularis in das Niveau der Wunde gebracht. Die



Kapsel wird entsprechend dieser Furche eingeschnitten und auf der Hohlsonde in der Richtung der Furche bis an die Cavitas glenoidalis, nach abwärts bis an den chirurgischen Hals des Humerus gespalten; die auf diese Weise blossgelegte



**Fig. 144.**

**Schulterresektion.** Der Oberarmkopf ist nach subperiostaler Auslösung zur Absägung aus der Wunde gehoben.

Bizepssehne wird mittelst stumpfen Hakens aus ihrem Bette gehoben und medialwärts über den Humeruskopf verschoben. Von dem zur Auslösung der Bizepssehne gesetzten Kapselschnitte aus wird die Ablösung der Kapsel vom Knochen vorgenommen. Mit Hilfe eines in den Kapselschlitz eingeführten Hakens wird die Kapsel ab-

gehoben und dicht am Knochen vom Humerus abpräpariert. Der Operateur geht, während der Arm dem Messer entgegengerollt wird, Schritt für Schritt vor. Ist die Kapsel in der Hälfte der Peripherie freigemacht, so wird der übrige Teil ebenfalls vom Knochen gelöst; der Operateur geht abermals vom ursprünglichen Kapselschlitz, doch in entgegengesetzter Richtung aus. Im Zusammenhange mit der Kapsel werden so die mit dieser verwebten Ansätze der Schultermuskel (Supra- und Infraspinatus, Subscapularis) vom Knochen abgelöst; ist auf diese Weise der Kopf freigemacht, so wird er aus der Wunde gehoben (Fig. 144) und entsprechend dem Collum chirurgicum entweder mit der Fadensäge oder, bei Fixierung mit der Langenbeck'schen Zange, mit der Bogensäge durchtrennt (Fig. 145). Die Sehne des M. biceps ist bei dieser Art des Vorgehens intakt geblieben.

Nach Entfernung des Oberarmkopfes ist die Cavitas glenoidalis, sowie das ganze Innere der Kapsel für etwa notwendige Eingriffe genügend freigelegt. Grössere Gefässe werden bei der Ausführung der Schulterresektion mit dem Längsschnitte nicht verletzt.

### **Resektion des Schultergelenkes nach Kocher.**

Die Methode gibt, bei Schonung des Deltamuskels und der entsprechenden Nerven, einen freieren Einblick ins Gelenk.

Der Hautschnitt beginnt am Akromion und zieht von da bis an die Mitte der Spina scapulae, von wo er im Bogen nach abwärts bis 2 Querfinger über der hinteren Achselfalte geführt wird. Der obere Schnitt eröffnet die Articulatio acromio-clavicularis, löst im weiteren Verlaufe am oberen Rande der Spina den Ansatz des M. cucullaris ab. Der nach abwärts gehende Schenkel des Schnittes legt den hinteren Deltoidesrand bloss; dieser Muskel wird von der

Unterlage abgehoben, der Supra- und Infra-spinatus am Halse der Scapula desgleichen, bis es gelingt, den lateralen Rand der Crista, dort




Fig. 145.

**Schulterresektion. Absägung des Humeruskopfes.**  
Der Kopf wird mittelst der Langenbeck'schen Zange fixiert gehalten.

wo diese sich von der Scapula erhebt, zu umgreifen. Der freigemachte Knochen wird mit dem Meissel schräg durchschlagen (Schonung des N. suprascapularis) und mit dem M. deltoides nach vorne über den Humerus gewälzt.

Es liegt die Hinterseite der Gelenkkapsel mit den Ansätzen des Supra- und Infraspinatus und Teres minor bloss. Am hinteren Rande der Bizepsrinne wird bei auswärts rotiertem Arme ein Längsschnitt durch die Kapsel auf den Knochen geführt, durch den die Bizepssehne bis zu ihrem Ansatz am Pfannenrand freigelegt wird. Von diesem Schnitte aus werden Supra- und Infraspinatus im Zusammenhange mit Kapsel und Periost vom Tuberculum majus abgelöst, wenn erforderlich, nach vorne zu in der gleichen Weise der M. subscapularis vom Tub. minus humeri. Ist der Kopf freipräpariert, so erhält man weiten Einblick in die Pfanne.

### **Resektion des Ellbogengelenkes mit dem dorsalen Längsschnitt.**

Der Arm ist im Ellbogengelenk rechtwinkelig gebeugt und derart über den Thorax gelagert, dass die Streckseite des Gelenkes, nach oben gerichtet, zugänglich wird. Der Operateur steht an der Seite des Thorax, die der gesunden Extremität entspricht.

Der Schnitt wird an der Dorsalseite des Gelenkes durch das untere Ende des M. triceps über das Olekranon geführt (Fig. 147). Nach Langenbeck fällt der Längsschnitt näher dem medialen, nach Chassagnac an den lateralen Rand des Olekranon, doch ist die Anlegung des Schnittes in der Mittellinie (Park) ebenfalls vollkommen zweckentsprechend.

Der Schnitt wird durch den Musc. triceps sofort bis auf den Knochen geführt; indem die Wundlefen des Muskels kräftig durch Haken von einander gezogen werden, wölbt sich die hintere Kapselwand des Ellbogengelenkes vor, die in der Richtung des Hautschnittes eröffnet wird. Mit senkrecht gegen den Knochen gerichteten Zügen

des Messers wird die Sehne des M. triceps dicht am Olekranon von diesem abgetrennt; gleichzeitig sind auch die Muskeln, die an der Dorsalseite des obersten Endes der Ulna inserieren, im Zusammenhange mit dem Perioste abzulösen. An der Aussen-  
seite gelangt man alsbald an die Eminentia capitata (Capitulum humeri) und an das Ra-




Fig. 146.

**Resektion des Ellbogengelenkes.** Blosslegung des Ellbogengelenkes an der medialen Seite. Man übersieht das Olekranon und das mediale Ende der Trochlea. Der Ulnarnerv ist bei Retraktion des Wundrandes über die Spitze des inneren Epikondyls herabgeglitten.

diusköpfchen; das kräftige fibröse Seitenband ist hier dicht am Knochen abzupräparieren.

An der Innenseite wird ebenfalls mit der Ablösung der Trizepssehne vom Olekranon begonnen; gleichzeitig werden auch vom oberen Ulnarende die Muskeln abpräpariert. Indem der freie Wund-

rand bei stärkerer Beugung im Ellbogengelenke nach innen und beugewärts verzogen wird, erscheint der innere Epikondyl des Oberarmes im Bereiche der Wunde. Die an diesem Fortsatz inserierenden Muskeln (Pronator teres, Flexoren der




Fig. 147.




Fig. 148.



Fig. 149.

Schnittführungen zur Resektion des Ellbogengelenkes.

Fig. 147. Längsschnitt nach Langenbeck.

Fig. 148. Bajonettförmiger Schnitt nach Ollier.

Fig. 149. Radialiter Angelschnitt nach Kocher.

Hand und der Finger) sollen ebenfalls dicht am Knochen abgelöst werden. Um den aus der Rolle neben den inneren Epikondyl dislozierten Ulnarnerv nicht zu verletzen, wird die Ablösung der

Muskeln vom inneren Epikondyl derart vorgenommen, dass die Schnitte halbkreisförmig, von der Spitze des Epicondylus beginnend, dicht aneinandergesetzt, bis an die Basis dieses Knochens fortgeführt werden.

Auf diese Weise kommt der Nerv überhaupt nicht in den Bereich des Messers. Durch weiteres




Fig. 150.

**Resektion des Ellbogengelenkes.** Die Konstituentien des Ellbogengelenkes sind vollkommen freigelegt und aus der Längswunde hervorgewälzt.

Präparieren wird der mediale Rand der Rolle und der Cavitas sigmoidea ulnae frei. Ist die Ablösung der Kapsel bis über die Ansätze der Seitenbänder gediehen, so können die Gelenkenden des Humerus wie der Vorderarmknochen zur Wunde herausgedrängt werden (Fig. 150).

Die Knochen werden zur Absägung mit der Langenbeck'schen Zange gefasst, der Humerus

**Tab. 15. Resektion des Ellbogengelenkes nach Kocher (Rechter Arm).**

Das Gelenk ist von der Aussenseite her eröffnet, Kapsel und Periost sind vom äusseren Epikondyl (C.), vom Capitulum radii (R.), vom oberen Ende der Ulna (U.) abgelöst. Im Hintergrunde die Innenseite der Gelenkkapsel (K.) mit Synovialzotten sichtbar.

---

oberhalb der Rolle, die Vorderarmknochen gleichzeitig jenseits des Capitulum radii und des Proc. coronoideus abgesägt.


Bei der Beschreibung vom Gange der Operation bin ich der Vornahme derselben an der Leiche gefolgt. In den Fällen der Praxis erfährt der Operationsgang gewisse Modifikationen; so fällt die Desartikulation und isolierte Absägung der Knochen selbstredend weg, wenn es sich darum handelt, bei Ankylose des Gelenkes die Operation vorzunehmen.

**Resektion des Ellbogengelenkes nach Kocher.**

Das Ellbogengelenk ist in stumpfwinkliger Beugung; der Schnitt (Angelschnitt) beginnt an der Aussenseite des unteren Humerusendes, 3 bis 5 cm über der Gelenklinie und zieht parallel zur Achse des Oberarmes bis an das Köpfchen des Radius und von da in leichtem Bogen am lateralen Rande des M. anconaeus quartus bis zur Kante der Ulna 4—6 cm unter der Olekranonspitze (Fig. 149).

Der Schnitt dringt zwischen M. supinator longus und den M. radiales ext. einerseits und Trizepsrand andererseits bis auf den Humerus, weiter abwärts zwischen Ulnaris ext. und Anconaeus quartus auf die Ulna und spaltet die Gelenk-







kapsel. Von dem so geschaffenen Spalte aus werden im Zusammenhange mit der Kapsel und dem Periost zunächst der Trizepsansatz und der Musculus anconaeus quartus von der Ulna abgelöst. Der gebildete Lappen wird ulnarwärts über das Olekranon geklappt, die Freipräparierung am Condylus ext. humeri und am Radiusköpfchen vervollständigt, bis die Gelenkskonstituentien sich auf-



Fig. 151.

**Handgelenkresektion. Dorsoradialschnitt.** Die Strecksehnen sind seitlich abgezogen. Man überblickt das untere Radiusende und die beiden Reihen der Karpusknöchelchen.

klappen lassen und ein weiter Zugang zum Gelenke geschaffen ist (Tab. 15). Kocher durchsägt das Olekranon bogenförmig.

Andere Verfahren der Ellbogengelenkresektion: je ein Längsschnitt an den Seiten des Gelenkes (Vogt, Hueter); H-Schnitt (Moreau), wobei der Querschnitt die Sehne des Trizeps ober-

halb ihres Ansatzes durchtrennt. Querschnitt an der Streckseite des Gelenkes über das Olekranon und temporäre quere Durchsägung desselben (Szymanowsky, Bruns), Bajonetschnitt (Ollier). (Fig. 148.)



Fig. 152.  
Resektion des Handgelenkes. Langenbecks Dorso-radialschnitt.

### · Resektion im Handgelenke.

#### Dorsoradialschnitt nach Langenbeck.

Hautschnitt an der Dorsalseite von der Mitte des Ulnarrandes des Metakarpus indicis auf die Mitte des unteren Radiusendes (Fig. 152).

Man geht zwischen den Sehnen des Ext. digit. comm. und Ext. hallucis longus in die Tiefe und spaltet das Ligamentum carpi transv. dorsale. Die Ansätze der Musculi radiales ext. werden von den Basen der Metakarpen abgelöst und das Radiokarpalgelenk eröffnet.

Mit dem Messer oder scharfem Raspatorium wird die Kapsel von der Dorsalseite des Handwurzelknochen abgelöst, die einzelnen kleinen Gelenke werden eröffnet und die Knochen der Handwurzel isoliert exstirpiert (Fig. 151).

Der dorso-ulnare Schnitt (Lister)) zur Resektion des Handgelenkes wird bei leicht-

ter Radialflexion der Hand von der Mitte des fünften Metakarpus über die Mitte des Handgelenkes bis über die Radiusepiphyse geführt. Das Lig. carpi transv. dors. wird gespalten, worauf neben den radialwärts verzogenen Sehnen der Fingerstrecker auf das Gelenk vorgedrungen werden kann. An der Basis metacarpi V muss die Sehne des M. ulnaris ext. vom Knochen abgelöst werden. Nun kann der Ansatz der Kapsel, von der Ulna beginnend, losgelöst werden, wobei die Karpalknochen freigelegt und isoliert ausgelöst werden. Stellt sich die Notwendigkeit heraus, auch die Radiusepiphyse zu entfernen, so wird sie aus der Wunde vorgedrängt, am Stilus mit der Langenbeck'schen Zange erfasst und quer abgesägt. Es erleichtert das Vorgehen, wenn man, nach Kocher, um die Zugänglichkeit zu den Gelenken zu vergrössern, die Hand radio-volarwärts vollkommen luxiert, wobei die Strecksehnen radialwärts verlagert werden. In dieser Stellung bietet die Auslösung der Karpalknöchelchen und die Absägung der Vorderarmknochenenden keine Schwierigkeit.

### **Resektionen an den Fingern.**

Die Resektion in den Metakarpophalangealgelenken wird am Daumen, am zweiten und fünften Finger, ebenso wie die in den Interphalangealgelenken mittelst eines lateralen Schnittes vorgenommen, wobei sowohl die Streck- als Beugesehnen vollständig geschont bleiben. Der Schnitt eröffnet seitlich das Gelenk. Die Ansätze der Kapsel werden dorsal- und volarwärts am Knochen abgelöst, die Gelenkenden zur Wunde herausgedrängt und abgesägt. Nach Entfernung der Knochen liegt die synoviale Fläche der Kapsel in toto vor. Am Metakarpophalangeal-

gelenke des Daumens wird das Gelenk erst nach Ablösung der Muskulatur des Thenar zugänglich.

Die Metakarpo-phalangealgelenke des dritten und vierten Fingers werden mittelst dorsaler Längsschnitte blossgelegt; die Eröffnung des Gelenkes und Abtragung der Gelenksenden in typischer Weise.

Die Resektion eines ganzen Metakarpusknochens wird mittelst dorsalem Längsschnitte, der von der Basis bis an das Capitulum metacarpi reicht, vorgenommen. Der Knochen wird durch subperiostale Ablösung der Musc. interossei an jeder Seite entblösst und nach Eröffnung des Gelenkes an der Basis und am Köpfchen, aus seinem Gefüge gehoben (Fig. 125 pag. 152).

Die Resektion ganzer Phalangen wird mit Hilfe seitlicher Längsschnitte vorgenommen.

## **Resektionen an den Gelenken der unteren Extremitäten.**

### **Hüftgelenkresektion.**

#### **Aeusserer Längsschnitt nach Langenbeck.**

Der zu operierende Kranke liegt mit der gesunden Seite auf. Das kranke Bein wird stumpfwinklig gebeugt und in leichter Adduktion festgehalten. Der Schnitt zieht von der Spina posterior sup. in der Richtung des Beines über den Trochanter major und dringt sofort durch die Glutealmuskulatur bis auf das Darmbein und die Gelenkkapsel.

Die am Trochanter inserierenden Sehnen werden dicht am Knochen abgelöst, die Kapsel wird gespalten und der Limbus am Pfannenrande mehrfach eingekerbt. Das Messer wird in den Gelenkspalt eingeführt und bei forcierter Flexion,

Adduktion und Einwärtsrotation des Beines das Lig. teres durchschnitten, worauf der Schenkelkopf auf das Darmbein zu liegen kommt. Die Kettensäge wird um den Schenkelhals geschlungen und der Schenkelkopf abgetrennt.

Kocher's Winkelschnitt, eine Vervollkommnung der Langenbeck'schen Methode, beginnt an der Basis der Hinterfläche des Trochanter major, steigt zur Trochanterspitze empor, von da im Winkel in der Faserrichtung des Glutaeus maximus schräg aufwärts. Man spaltet die Faszie des Glutaeus max. Der obere Schenkel des Schnittes trennt den Glutaeus max. in seiner Längsrichtung. Unter diesem wird, in derselben Richtung, in den Raum zwischen Glutaeus med. und min. einerseits und dem M. pyriformis eingegangen. Indem der M. pyriformis nach abwärts verzogen wird, gelangt man an die Hinterfläche der Kapsel. Es wird die Pyriformissehne vom Trochanter abgelöst, mit der des Obtur. int. und der Gemelli nach innen verzogen, während die Glutaei (med. und min.) ebenfalls dicht am Knochen abgelöst, nach aussen disloziert werden.

Man kann nun die blossgelegte Kapsel an ihren Ansätzen loslösen und, wo dies nötig erscheint, mit der Synovialis im Zusammenhang entfernen, oder man eröffnet die Kapsel, durchtrennt das Ligamentum teres und luxiert den Schenkelkopf, der abgetragen werden kann.

### **Aeusserer Bogenschnitt nach Velpeau.**

Lagerung des Kranken wie zur Langenbeck'schen Operation. Die Distanz zwischen Spina ilei anter. sup. und der Trochanterspitze wird halbiert, und an dieser Stelle das Resektionsmesser senkrecht bis auf den Darmbeinteller eingestochen. Der Schnitt umkreist die vorderen drei

Viertteile der Peripherie des Trochanters und dringt allenthalben bis auf den Knochen (Fig. 153); es ist gut darauf zu achten, dass die Glutealmuskulatur in senkrechter Richtung durchtrennt werde.

Zieht man die Ränder der Wunde in der Tiefe von einander, so wird die fibröse Kapsel des Gelenkes sichtbar. Ueber der höchsten Vorwölbung




Fig. 153.

Hüftresektion. Aeusserer Bogenschnitt nach Velpeau.

des Schenkelkopfes wird die Kapsel in der Richtung des Hautschnittes, ebenfalls im Bogen, durchgeschnitten, der Limbus eingekerbt und der Schenkelkopf, während das Lig. teres durchtrennt wird, auf das Darmbein luxiert und abgetragen. Soll die Absetzung des Kopfes höher oben, zwischen den Trochanteren oder am Schenkelschaft erfolgen, so müssen die am Trochanter inserierenden Sehnen vom Knochen mit dem Messer abgetragen werden.



Nach Absägung des Kopfes ist das Azetabulum eventuellen Eingriffen zugänglich gemacht.

Das Bein wird in gestreckter Stellung fixiert und aus der Tiefe des Azetabulum ein Drain nach aussen geleitet.

König modifiziert das Langenbeck'sche Verfahren insoferne, als er den Gelenkkopf in situ, ehe er luxiert ist, abmeisselt. Ferner werden die Ansätze der Muskeln am Trochanter major nicht vom Knochen abgelöst, sondern im Zusammenhange mit der Kortikalis des Trochanters an der vorderen und hinteren Seite desselben mit Meissel und Hammer abgetrennt. Lücke-Schede's vorderer Längsschnitt, zieht von der Spina ant. sup. nach unten; an der Aussenseite des N. cruralis wird auf das Gelenk eingedrungen.

Der vordere Querschnitt Roser's hat den Nachteil, dass die Fasern zahlreicher Muskeln dabei quer durchtrennt werden.

### **Resektion des Kniegelenkes mittels eines vorderen Querschnittes.**

Der Operateur umfasst das im Kniegelenke gebeugte Bein am Unterschenkel und verbindet, von links nach rechts schneidend, die prominentesten Punkte der Seitenflächen der Oberschenkelknorren durch einen vorderen, bogenförmigen Schnitt, welcher das Ligamentum patellae propr. halbiert [Textor] (Fig. 154).

Der Schnitt dringt bis in das Gelenk, welches an der Vorderseite ausgiebig eröffnet wird (Fig. 155).

Mit dem Daumen der linken Hand geht der Operateur in den Gelenkspalt zwischen Patella und Femur ein und durchtrennt die Ansätze der Kapsel seitlich an den Knorren des Oberschenkels, worauf durch Umklappen der Patella die sack-

förmige Ausstülpung der Kapsel nach oben übersichtlich freigelegt wird.

Nun werden die Ligamenta cruciata und die seitlichen Verstärkungsbänder der Kapsel durchtrennt. Das untere Femurende ist auf diese Weise freigelegt und wird, nachdem das Periost oberhalb der Kondylen zirkulär umschnitten ist, mit der Langenbeckzange fixiert und quer abgesetzt.




Fig. 154.  
Resektion des  
Kniegelenkes.  
Vorderer Bogenschnitt  
nach Textor.

König legt die Sägeflächen derart an, dass eine leichte Flexionsstellung des Gelenkes resultiert.

Stellt sich die Notwendigkeit heraus, auch die obere Gelenkfläche der Tibia abzusägen, so wird diese aus der Wunde gehoben, zirkulär umschnitten und in Form einer Scheibe abgetragen. Zum Absägen wird dieselbe an der Eminentia intercondyloidea mit der Zange gefasst und fixiert.

Soll die Patella entfernt werden, so wird sie umschnitten und mit dicht am Knochen geführten Schnitten ausgelöst.

Die Sägeflächen der Knochen werden adaptiert und durch Nähte, Klammern oder Stifte aneinander fixiert.




Fig. 155.

**Kniegelenksresektion.** Gelenk mit dem vorderen Bogenschnitt eröffnet.

Nach Volkmann wird der vordere Querschnitt von einem Kondyl zum anderen über die Mitte der Patella geführt. Das Periost wird quer eingeschnitten und die Kniescheibe entsprechend dem Hautsnitte durchsägt; in der Verlängerung des Schnittes durch die Patella wird die Kapsel rechts und links eingeschnitten und das Gelenk

breit eröffnet. Man flektiert nun spitzwinklig, wobei der Schlitz zum Klaffen gebracht wird, und durchtrennt die Seitenbänder, sowie die seitlichen Ansätze der Kapsel.

Die Kreuzbänder werden von rückwärts nach vorne durchschnitten. Durch Zug am oberen Segmente der Patella wird dieses umgeklappt und der Rezessus der Kapsel zugänglich; das untere




Fig. 156.  
Resektion des  
Kniegelenkes.  
Suprapatellarschnitt  
nach Hahn.

Femurende wird zirkulär umschnitten, am inneren Kondyl mit der Zange gefasst und quer abgesägt.

Der Querschnitt wird nach Hahn über der Patella geführt (Fig. 156).

### **Resektion des Kniegelenkes mit lateralem Hakenschnitt nach Kocher.**

Der Schnitt liegt an der Aussenseite des Kniegelenkes und beginnt am *Vastus ext.* handbreit

oberhalb der Patella, zieht zwei Querfinger vom lateralen Rand dieser entfernt nach abwärts und endet unterhalb der Spina tibiae auf der medialen Tibiafläche. In der Wunde wird die Fascia lata gespalten. An der Aussenseite des blossgelegten Vastus ext. wird auf die Gelenkkapsel vorgedrungen und hier das Gelenk eröffnet. Die Tuberositas tibiae wird im Zusammenhange mit dem Lig. patellae propr. abgemeißelt, worauf, wenn die Kapsel in der ganzen Länge des Schnittes geschlitzt ist, durch Verziehung der beweglich gewordenen Patella medianwärts und Umklappung derselben, ein weiter Zugang zum Gelenke resultiert (Tab. 16). Es liegt die synoviale Fläche der Kapsel mit allen Nischen genügend bloss. Ist die Resektion der Gelenkenden erforderlich, so werden die Kreuzbänder durchtrennt, worauf die Knochen nur entsprechend isoliert zu werden brauchen. Vor der Absägung des Femur trennt Kocher die Epikondylen zur Erhaltung der Bandansätze mit dem Meißel ab, so dass sie im Zusammenhange mit dem Periost nach rückwärts verlagert werden können.




Fig. 157. Resektion des Kniegelenkes.  
Hautschnitt nach Kocher.

**Tab. 16. Resektion des Kniegelenkes nach  
Kocher (Rechtes Bein).**

Das Gelenk ist von der Aussenseite her eröffnet. Das Ligamentum patellae proprium ist mit der Tuberositas tibiae (Tu) abgemeißelt, so dass der mediale Wundrand mit der Patella (P) stark nach innen verzogen werden kann. Die Gelenkskonstituentien, Kondylen des Femur (F), oberes Ende der Tibia (Ti) liegen bloss. Die Kapsel ist in allen ihren Nischen genügend zugänglich. Man sieht die Ligamenta alaria (A). Auch die synoviale Tasche unter der Sehne des M. rectus ist übersichtlich freigelegt.

---


**Resektion des Fussgelenkes mit dem bilateralen  
Längsschnitt nach Langenbeck.**

Die Längsschnitte beginnen zu beiden Seiten handbreit über der Knöchelspitze und ziehen längs der Tibia und Fibula jederseits bis über den Knöchel.

Die Schnitte durchdringen Haut und Periost. Die Fibula wird, während der Fuss mit seinem medialen Rande aufliegt, mit dem Messer oder Raspatorium, subperiostal, an ihrer lateralen und der dem Zwischenknochenbande zugekehrten Seite freipräpariert und oberhalb des Knöchels mit Meißel und Hammer, oder mit der Kettensäge linear durchtrennt. Das periphere Fragment der Fibula wird nach aussen umgelegt und aus seinem Gefüge gehoben.

In analoger Weise wird vom tibialen Längsschnitt aus das untere Ende des Schienbeines exziiert. Durch den Wegfall der Knöchel ist ein Einblick ins Gelenk gewonnen, die Talusrolle, sowie die Wände der Kapsel sind eventuellen Eingriffen zugänglich geworden.

Langenbeck hat mit dieser schonenden Methode der Resektion, bei Schussverletzungen des Sprunggelenkes, namentlich queren Schüssen mit Zertrümmerung beider Malleolen die vorzüg-







lichsten Resultate erzielt. Für die moderne Arthrektomie ist die Operation weniger geeignet, da von vorneherein die Unterschenkelgabel geopfert wird und überdies der Einblick, der durch die Schnitte gewonnen wird, nicht in dem Grade, als es zur Exstirpation der Kapsel notwendig wäre, sich erzielen lässt.

### Resektion des Fussgelenkes nach König.

Der Schnitt an der Innenseite beginnt 3—4 cm oberhalb der Gelenkfläche auf der Tibia, nach innen von den Strecksehnen und eröffnet das Gelenk hart am vorderen Rande des Knöchels. Der Schnitt überschreitet den Taluskörper und Hals und endet am medialen Fussrande entsprechend dem Tuber ossis navicularis. Der laterale Schnitt verläuft parallel dem medialen an der vorderen Fläche der Fibula, eröffnet am Knöchel das Gelenk und endet in der Höhe des Talonaviculargelenkes (Fig. 158).

Die vordere Hautbrücke, welche die Strecksehnen, Gefässe und Nerven enthält, wird von der Unterlage abpräpariert, die Kapselinsertion dabei in querer Richtung von der Talusrolle und dem Rande der Tibia abpräpariert und, wenn nötig, die vordere Synovialauskleidung exzidiert. Durch Abhebung des brückenförmigen Lappens, bei dorsalflektiertem Gelenke, können die einzelnen Partien des Gelenkes dem Auge und den Instrumenten zugänglich gemacht werden. Die Entfer-



Fig. 158. Fussgelenkresektion; bilateraler Längsschnitt nach König.

nung des Talus gelingt vom inneren Schnitte aus mit Leichtigkeit, worauf die Gelenkfläche der Tibia und die hintere Kapselwand sichtbar gemacht werden können.

**Resektion des Fussgelenkes mit dem lateralen Bogenschnitt (Luxationsmethode Reverdin-Kocher).**



Fig. 159.

Resektion des Fussgelenkes nach Kocher.  
Hautschnitt,

Der Schnitt beginnt an der Achillessehne, etwa handbreit über dem Malleolus, zieht nach abwärts, umkreist den äusseren Knöchel und endet am lateralen Rande des Fussrückens, entsprechend dem Aussenrande der Strecksehnen (Fig. 159).

Nach Durchtrennung der Haut und Blosslegung des Malleolus externus werden die hier

inserierenden Verstärkungsbänder der Kapsel durchschnitten. Der Ansatz der Kapsel wird unter Abziehung der Strecksehnen und, wenn nötig, Durchtrennung der Peronealsehnen, an der vorderen und hinteren Seite der Tibia abgetrennt, worauf der Fuss über den inneren Knöchel als Hypomochlion derart nach aufwärts geknickt wird, dass er mit seinem medialen Rande an die Innen-seite der Tibia zu liegen kommt (Tab. 17).

Das Gelenk ist auf diese Weise übersichtlich freigelegt, und können die nötigen Eingriffe an den Gelenkenden, wie an der Kapsel vorgenommen werden.

### **Resektion des Fusses nach Wladimiroff und Mikulicz.**

Indikationen:

1. Karies des Fusses mit der Lokalisation Kalkaneus, Talus und der Articulatio talo-cruralis.
2. Ausgedehnte Substanzverluste im Bereiche der Fersenhaut.
3. Verletzungen der Ferse (namentlich durch Schuss).
4. Maligne Tumoren der Fersengegend (Osteosarkom, Melanosarkom) [Bruns].
5. Verkürzung des Beines (nach Hüftluxation [Caselli], nach Kniegelenkresektion [Rydygier]).
6. Paralytischer Spitzfuss [Bruns].

Es wird bei der Resektion entfernt: die Unterschenkelgabel, der Talus, Kalkaneus, ein Teil des Os cuboideum und naviculare im Zusammenhange mit der Haut der Ferse. Der Vorfuss bleibt durch eine dorsale Brücke, welche die Sehnen und Gefässe enthält, in Verbindung mit dem Unterschenkel.

Ausführung: Querschnitt in der Fusssohle entsprechend den Enden der Lisfranc'-

### Tab. 17. Resektion des Fussgelenkes nach Kocher.

Der Fuss ist vollständig über den inneren Knöchel luxiert; das Fussgelenk ist auf diese Weise übersichtlich blossgelegt. Man übersieht die knöchernen Gelenkskonstituentien: Talusrolle (T) und Unterschenkelknochen (U), die Sehnen der Musculi peronei (P) sind durchschnitten. Im Hintergrunde der Wunde die Sehnen der Flexoren (F) und das Bündel der Gefässe, Art. tibialis postica und begleitende Venen (V. t.).

schen Linie; ein zweiter Querschnitt oberhalb der Knöchel an der Hinterseite des Unterschenkels; die Endpunkte beider werden durch seitliche Schnitte miteinander verbunden (Fig. 160).


Das Talokruralgelenk wird von der Rückseite her eröffnet, das Gelenk aufgeklafft und die Unterschenkelgabel supramalleolär quer abgesetzt. Man erfasst die Fusswurzel an der Talusrolle und löst sie bei maximaler Dorsalflexion des Fusses dicht am Knochen von den dorsalen Weichteilen ab.

Je nach den zu entfernenden Teilen sägt man den Tarsus im Bereiche des Os cuboideum und des Kahnbeines, resp. mehr peripher (an den Basen der Metatarsen) oder zentral ab.

Bei den aus orthopädischen Gründen vorgenommenen Operationen entfernt man bloss die Unterschenkelgabel und den Fersenhöcker nebst der Talusrolle.

Indem nach geschעהener Resektion die Sägeflächen des Unterschenkels und des Tarsus aneinander adaptiert und durch Knochennaht fixiert werden, entsteht ein künstlicher Spitzfuss in dem Masse, dass der Fussrücken in direkte Flucht mit der Vorderfläche des Unterschenkels zu liegen kommt (Fig. 161 und 162).

Bei der Resectio tibio-calcanea von Bruns wird das Fussgelenk mit einem dorsalen Bogenschnitt eröffnet, der Talus ausgelöst, die Unterschenkelgabel, sowie die obere Fläche des Kalkaneus quer abgesägt, worauf die Sägeflächen aneinander genagelt werden.





# Resektion des Fusses nach Wladimiroff- Mikulicz.

Fig. 160.  
Hautschnitte.

Fig. 161.  
Konfiguration des Fusses  
nach erfolgter Resektion.  
Die Sägeflächen der Unter-  
schenkelknochen, sowie an-  
dersseits des Os cuboideum  
und des Os naviculare sind  
sichtbar.

Fig. 162.  
Form des Stumpfes.




Fig. 160.



Fig. 161.




Fig. 162.

## IV. Sonstige Operationen an den Extremitäten.

### Resektion der Skapula.

In typischer Weise kann man das Schulterblatt durch *Langenbeck's* Winkelschnitt blosslegen, dessen horizontaler Schenkel ober der Spina verläuft; dem medialen Ende des Schnittes wird der zweite angefügt, der längs des inneren Randes bis an die Spitze des Schulterblattes zieht. Der so umgrenzte Lappen wird nach aussen präpariert, wobei die an der Spina inserierenden Fasern des *M. deltoideus* durchschnitten werden. Um das Schulterblatt aus seinem Gefüge zu heben, müssen zunächst die zum Arme ziehenden Muskeln (*Supra- und Infraspinatus*, *Teres major* und *minor*) durchschnitten werden, worauf das Schultergelenk eröffnet und die Sehne der *Subscapularis* quer durchschnitten wird. Das akromiale Ende der Klavikel wird mit der Fadensäge abgetrennt und nach Durchschneidung des an der *Crista* inserierenden *M. cucullaris*, *Omohyoideus* und *Levator scapulae*, ferner der am medialen Rande angehefteten Fasern des *Serratus anticus* und der *Rhomboidei*, der freigewordene Knochen entfernt. Von Gefässen sind zu unterbinden: am oberen medialen Winkel die *Art. dorsalis scap.*, am *Lig. transversum* die *Art. transversa scap.* und am unteren *Trizeps*rande die *Art. circumflexa scapulae*.

### Operation der Sehnenscheidenhygrome am Handgelenke.

Die umschriebenen, scharf an der Dorsalseite des Gelenkes prominierenden kleinen Geschwülste kann man palliativ zersprengen oder nach subkutaner Spaltung des Balges zer-



quetschen. Ein radikaler Eingriff ist die Exstirpation.

Die Zerspaltung wird bei starker Palmarflexion der Hand durch Schlag mit einem hölzernen Hammer ausgeführt. Das momentane Verschwinden der Geschwulst ist ein Zeichen für den gelungenen Eingriff. Die subkutane Diszission ist bei stärkerem Balge, wenn dieser dem Schläge widersteht, angezeigt. Man sticht ein Tenotom flach zwischen Haut und Balg ein, wendet die Schneide gegen die Oberfläche der Geschwulst, und während man durch Palmarflexion der Hand sich einen straffen Widerstand schafft, schneidet man den Balg ein und entfernt das Messer. Ein mässiger Druck genügt, damit der zähe Inhalt durch die geschaffene Wunde des Balges austritt und sich im subkutanen Gewebe zerteilt.

Die Exstirpation wird unter Blutleere ausgeführt; man muss Sorge tragen, dass die Geschwulst samt ihrem ins Gelenk führenden Fortsatz entfernt werde.

Die Schleimbeutel an den Beugesehnen der Hohlhand enthalten häufig Reiskörner; zur Exstirpation muss man bisweilen das Lig. transvers. carpi volare durchtrennen. Bei Ausführung der Exstirpation muss man dem Nervus medianus aus dem Wege gehen.

### **Operation der Dupuytren'schen Fingerkontraktur.**

Durch ausgiebige Längsinzision oder durch Türflügelschnitt wird die fibröse Masse der Hohlhand übersichtlich blossgelegt. Diese wird in allen ihren Teilen mit Pinzette und Schere exzidiert, bis die Sehnenscheiden der Fingerbeuger in ihrer normalen Konfiguration blossliegen. Nun wird die Hautwunde geschlossen und bei gestreckter Stellung der Finger ein starrer Verband angelegt.

### **Operation des schnellenden Fingers.**

Blosslegung der erkrankten Stelle, die durch Palpation zu ermitteln ist, mittelst palmarem Längsschnitt; man gelangt dabei stets an die Beugesehne eines Fingers. Mit ausgiebiger Eröffnung der Sehnenscheide ist häufig die Heilung angebahnt. In Fällen, in denen eine scharf umschriebene Verdickung sichtbar, kann man diese entfernen. Die Sehnenscheide bleibt unvereinigt. Die Haut wird durch Naht geschlossen.

### **Operation bei Syndaktilie.**

Partielle häutige Verschmelzungen werden einfach blutig durchtrennt. Bei breiteren Verwachsungen müssen Vorkehrungen getroffen werden, um ein Wiederverwachsen der durchtrennten Teile zu verhindern. Man bildet, entsprechend der Grundphalange, ein dreieckiges Läppchen mit peripherer Spitze, trennt die Finger und fügt das Läppchen an der Stelle der normalen Fingerkommissur zwischen die beiden Finger ein (Zeller). Auch kann man zweckmässig die gesetzten Wunden mit Thiersch'schen Läppchen decken. Didot bildet je einen dorsalen und volaren Lappen in der Längsrichtung des Fingers, deren Basen ulnar- resp. radialwärts liegen. Nach blutiger Trennung der Finger deckt je ein Lappen die geschaffene Wunde.

### **Resektion einer Beckenhälfte.**

Wegen Tumoren in vereinzelten Fällen ausgeführt. Nach Kocher zieht der Schnitt von der Kreuzdarmbeinfuge längs der Crista ilei und des Poupart'schen Bandes; es werden die Muskeln bis auf die Fascia transversa durchschnitten, die mit dem Peritoneum weit abgehoben wird. Nun

durchtrennt man unter dem Poupart'schen Bande die Ansätze der an der Spina ant. sup. inserierenden Muskel, weiters die des Glutaeus med. und minimus. Das Hüftgelenk wird an der Vorderseite eröffnet und das Scham- und Sitzbein subperiostal freigemacht. Nach Durchtrennung der Schambeinäste und der Kreuzdarmbeinfuge kann die Beckenhälfte nach abwärts gestürzt werden. Werden noch die Ansätze der Flexoren am Tuber ischii und die zum Kreuzbein ziehenden Bänder durchschnitten, so ist die Exstirpation vollendet. Grössere Gefässe werden nicht durchschnitten. Ausserordentliche Vorsicht ist bei Isolierung von den grossen Beckenvenen erforderlich. Wir haben in einem Falle tödliche Luftembolie bei seitlicher Verletzung der Vena iliaca beobachtet.

### **Operation der angeborenen Hüftluxation.**

Die blutige Operation hat die Aufgabe, den dislozierten Schenkelkopf in die entsprechend vertiefte alte Pfanne zu reponieren und in dieser Stellung fixiert zu erhalten. Hoffa wählt den Langenbeck'schen Schnitt der Hüftresektion (pag. 188), Lorenz einen vorderen Längsschnitt am äusseren Rande des Sartorius, in der Mitte einer Linie, die den Trochanter major mit der Spina ant. sup. ilei verbindet. Hoffa mobilisiert den Schenkelkopf durch Eröffnung des Gelenkes und subperiostale Umschneidung der Muskelinsertionen am Trochanter major und minor. Der Schenkel wird nun durch Zug aus der Beugung in die gestreckte Stellung gebracht. Nur wenn sie ein absolutes Hindernis bilden, sollen die Fascia lata, wie die vom Spina ant. sup. herabziehenden Muskel, subkutan mit dem Tenotom durchtrennt werden.

Ist der Schenkelkopf bis in die Pfannengegend dislozierbar, so wird der Pfannengrund mit schar-

fem Löffel so weit vertieft, dass der Kopf in denselben sich einfügen lässt; vorerst wird auch der Kopf entsprechend zurecht geschnitten. In abduzierter Stellung wird das Bein nach Tamponade der Wunde im Gipsverbande fixiert.

### **Punktion und Inzision des Kniegelenkes.**

Die Punktion wird bei blutigen und serösen Ergüssen, die Inzision und nachfolgende Drainage beim Empyem des Kniegelenkes angezeigt sein.

Die Punktion macht man bei gestrecktem Beine, im oberen Teile des Gelenkes an der prominierenden Stelle zwischen Patella und Condylus ext. Der Troikart wird quer eingestochen, so dass seine Spitze in den weiten Raum zwischen Patella und den Kondylen dringt.

Die Eröffnung des Kniegelenkes mittelst Schnitt wird zur Erleichterung der Drainage in der Regel zweiseitig an korrespondierenden Stellen des Kniegelenkes vorgenommen. Man wählt die Stellen neben der Patella, wo man mittelst einer je 3—4 cm langen Inzision auf das Gelenk eindringt.

Durch Verlängerung der Schnitte nach aufwärts kann man, wo dies nötig erscheint, die Kapselausstülpung unter den Vastis eröffnen.

In der Regel genügen die kurzen Inzisionen, durch welche Drainröhren eingeführt werden, und die nachfolgende Spülung des Gelenkes. Bei ausgiebigen Inzisionen kann man überdies das Gelenk mit Gaze locker tamponieren.

### **Osteomien am Oberschenkel.**

Als Osteotomie bezeichnet man die blutige lineare Durchtrennung langer Röhrenknochen.

Ursprünglich in offener Wunde vorgenommen, wird die Osteotomie seit Langenbeck ähnlich der Tenotomie von einem kurzen Hautschnitte aus, gewissermassen subkutan ausgeführt. Zur Durchtrennung der Knochen dienen Bildhauermessel.

Die Extremität wird auf ein Brett, auf Sandkissen gelagert und ein Esmarch'scher Schlauch angelegt. Ein kurzer Weichteilschnitt dringt bis auf den Knochen, dessen Kortikalis sukzessive fast im ganzen Umfange quer durchtrennt wird. Der Rest erhaltenen Knochens wird manuell gebrochen und das Bein nach Vereinigung der Hautwunde in richtiger Stellung fixiert. Wo die einfache lineare Trennung nicht genügt, wird zur Korrektur von Verkrümmungen die keilförmige Exzision vorgenommen. Die Basis des Keils entspricht stets der Konvexität der zu behebenden Krümmung.

Die **Osteomia femoris** am oberen Ende des Knochens wird bei Kontrakturen der Hüfte vorzunehmen sein, wenn die Korrektur der Stellung auch nach Durchtrennung der hemmenden Sehnen und Muskeln noch auf Schwierigkeiten stösst. Die lineare Durchtrennung wird hier entweder am Schenkelhalse, *Osteotomia colli femoris*, oder zwischen den Trochanteren, *Osteotomia intertrochanterica*, ausgeführt. Das obere Femurende wird durch einen über dem Trochanter major angelegten Längsschnitt an der hinteren äusseren Gelenksseite blossgelegt. Von hier aus kann sowohl der Schenkelhals, als nach Ablösung der Muskelansätze am Trochanter, ein tieferer Anteil des oberen Femurendes zur Osteotomie freigelegt werden.

Bei *Genu valgum* wird die Osteotomie

nach Mac Ewen dicht oberhalb des Kniegelenkes ausgeführt. Der Hautschnitt wird an der Medialseite des unteren Femures suprakondylär an einer Stelle angelegt, die der Kreuzung zweier Linien entspricht, von denen die eine querfingerbreit über dem oberen Rande des inneren Kondyls verläuft. Die zweite Linie zieht in der Längsrichtung des Beines zwei Querfinger vor der Sehne des Adductor magnus. An der Kreuzungsstelle beider Linien wird ein kurzer Längsschnitt bis auf den Knochen geführt, der Meissel dem Knochen quer aufgesetzt und dessen Rinde so weit als möglich zirkulär durchschnitten. Der Rest wird manuell gebrochen. Die suprakondyläre Osteotomia femoris kann füglich auch an der Aussen- seite des Knochens zur Ausführung kommen.

### **Operation bei Varizen und Unterschenkelgeschwüren.**

Von Trendelenburg ist bei Varizen die Unterbindung der Vena saph. magna ausgeführt worden. Die Vene wird am Oberschenkel, etwa an der Grenze zwischen mittlerem und oberem Drittel blossgelegt. Man kann gewöhnlich die stark geschlängelte Vene an der Innenseite des Schenkels durch die Haut wahrnehmen. Sie liegt im Unterhautfettgewebe und wird durch kurzen Längsschnitt freigelegt und isoliert; oft sind es mehrere Venenstämme, die hier parallel verlaufen. Sie werden nach Elevation des Beines doppelt unterbunden und zwischen den Ligaturen exzidiert, die Hautwunde wird durch Naht geschlossen. Von langen Hautschnitten aus sind wiederholt (Langenbeck, Madelung) mit Erfolg grössere Strecken der Vena saphena magna im Bereiche des Unter- und Oberschenkels ausgeschnitten worden. Petersen umschneidet, um

alle oberflächlichen Venen zu erreichen, das Bein zirkulär und durchtrennt alle im Bereiche des Schnittes erreichbaren subkutanen Venenstämme.

Die genannten Operationen an den Venen sind auch für die Behandlung von Unterschenkelgeschwüren wirksame Mittel. Zur Erleichterung der Ueberhäutung wird es bei derben kallösen Geschwüren überdies nötig sein, die Ränder zu mobilisieren. Dies geschieht am wirksamsten durch Umschneidung. Die Geschwüre werden 2—5 cm vom Rande entfernt, durch tiefe Schnitte umkreist. Die Wiederverheilung verhindert man durch Einlegen von Gaze in den Wundspalt.

### **Operationen beim Klumpfuss.**

Beim Klumpfuss der Kinder genügen in der Regel die redressierenden Verfahren, eventuell die Achillotenotomie oder die Durchtrennung der Plantaraponeurose. In den schweren Formen von Klumpfüßen Erwachsener sind eingreifendere Operationen erforderlich.

Nach Phelps werden in offener Wunde, an der Innenseite des Fusses, Bänder, Sehnen und Muskeln durchschnitten. Die Operation beginnt mit der Achillotenotomie. Der Schnitt zieht über die stärkst gespannte Partie, medial den Fussrand kreuzend, bis in die Planta pedis. Die Sehnen des M. tibialis post., flexor digit., flexor hallucis werden durchschnitten, ebenso tiefere Bänder und, wenn nötig, auch die Osteotomie am Talushalse ausgeführt. Das Redressement ist nun leicht. Die Wunde wird tamponiert und der Fuss korrigiert im Verbande festgestellt.

Zur Keilexzision aus dem Tarsus wird an der Konvexität des Fusses über der grössten Wölbung ein Längsschnitt geführt. Die Weich-

teile müssen dorsal und plantar vom Skelette gelöst werden, worauf ohne Rücksicht auf die Grenzen der Tarsusknochen ein Keil von entsprechender Grösse mit Meissel und Hammer ausgeschnitten wird. Nach Entfernung desselben muss die Abduktion des Fusses in gewünschtem Masse möglich sein.

Die Exstirpation des Talus wird am zweckmässigsten von einem ausgiebigen Längsschnitte an der äusseren vorderen Seite des Fusses vorgenommen. Derselbe beginnt an der Fibula, zieht eine Strecke längs dieser und dem Rande des Talus bis an das Ende des Metatarsus V. Vom Schnitte aus gelingt es leicht, das Fussgelenk und die *Articulatio talo-navicularis* zu eröffnen. Die zugänglichen Ansätze der Gelenkkapsel des Fussgelenkes werden in möglichster Ausdehnung abgetrennt. Nach Lösung der *Ligamenta talo-fibulare ant. und post.* und des Bandapparates im *Sinus tarsi* lässt sich bei starker Adduktion des Fusses der Talus nach aussen drehen und nach Durchtrennung der Verbindungen zum Kalkaneus entfernen.

Die Gabel des Unterschenkels wird an die Gelenkfläche des Kalkaneus gepasst, und in dieser Stellung der Verband angelegt.

### Operation beim Plattfuss.

Nach Trendelenburg wird in schweren Fällen die *supramalleoläre Osteotomie* am Unterschenkel ausgeführt. Ein kleiner Längsschnitt wird jederseits über dem Knöchel angelegt. Tibia und Fibula werden nach Ablösung des Periosts mit schmalen Meisseln quer, knapp ober den Malleolen durchmeisselt, worauf die Stellungskorrektur des Fusses und Fixierung desselben erfolgt.



### **Operation des eingewachsenen Nagels.**

Die Operation besteht in halbseitiger Exzision des Nagels an der erkrankten Seite und nachfolgender Ausschneidung oder Ausschabung der erkrankten Matrix.

Unter lokaler Anaesthesie und Esmarch'scher Blutleere wird die spitze Bransche einer kräftigen Schere unter den freien Rand der Mitte des Daumennagels eingestochen, entsprechend weit vorgeschoben und nach Drehung der Schere mit einem kräftigen Schlage der Nagel vom Rande bis zur Basis durchtrennt. Die eine Bransche einer sperrbaren Zange wird an der kranken Seite unter die Nagelhälfte geschoben; ist das Instrument geschlossen, so kann der Nagel über den äusseren Falz gedreht und aus seinem Bette gehoben werden. Die blossliegende Geschwürsfläche kann nun exziiert, mit dem Paquelin verschorft oder ausgelöffelt werden.

### **Tenotomie der Achillessehne.**

Zur subkutanen Tenotomie wird das Messer (Tenotom) durch die Haut eingestossen und die Sehne entweder in der Richtung gegen die Haut oder umgekehrt durchschnitten.

Im ersteren Falle umfasst der Operateur das Tenotom, wie ein Messer zum Schälen einer Frucht, mit den gebeugten vier Fingern der rechten Hand, während der Daumen an der Ferse eine Stütze findet (Fig. 163), und führt es von rechts nach links unter die Sehne.

Die Sehne wird nun passiv gespannt und mit kurzen, ruckenden Bewegungen des Messers gegen den als Widerhalt, der Sehne aufgesetzten Daumen durchtrennt. (Fig. 164.)

Ein Ruck, mit welchem die Sehnenenden auseinanderweichen, ist das Zeichen für die erfolgte totale Durchtrennung der Sehne.




### Achillotomie.

Fig. 163. Das Tenotom ist bei erschlaffter Sehne unter diese geführt.

Anders wird das Tenotom gefasst, wenn die Sehne von aussen nach innen durchtrennt werden soll. Es wird die Position derart gewählt, dass die Sehne vollkommen erschlafft ist. Das Messerchen wird zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger gefasst und flach von rechts nach links zwischen Haut und Sehne eingeführt (Fig. 17); so befindet

sich diese unter der Schneide des Messers, und es wird die Sehne, während der Assistent sie durch eine entsprechende Bewegung des Gelenkes in maximale Spannung versetzt, vermittelt leichter, ruckender Bewegungen durchschnitten.



#### Achillotenotomie.

Fig. 164. Bei gespannter Sehne wird diese in der Richtung gegen die Haut durchschnitten. Der Daumen der operierenden Hand ruht der Sehne auf.

# Operationen am Kopfe und Halse.

## Trepanation.

Wir verstehen unter Trepanation die Resektion aus der Kontinuität der Schädelknochen.

Ob es sich nun um die Exzision kleiner, kreisförmiger Stücke und Etablierung eines penetrierenden Schädeldefektes handelt, oder ob ein Stück des Knochens im Zusammenhange mit dem Perioste und der Haut temporär ausge-meißelt wird, so sprechen wir von Trepanation, ebenso wie wenn es sich bei Verletzungen des Schädels darum handelt, lose, deprimierte Splitter zu entfernen, die eingedrückte Kalvaria zu heben oder den Defektrand zu glätten.

### Indikationen:

1. Verletzungen des knöchernen Schädels, offene oder subkutane Frakturen, wenn die Knochen Depression zeigen, wenn die Lamina vitrea gesplittert ist, wenn Fremdkörper in den Knochen eingedrungen sind.

2. Verletzungen des Hirns und seiner Häute, wenn die Hirnsubstanz zertrümmert ist, wenn Knochenfragmente oder Fremdkörper in das Hirn eingedrungen sind, endlich, wenn die Erscheinungen auf einen bedeutenden intrakraniellen Bluterguss hinweisen.

3. Karies und Nekrose der Schädelknochen.

4. Tumoren des knöchernen Schädels.

## 5. Eitrige Entzündungen der Hirnhäute, Hirnabszess, Sinusthrombose.

Ferner wird die Eröffnung des Schädels vorgenommen, wenn es sich darum handelt, die Hirnventrikel zugänglich zu machen, oder Rindenfelder des Hirns zur Exzision (bei Epilepsie) blosszulegen. Auch bei chronischen intrakraniellen Drucksteigerungen, bei Mikrocephalie und Idiotismus sind Trepanationen empfohlen worden.

Im allgemeinen wird die Operation derart vorgenommen, dass nach Spaltung der Schädeldecke der Galea aponeurotica und das Perikranium aus dem Knochen mit der Trepankrone, dem Meissel und Hammer, oder der Zirkularsäge ein entsprechendes Stück ausgeschnitten wird.

Die blossgelegte Dura wird entweder kreuzförmig eingeschnitten oder als Lappen zurückgeschlagen, nach Vornahme des intrakraniellen Eingriffes wieder durch Katgutnähte geschlossen.

Der gesetzte Defekt im Knochen bleibt entweder offen, oder er wird verschlossen.

Im ersteren Falle, in dem die Haut zur Deckung des Knochendefektes verwendet wird, resultiert ein bindegewebiger Verschluss der Knochenslücke, ein Ereignis, welches verschiedene Unzukömmlichkeiten im Gefolge hat.

Es ist demnach zur Regel geworden, wo dies die Natur des Falles erlaubt, den Trepanationsdefekt stets knöchern zu verschliessen.

Dies können wir erreichen:

1. durch Reimplantation des ausgesägten Knochens;
2. durch Auto- und Heteroplastik;
3. durch die von vorneherein an Stelle der typischen Trepanation vorgenommene temporäre Resektion der Schädelknochen.

Die Einheilung des Knochens dürfte heute bei aseptischem Operieren in allen Fällen gelingen, ist doch die Reimplantation mit Erfolg schon von Ph. v. Walter vorgenommen worden.

Die Autoplastik, ein sinnreiches Verfahren Königs, besteht darin, dass auf den Defekt ein gestielter Lappen transplantiert wird, der aus Haut, Periost und der abgemeisselten Kortikalis des Knochens besteht.

Der durch die Bildung des Lappens entstandene Defekt wird mit einem gestielten, der nächsten Umgebung entnommenen Hautlappen gedeckt.

Bei der Heteroplastik wird in den Knochendefekt ein Fremdkörper eingefügt, der zur Einheilung kommen soll. A. Fränkel hat zu diesem Zwecke mit gutem Erfolg Platten aus Zelluloid in Anwendung gebracht.

### Ausführung der Trepanation.

#### 1. Mit dem Trepan.

Die Kopfschwarte wird linear (in radärer Richtung) oder in Form eines Lappens (mit unterer Basis) umschnitten; ist das Periost durchtrennt, so lässt es sich mittelst des Raspatoriums in entsprechender Ausdehnung vom Knochen abheben. Der Trepan (Fig. 165), ein Hohlzylinder




Fig. 165. Trepan.

mit gezähntem Rande, wird dem Knochen aufgesetzt. Die Achse der Trepankrone, ein Stahlstachel, wird zunächst in den Knochen gebohrt und sichert die gleichmässig feste Lage des Sägeblattes. Durch rotierende Bewegungen der Trepankrone dringt diese in den Knochen ein.

Haben nach den ersten Drehungen die Zähne in den Knochen eingegriffen, so wird bei vermindertem Druck gleichmässig in die Tiefe vorgeedrungen. Die Sägefurche wird oft gereinigt und auf ihre Tiefe untersucht. Ist das Knochenfragment lose, so wird es mit dem Trefond, einem bohrerähnlichen Instrumente, gefasst und emporgehoben. Mit dem Lentikulare (Linsenmesser) wurde ehemals der Rand der Lücke geebnet. Wird die Knochenlücke als zu klein befunden, so kann man sie mit Meissel und Hammer erweitern, oder mit dem Trepan in der nächsten Nähe ein zweites Loch aussägen.

## 2. Mit Meissel und Hammer.

Der Operation mit der Trepankrone insofern überlegen, als man Form und Grösse des anzulegenden Defektes den jeweiligen Bedürfnissen anpassen kann. Die Schädelschwarte wird linear durchtrennt, oder in Form eines Lappens mit unterer Basis vom Knochen samt dem Perioste abpräpariert und zurückgeschlagen. Man konturiert mit dem Meissel den Rand des anzulegenden Defektes und vertieft diesen allenthalben gleichmässig. In der Meisselfurche kann man mit der Sonde tastend stets genau bestimmen, an welcher Stelle die Lamina vitrea bereits passiert ist. Ist die Knochenscheibe frei, so wird sie mit dem Elevatorium aus dem Defekte gehoben.

Atypisch ist der Vorgang, wenn die Operation bei Frakturen des Schädels vorgenommen wird.

Die Weichteile werden wie oben durchschnitten; völlig lose in das Hirn eingedrungene Knochenfragmente sind zu entfernen, deprimierte Knochenstücke sind zu heben, spitze Teile des Knochenrandes werden abgekneipt etc. Zur Hebung und Abtragung von Knochenfragmenten bedienen wir uns der Luer'schen Hohlmeisselzange (Fig. 166); zur Erweiterung von Spalten im Knochen dienen hier ausschliesslich Meissel und Hammer.




Fig. 166.  
Luer'sche Hohlmeisselzange.

### Die Osteoplastische Resektion des Schädeldaches.


Die temporäre Resektion des Schädels (Wagner, Wolff, Ollier) hat in neuerer Zeit die klassische Trepanation fast völlig verdrängt.

Bei Anwendung dieser Methode bleibt die ausgesägte oder ausge-meisselte Knochenscheibe in ihrer natürlichen Verbindung mit dem Perioste und der Schädelschwarte; nach vollendeter Operation wird der Knochenweichteillappen wieder in seiner ursprünglichen Lage zur Einheilung gebracht.

Wagner umschneidet die Haut in Form einer Lyra oder eines Omega,  $\Omega$ -förmig; der Schnitt dringt allenthalben bis auf den Knochen. Entsprechend dem Kreisbogen wird eine



Furche in den Knochen gemeißelt und mittelst Meißel und Hammer sukzessive bis auf die Dura vertieft. An der Basis wird, der schmalsten Stelle



### Osteoplastische Resektion am Schädel.

Fig. 167.

Der Knochenlappen ist im Zusammenhange mit der Haut aufgeklappt. Man übersieht die harte Hirnhaut mit den Ramifikationen der Art. meningea media.

entsprechend, mit je einem Meisselschlage der Knochen durchtrennt, worauf der Hautperiostknochenlappen aufgeklappt werden kann (Fig. 167).

Nach Ausführung des intrakraniellen Eingriffes wird der Knochen in den Defekt abermals eingefügt und die Hautwunde durch Naht verschlossen.

Ursprünglich (Wagner) wurde bei der Schädelresektion der Knochen stets mit Meissel und Hammer durchtrennt. Um die Nachteile dieser




Fig. 168.  
Dahlgren'sche Zange.

Methode, namentlich die Erschütterungen des Schädels zu vermeiden, wurde von Salzer die Kreissäge in Anwendung gebracht. Da sich bei dieser nicht in jedem Momente die Lage, in welcher die Säge schneidet, bestimmen lässt, wurde zur Verhütung von Verletzungen der Dura und des Hirns zunächst mit der Zirkularsäge nur eine tiefe Rinne in den Knochen gesägt und die Vitrea mit Meissel und Hammer durchschlagen.

Mit der Fadensäge, mit schneidenden scherenförmigen Instrumenten (Dahl-

gren'sche Zange) [Fig. 168], mit der Sudeck'schen Fraise lässt sich der Knochen ohne jede Erschütterung durchschneiden. Für alle diese Methoden muss, um dem Instrumente einen Angriffspunkt zu geben, der Knochen angebohrt werden. Für die Drahtsäge sind mehrere Löcher in der Linie des zu bildenden Lappens anzulegen. Für die anderen Methoden genügt ein Bohrloch als Ausgangspunkt des Knochenschnittes.




Fig. 169.

Osteoplastische Schädelresektion mittelst der Drahtsäge nach Obalinsky.

Während der Lappen am Schädel in der Regel nur von beschränkter Grösse angelegt wird, hat Doyen in ausgedehntester Masse die Schädeldecke temporär reseziert, um auf diese Weise eine ganze Hirnhemisphäre zugänglich zu machen. Der Schnitt zieht von der Nasenwurzel über den Scheitel zum Hinterhaupteck, von da zur Ohrwurzel bis an das Jochbein. Doyen legt im Bereiche des Schnittes mit Vermeidung des Sinus longitudinalis Bohrlöcher an und durchtrennt die Brücken mit der elektrischen Kreissäge. Die Schläfenschuppe wird gebrochen und der Knochen aufgeklappt.

### Bestimmung der Trepanationsstellen am Schädel.

Es gibt zahlreiche Methoden, um die chirurgisch wichtigen Punkte des Hirns, wie die Zentralfurche, die Sylvi'sche Spalte, die Aeste der Arteria meningea media an die Oberfläche des Schädels zu projizieren und auf diese Weise die Operationsstelle genau bestimmen zu können.

Heutzutage, da man durch osteoplastische Resektion grössere Partien des Hirns blosszulegen vermag, sind die minutiösen Bestimmungen nicht mehr von jener Bedeutung wie ehemals.

Krönlein hatte das Bestreben, die absoluten Zahlenwerte zur Ortsbestimmung durch Werte zu ersetzen, die den Grössenverhältnissen des Schädels proportional, im konkreten Falle mit diesen variieren.

Die Krönlein'sche Formel, welche als die einfachste hier angeführt werden soll, ermöglicht auf Grund einer geometrischen Konstruktion, ohne Zuhilfenahme von Zahlen, die wichtigsten Ortsbestimmungen am Schädel.

Man benötigt dazu (Fig. 170, Fig. 171):

1. Die horizontale Ohr-Orbital-  
linie (durch den Infraorbitalrand und  
Gehörgang);
2. die horizontale Supraorbital-  
linie (parallel der ersteren durch den  
Supraorbitalrand);
3. die vordere Vertikale (von der  
Mitte des Jochbeins senkrecht auf die Ho-  
rizontale);
4. die mittlere Vertikale (durch das  
Kiefergelenk, parallel der ersteren);
5. die hintere Vertikale (vom hinter-  
sten Punkte des Warzenfortsatzes).




Fig. 170.

Krönlein'sches Schema zur Kranio-zerebralen  
Topographie.

Die schiefe Linie von der Kreuzung der oberen Horizontalen und vorderen Vertikalen zur Kreuzung der hinteren Vertikalen und sagittalen Medianlinie am Scheitel gibt die Richtung der Zentralfurche. Die Halbierungslinie des Winkels zwischen dieser Rolando'schen Linie

und der oberen Horizontalen gibt die Richtung der Sylvi'schen Spalte. Die Kreuzungsstellen der mittleren und hinteren Vertikallinien mit




Fig. 171.

Krönlein'sches Schema zur Kranio-zerebralen  
Topographie,  
auf die Oberfläche des Gehirns projiziert (nach Krönlein).

der oberen Horizontalen entsprechen den Krönlein'schen Trepanationsstellen für Aufsuchung der *Art. meningeae media*. Das von der mittleren und hinteren Vertikalen mit der Supra- und

Infraorbitallinie begrenzte Feld entspricht der Bergmann'schen Trepanationsstelle für den otitischen Hirnabszess im Schläfenlappen.




Fig. 172.

Trepanation des Warzenfortsatzes.

Man sieht in der blossgelegten Höhle den Zugang zum Antrum.  
Lateralwärts den Sinus sigmoideus.

Die geringen Abweichungen, die sich bei den verschiedenen Hirntypen ergeben, haben, wie Krönlein erweisen konnte, für die obigen Ortsbestimmungen keine praktische Bedeutung.

Kochers Kraniometer besteht aus 4 Stahl-

Zuckerkandl, Operationslehre.

15

spannen, deren eine quer ober der Ohrmuschel um den Kopf gelegt ist; die zweite verläuft in der medianen Sagittalebene von der Glabella zum Höcker des Hinterhauptes; auf dieser ist eine dritte Spange drehbar zur sagittalen Spange angebracht; endlich zieht eine vierte, an der Glabella drehbar, schief um den Schädel zur Spitze der Lambdanaht. Vermittelst des Apparates lassen sich am rasierten Kopfe, Linien, den chirurgisch wichtigen Punkten der Hirnoberfläche entsprechend, markieren.

Steht die Meridianspange (3) in der Mitte der sagittalen und ist  $60^0$  nach vorne gedreht, so entspricht ihre Richtung der Praeentralfurche. Durch Dreiteilung der Praeentrallinie erhält man die Einmündungen der Sulci frontales.

Bildet die Meridianspange nach rückwärts einen Winkel von  $60^0$ , so gibt ihre Kreuzung mit Spange 4 die Grenze zwischen Temporal- und Okzipitallappen.

### **Trepanation des Warzenfortsatzes.**

Die Operation wird gemacht bei akuter Mittelohrentzündung, bei chronischen Mittelohreiterungen, bei Cholesteatom, Fistelbildungen, Karies und Nekrose. Je nach der Ausbreitung des Prozesses wird bloss die Eröffnung der Zellen des Warzenfortsatzes vorgenommen, oder an diese die operative Freilegung aller Mittelohrräume (Küster, Zaufal, Stacke) angeschlossen.

### **Eröffnung der Zellen des Warzenfortsatzes.**

Retroaurikulärer Längsschnitt über den Warzenfortsatz durch die Haut, Periost, bis auf den Knochen (Fig. 172). Das Periost wird nach beiden



Seiten vom Knochen abgehebelt und der Warzenfortsatz so in entsprechender Ausdehnung freigelegt. Man meisselt in die Kortikalis hinter der äusseren Gehörgangsöffnung, knapp nach aussen von der Spina supra meatum eine ovale Lücke von 15—20 mm Durchmesser. Vorsichtig Schritt für Schritt, den kleinen Hohlmeissel gebrauchend, dringt man in die Tiefe vor. Man hat die Aufgabe, alles eitriges Gewebe im Knochen freizulegen und mit Meissel und Hammer, auch mit dem scharfen Löffel eine von gesunden Wänden ausgekleidete Höhle herzustellen. Beim Vorgehen in die Tiefe soll man sich parallel der hinteren oberen Wand des knöchernen Gehörganges halten. Beim senkrechten Eingehen in die Tiefe läuft man Gefahr, den Sinus transversus zu verletzen. Nach oben zu kann man durch das Tegmentum tympani in den Schädel gelangen, nach unten zu verletzt man den Nervus facialis. Die Richtung des Wundkanals ist also nach vorne, der hinteren oberen Gehörgangswand folgend.

Bei Kindern wird die Trepanationslücke entsprechend kleiner angelegt.

Die Wunde bleibt offen.

### **Operative Freilegung der Mittelohrräume.**

Hautschnitt und Blosslegung des Warzenfortsatzes wie im vorigen Falle.

Der häutige Gehörgang wird vom Knochen abgelöst und mit der Ohrmuschel stark nach vorne verzogen.

Die Zellen und der Zugang zum Antrum werden in der früher angegebenen Weise blossgelegt. Durch schichtweise Abtragung der das Antrum deckenden hinteren oberen Gehörgangswand wird die Paukenhöhle, der Recessus epitympanicus zugänglich gemacht.

Recessus, Antrum und Hohlraum des Warzenfortsatzes stellen so eine weit offene Höhle dar. In Antrum ist die Eminentia arcuata des lateralen Bogenganges, unterhalb dieser der Kanal des Nervus facialis, am Warzenfortsatz der Sinus sigmoideus sichtbar (Fig. 173).




Fig. 173.

**Die eröffneten Mittelohrräume**  
(nach einem Präparate von Hofr. Politzer).

Die vordere Wand des Warzenfortsatzes ist abgetragen, ferner ist die hintere obere knöcherne Gehörs wand abgemeißelt. Der Hohlraum des Warzenfortsatzes Antrum tympanicum und Recessus epitympanicus stellen einen weiten kommunizierenden Raum dar. Im Antrum sieht man die Eminentia arcuata des lat. Bogenganges, darunter den Canalis nervi facialis, und an der Pars mastoidea den Sinus sigmoideus.

Die Wunde bleibt offen; nach longitudinaler Spaltung des knorpeligen Gehörganges lassen sich aus diesem zwei Lappen formen, die, in die Wundhöhle geschlagen, hier zur Anheilung kommen und die raschere Ueberhäutung der grossen Höhle ermöglichen.

Stacke dringt direkt, nicht auf dem Wege der Höhle des Warzenfortsatzes, in den Recessus epitympanicus vor. Von da aus wird das Antrum eröffnet.

Retroaurikulärer Hautschnitt. Der häutige Gehörgang wird abgelöst, durchschnitten und mit der Ohrmuschel nach vorne abgezogen.

Nach Entfernung des Hammers und des Trommelfellrestes wird unter dem Schutze eines schmalen Raspatoriums, welches hoch in den Attik eingeführt wird, die äussere und untere Wand des Recessus epitympanicus abgetragen, der Ambos entfernt, worauf nach Abmeisselung der hinteren oberen Gehörgangswand das Antrum zugänglich ist. Ist auch die Kortikalis abgemeisselt, so liegt der ganze Mittelohrraum frei.

Zur Wundversorgung dient eine Plastik mit Hilfe des häutigen äusseren Gehörganges. Dieser wird (Stacke) der Länge nach gespalten und zu einem viereckigen Lappen umgewandelt, der auf die Wundfläche fixiert wird.

Ist der Sinus transversus mitbeteiligt, so wird er in derselben Wunde freigelegt. Durch Probepunktion lässt sich feststellen, ob der Sinus thrombosiert ist oder Eiter enthält; in diesen Fällen wird der Blutleiter breit eröffnet und nach Ausräumung tamponiert.

Stellt sich bei Hirnsymptomen nach Mittelohreiterungen die Notwendigkeit heraus, die Schädelhöhle zu eröffnen, so führt der Weg zu dieser durch den in typischer Weise blossgelegten Mittelohrraum. Häufig weist die Knochenusur da

den einzuschlagenden Weg. Ist dies nicht der Fall, so muss man, um an den Schläfenlappen, den häufigsten Sitz des otitischen Hirnabszesses, zu gelangen, von der Höhe der Wölbung des Antrum, aus dem Tegmentum ein umschriebenes Stück ausmeisseln. Ist der Eiter extradural, so fliesst er nach der Trepanation ab; zur Auffindung eines Hirnabszesses muss man zur explorativen Punktion oder zur Inzision des Hirns greifen. Die Höhle wird tamponiert, die Wunde bleibt offen.

Um das Kleinhirn zu erreichen, wird die Knochenlücke nach aussen vergrössert, bis der Sinus und ein Teil der Dura unter diesem ausreichend freiliegen. Wird die letztere hier gespalten, so ist das Kleinhirn zugänglich gemacht.


Die Blosslegung des Sinus transversus zum Zwecke der Spaltung und Ausräumung bei Thrombose ergibt sich aus den oben angeführten Regeln für die Trepanation des Warzenfortsatzes.

### **Eröffnung des Sinus frontalis.**

Die Eröffnung der Stirnbeinhöhle ist angezeigt bei Eiteransammlungen und Geschwülsten im Hohlraum derselben.

Die Stirnbeinhöhlen (Fig. 174), durch ein Septum von einander getrennt, erstrecken sich in der Regel weit in den Orbitalteil des Os frontis, doch sind sie, was Form und Ausdehnung anlangt, grossen individuellen Verschiedenheiten unterworfen.

Am sichersten gelangt man in die Höhlung, wenn man knapp oberhalb des Augenbrauenbogens entsprechend dem Arcus superciliaris eingeht (Fig. 175). Bogenförmiger Schnitt durch die Weichteile bis auf den Knochen. Die Nervi frontalis und supraorbitalis werden dabei durchschnitten. Das Periost wird abgehoben und am



**Fig. 174.**  
**Stirnbeinhöhle**  
 (nach einem Präparate von Hofrat Zuckerkandl).



**Fig. 175. Trepanation der Stirnbeinhöhle.**

inneren Ende des Arkus mit dem Meissel, dem Trepan oder Bohrer die Kortikalis durchbohrt und die Schleimhaut der Höhle, d. i. die vordere Wand des Sinus, gespalten. Die Lücke wird je nach dem Zwecke, dem die Operation dienen soll, verschieden gross angelegt.

Die Drainage der Stirnhöhle lässt sich mittelst eines Rohres nach der Nase bewerkstelligen, wobei die Hautwunde komplett geschlossen werden kann.

Bei chronischen Eiterungen wird nach Kilian der Schnitt längs der Augenbraue, im Bogen zur Nasenwurzel und zum Stirnfortsatz des Oberkiefers geführt. Mit Hilfe dieses ausgedehnten Schnittes lassen sich ausser der Stirnhöhle durch Resektion des Stirnhöhlenbodens, die Zellen des Siebbeins, selbst die Höhle des Keilbeins zugänglich machen.

Die Drainage erfolgt gegen die Nase. Die äussere Wunde wird durch Naht geschlossen.

## **Operationen an den Kiefern.**

### **Eröffnung der Oberkieferhöhle.**

Bei Empyem und chronischem Hydrops des Antrum Highmori angezeigt.

Man kann die Höhle des Oberkiefers

1. von der Fossa canina,
2. von der Nasenhöhle,
3. durch den Processus alveolaris eröffnen.

Um das Antrum von der Fossa canina aus zu eröffnen, wird bei emporgezogener Oberlippe, entsprechend dem II. Praemolaris, an der Umschlagstelle von diesem zum Oberkiefer die Schleimhaut 2—3 cm lang quer eingeschnitten. Schleimhaut und Periost müssen auf kurze Strecke

im Bereiche der Wunde vom Knochen abgelöst werden, bis ein entsprechendes Stück dieses vorliegt. Hier wird mittelst des Bohrers, Trepans oder mit dem Hohlmeissel eine Lücke in den Knochen gebohrt und nach Diszission der Schleimhaut die Höhle eröffnet (Fig. 176). Je nachdem das




Fig. 176.

Eröffnung der Oberkieferhöhle von der Fossa canina.

Empyem frisch oder älter ist, wird eine kleinere oder grössere Lücke im Knochen erforderlich sein.

Durch den *Processus alveolaris* wird die Kieferhöhle entsprechend dem zweiten Backzahn oder ersten Mahlzahn eröffnet. Die Wurzel des betreffenden Zahnes wird zunächst extrahiert, und mit einem bohrerartigen Instrumente

(Hajek) dringt man durch die Alveole in die Oberkieferhöhle ein. Eine Verschlussplatte mit einem den Kanal ausfüllenden Stift, der bis in die Kieferhöhle reicht, muss oft lange Zeit, bis die Heilung abgeschlossen ist, getragen werden.

Vom unteren Nasengange wird die Eröffnung der Kieferhöhle mit einem gekrümmten Troikart vorgenommen. Das Instrument wird unter Leitung eines Spekulum bis in die Mitte des unteren Nasenganges geführt, mit der Spitze nach auswärts gegen die laterale Nasenwand gekehrt und mit einem Rucke durch diese in die Höhle gestossen. Der Troikartstachel wird entfernt und die Kanüle zur Ausspülung der Höhle verwendet.

### **Resektion des Oberkiefers.**

Der Oberkiefer wird partiell oder in toto entfernt, wenn er der Sitz einer Geschwulst ist.

Die temporäre Resektion des Oberkiefers kann vorgenommen werden, wenn es sich darum handelt, den Nasenrachenraum oder die Fovea sphenomaxillaris, die Schläfengrube, zum Zwecke der Vornahme von operativen Eingriffen blosszulegen.


Der Oberkieferkörper trägt drei Fortsätze, mittelst welcher er an die benachbarten Knochen des Skelettes gefügt ist.

Die Gaumenplatte (Proc. palatinus) stösst in der Medianlinie an die Gaumenplatte der anderen Seite. Mit dem Stirnfortsatz grenzt der Oberkiefer an das Stirnbein und mit dem Processus zygomaticus an das Jochbein.

Die hintere Fläche des Oberkieferkörpers ist an den absteigenden Flügel des Keilbeins und an den Proc. pyramidalis des Gaumenbeines gelötet.



Diese Fortsätze müssen sämtlich durchtrennt werden, wenn der Oberkiefer aus seinem Gefüge gehoben werden soll.



**Fig. 177.**  
Schnitte zur Resektion des Oberkiefers.  
a. nach Weber, b. nach Velpeau.

Die Operation wird am hängenden Kopf vorgenommen. Die präventive Tracheotomie und Einlegung der Tamponkanüle ist nicht erforderlich. Der Hautschnitt (Weber) wird sofort allenthalben bis auf den Knochen geführt und beginnt in der Mitte der Oberlippe, durchtrennt diese in senk-

rechter Richtung, umkreist den Nasenflügel der betreffenden Seite, zieht, am oberen Ende des Nasenflügels angelangt, senkrecht nach aufwärts an den inneren Augenwinkel, von wo er in scharfer Krümmung längs des Infraorbitalrandes nach aussen verläuft und am äusseren Augenwinkel endet (Fig. 177 a).

Der so umschnittene, aus den Weichteilen der Wange gebildete Lappen wird vom Oberkiefer abpräpariert, so dass die Fossa canina, sowie der Jochbeinhöcker freiliegen. Die Membrana tarso-orbitalis infer. wird längs des Infraorbitalrandes eingeschnitten, so dass das Orbitalfett vorquillt. Der ganze Inhalt der Orbita wird sorgfältig vom Boden der Augenhöhle abgehoben und von da aus die Ketten- oder Drahtsäge durch die Fissura infraorbitalis um den Jochfortsatz geschlungen (Fig. 178). Der Fortsatz wird auf diese Weise durchtrennt. Die Verbindung des Nasenfortsatzes des Kiefers mit dem Os frontis wird mit dem Meissel quer durchschnitten.

Es erübrigt noch die Spaltung des Gaumens und des Alveolarfortsatzes. Zu diesem Zwecke wird der mukös-periostale Ueberzug des Gaumens am Alveolarfortsatz durchschnitten und vom Knochen bis an die sagittale Mittellinie des Gaumengewölbes abgehobelt. Die Kettensäge wird durch die Apertura pyriformis eingeführt und an der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen in die Mundhöhle geleitet. Ehe die Gaumenplatte durchgesägt wird, soll der mittlere Schneidezahn der betreffenden Seite extrahiert werden.

Der Oberkiefer ist nunmehr bloss noch nach hinten mit dem Processus pterygoideus und Proc. pyramidalis des Gaumenbeines, nach oben mit dem Siebbeine im Zusammenhang. Aus diesen nicht allzu festen Verbindungen wird der Kiefer herausgehobelt; zu diesem Zwecke fasst der Ope-

rateur den Alveolarfortsatz mit der Langenbeck'schen Knochenzange und hebt den Kiefer mit wenigen ruckenden Bewegungen aus seinem Gefüge.

In der geräumigen Wunde muss die durchrissene Art. infraorbitalis gefasst und ligiert werden.



Fig. 178.

Die Vorderfläche des Kiefers zur Resektion blossgelegt. Die Kieferfortsätze bereits durchtrennt.

Die Hautwunde wird durch die Naht exakt verschlossen.

Konnte der Schleimhautüberzug des harten Gaumens erhalten werden, so wird derselbe nach vollendeter Exstirpation des Kiefers an die Schleimhaut der Wange geheftet. Die Wundhöhle

wird in allen Fällen mit Gaze austamponiert; ist durch die Erhaltung des Gaumenüberzuges die Wunde gegen die Mundhöhle verschlossen, so werden die Enden der Gaze zur Nase herausgeleitet.

---

Die verschiedenen Methoden der Oberkieferresektion unterscheiden sich von einander bloss durch die Art des Hautschnittes, der Vorgang am Skelette ist stets derselbe.

Dieffenbachs medianer Schnitt zieht von der Nasenwurzel über das Dach der Nase, durch die Mitte der Oberlippe, dringt bis an den Knochen und spaltet die knorpelige Nase und die Oberlippe. Vom oberen Ende ein kurzer Schnitt an den inneren Augenwinkel (Fig. 179).

Velpeau spaltet vom Mundwinkel aus im Bogen die Wange (Fig. 177 b). Maligne fügt dem Velpeauschnitte noch die mediane Spaltung der Oberlippe hinzu.

Die Schnitte sollen eine bequeme Zugänglichkeit zum Kiefer schaffen, sie sollen die Nerven, Gefässe, den Ductus stenonianus schonen und endlich kosmetisch günstige Resultate gestatten. Allen diesen Anforderungen entspricht am meisten der erwähnte Schnitt Webers.

Zur temporären Resektion des Oberkiefers (Langenbeck), wobei dieser, in Verbindung mit der Haut aus seinem Gefüge gelöst, nach Vollendung der Operation wieder in seine ursprüngliche Lage gebracht wird, wird ein zungenförmiger Lappen gebildet, dessen Basis einer Linie entspricht, welche die Nasenwurzel und das untere Ende des Nasenflügels der betreffenden Seite miteinander verbindet. Der Lappen reicht lateralwärts bis über den Jochhöcker.

Die Schnitte dringen überall bis an den Knochen.

Der Masseteransatz wird vom Jochbein gelöst und eine Stichsäge in die Fossa pterygopalatina und durch das Foramen sphenopalatinum in die Nase geführt. Die Spitze der Säge




Fig. 179.

Schnitt zur Resektion des Oberkiefers nach Dieffenbach.

ist im Rachen. Nun wird der Oberkiefer, entsprechend dem unteren Hautschnitt, oberhalb des Alveolarfortsatzes bis in die Apertura pyriformis durchsägt.

Die untere Orbitalwand wird freigelegt und das Jochbein zunächst in der Mitte, dann von der

Fissura infraorbitalis aus, entsprechend seinem Processus frontalis, durchsägt. Werden noch die Orbitalplatte des Oberkiefers und sein Processus nasalis durchtrennt, so lässt sich der Oberkiefer medialwärts heraushebeln und in Verbindung mit den ihn deckenden Weichteilen gegen die Nase zu aufklappen.

Partielle Resektionen am Oberkiefer werden vorgenommen, behufs Entfernung umschriebener Neubildungen (Epulis) am Alveolarfortsatz, dann an der Gaumenplatte (Gussenbauer), um an die Schädelbasis zu gelangen. Der mukös periostale Ueberzug des Gaumens wird median in seiner ganzen Länge gespalten, hierauf nach beiden Seiten bis an die Alveolarfortsätze zurückgeschoben. Mit Meissel und Hammer werden die Processus palatini des Oberkiefers und der Gaumenbeine samt dem unteren Teil des Pflugscharbeines abgetragen, wodurch in ausreichendem Masse die beiden Nasenhöhlen und die Schädelbasis zur Exstirpation von Nasenrachentumoren zugänglich geworden sind.

### **Resektion des Unterkiefers.**

An den Unterkieferkörper ist jederseits in aufsteigender Richtung der Kieferast angeschlossen, der mit seinem oberen Ende an die Cavitas glenoidalis des Schläfenbeins artikuliert. Der zweite Fortsatz, den das obere Ende des Kieferastes trägt, (Proc. coronoideus) dient der Sehne des M. temporalis zur Anheftung.

Die äussere Fläche des Kieferastes ist vom M. masseter, die innere vom M. pterygoideus int. bedeckt; diese Muskeln finden am Angulus mandibulae ihre Anheftung.

An der Innenseite des Kieferastes ist, durch einen Knochenfortsatz markiert, der Eingang in

den Canalis mandibularis wahrnehmbar. Eine von dieser Oeffnung an der Innenseite des Kiefers schief nach vorne unten bis an das Kinn verlaufende Rinne dient dem Musc. mylohyoideus zum Ansätze.

Meist wird bloss nur die Resektion einer Kieferhälfte nötig. Zu diesem Zwecke wird die Spange des Kiefers in der Mittellinie senkrecht durchsägt, der Knochen an der Aussen- und Innenseite entblösst, nach Durchschneidung der Sehne des M. temporalis im Gelenke ausgelöst.

Vor Totalresektion des Unterkiefers wird ebenfalls erst die mediane Spaltung des Körpers vorgenommen, worauf beide Kieferhälften isoliert ausgelöst werden.

Tumoren, sowie Nekrosen geben die Veranlassung zur Ausführung von Resektionen am Unterkiefer.

Der Kranke liegt mit dem Kopfe der horizontalen Tischplatte auf.

Hautschnitt senkrecht durch die Mitte der Unterlippe bis an das Kinn, von da im scharfen Winkel nach aussen, entsprechend dem Rande des Unterkiefers, bis an den Angulus mandibulae. Der Schnitt dringt allenthalben bis auf den Knochen.

Die Weichteile werden von der Aussenfläche des Kiefers abgelöst; die Schleimhaut der Wange wird entsprechend der Umschlagstelle auf den Alveolarfortsatz des Kiefers durchschnitten.

Vom Hautschnitt aus werden die Weichteile auch von der Hinterfläche des Kieferkörpers abgelöst; nach Abtrennung des M. mylohyoideus wird hier die Schleimhaut durchschnitten und die Mundhöhle eröffnet.

Von der Innenseite des Kinns ist der Ursprung des M. genio-glossus und genio-hyoideus

### Tab. 18. Resektion des Unterkiefers.

Der Unterkiefer ist median durchsägt und nach auswärts gedreht. Man sieht am Boden der Mundhöhle den *Musc. mylohyoideus* (Mh.), über diesem die Sublingualdrüse mit dem *Nerv. lingualis*. Teilweise vom Kiefer gelöst ist der *Musc. pterygoideus int.* (Pi.). Um den Kieferhals geschlungen ist der *M. pterygoideus ext.* (Pe.) mit der *Art. maxillaris int.* (Mi.) sichtbar. Am *Proc. coronoides* der Ansatz des Temporal Muskels (T.) noch erhalten. Gg. *Musculus genioglossus*. Gh. *Musculus geniohyoideus*.

---


der betreffenden Seite mit dem Messer knapp am Knochen abzulösen. Nach Extraktion des Schneidezahnes kann die Ketten- resp. Drahtsäge um den blossgelegten Knochen geschlungen werden; die Durchsägung ist nahe der Mitte in senkrechter Richtung vorzunehmen (Fig. 180).

Der Operateur erfasst den entblößten Kiefer und löst, während er diesen im Sinne der Abduktion disloziert, mit der Schere die Ansätze des *Musc. masseter* und des *M. pterygoideus* am Kieferwinkel. Es gelingt nun leicht, die Weichteile an der Innen- und Aussenseite des Kieferastes stumpf abzustreifen.

Während die abduzierte Kieferhälfte nun nach auswärts rotiert wird, durchtrennt der Operateur mit der Schere die in den *Canalis mandibularis* eintretenden Gefässe und Nerven, sowie den am Gelenkfortsatz sich ansetzenden *M. pterygoideus externus* (Tab. 18). Ist auch die Sehne des Temporal Muskels durchschnitten, so wird, nachdem das Köpfchen des Unterkiefers aus dem Gelenke gewälzt ist, die Kapsel am Unterkiefer getrennt, womit dieser aus allen seinen Verbindungen gelöst erscheint.

Die Wangenschleimhaut wird mit der des Bodens der Mundhöhle durch die Naht vereint, ebenso die Wunde der Haut.








### Die temporäre Resektion des Unterkiefers.

Die einfache Spaltung der Unterkieferspange wird vorgenommen, wenn es sich darum handelt, den Boden der Mundhöhle, die Gaumenbögen, die Zunge, die oberen Pharynxpartien, die Schädelbasis (Resektion des III. Astes vom Trigeminus nach Mikulicz) operativen Eingriffen zugänglich zu machen.



### Resektion des Unterkiefers.


Fig. 180.

Der Unterkieferkörper durch Ablösung der Weichteile blossgelegt; die Drahtsäge durchtrennt den Kiefer in der medianen Sagittalebene.

**Tab. 19. Seitliche temporäre Spaltung des Kieferastes nach Langenbeck.**


Die Wunde klapft durch Distraction der Kiefersegmente.  
*M.* Sägeflächen des Kieferastes. *Oh.* Zungenbein. *Bv.* *M.* biventer (in seiner Sehne durchtrennt). *Mh.* *M.* mylohyoideus.  
*Hg.* *M.* hyoglossus. *H.* Nerv. hypoglossus. *L.* Nerv. lingualis.  
*Sm.* Gland. submaxillaris. *Sl.* Gland. sublingualis.

---



**Fig. 181.**

**Mediane temporäre Spaltung des Unterkiefers nach Sedillot.**





Die Spaltung wird entweder in der Mittellinie am Kinn (Sedillot), oder seitlich (Langenbeck) vorgenommen. Man durchsägt oder durchmeißelt den Knochen entweder linear oder in Form einer Stufe.

Mediane Spaltung der Unterlippe bis unter das Kinn.

Vom unteren Ende des Schnittes wird ein spitzes Messer längs der hinteren Fläche des Knochens geführt und am Frenulum linguae ausgestochen. Nach Extraktion des mittleren Schneidezahnes wird eine Kettensäge (Drahtsäge) um den Knochen geschlungen, und dieser in der Richtung des Hautschnittes linear durchtrennt.

Durch eingesetzte Wundhaken werden die Schnittflächen der Knochen voneinander entfernt, wodurch die Gebilde des Mundbodens, die Glandulae sublinguales und die Zunge selbst in ausreichenden Masse zugänglich werden (Fig. 181).

Die hinteren Teile der Zunge, die Pars foliata, die Arcus palatoglossus, die Wand des Pharynx lassen sich besser durch die seitliche temporäre Spaltung des Kieferastes, wie sie Langenbeck empfahl, erreichen (Tab. 19).

Der Hautschnitt wird vom Mundwinkel senkrecht nach abwärts bis in die Höhe des Kehlkopfes geführt.

Der Operationsgang entspricht dem der medianen Spaltung. In beiden Fällen werden nach Vollendung der Operation die getrennten Kieferhälften durch Metallnaht miteinander vereinigt. Die Hautwunde wird durch Knopfnaht geschlossen.

### **Resektionen aus der Kontinuität des Unterkiefers.**

Zur Entfernung von Stücken aus der Kontinuität des Unterkiefers wird der Hautschnitt am Kieferrande bis auf den Knochen geführt.

Die Weichteile von der äusseren, wie der inneren Fläche des Kiefers werden abgelöst, bis die Schleimhaut der Lippe, wie die des Mundbodens am Kiefer durchtrennt sind. An den zwei Stellen, wo der Kiefer durchsägt werden soll, wird je ein Zahn extrahiert und mit der Kettensäge ein entsprechendes Stück des Kiefers ausgesägt.

In analoger Weise wird das Mittelstück des Kiefers entfernt. Nebst dem Schnitte am Kieferrande empfiehlt es sich, hier die Unterlippe vertikal in der Mitte zu durchschneiden, so dass ein I Schnitt entsteht. Nach Resektion des Mittelstückes müssen die Stümpfe der vom Kinn abgelösten Musculi genio-glossus in der Hautwunde durch Naht fixiert werden, damit nicht die ihres Haltes am Kinn beraubte Zunge nach rückwärts sinke, ein Ereignis, welches verhängnisvoll sein kann.

### Operationen an der Zunge.

Die Exstirpationen von Geschwülsten der Zunge sind atypische Eingriffe, die sich nicht nach allgemein giltigen Regeln ausführen lassen. Prinzipiell wichtig ist, dass die Entfernung der Geschwulst weit im gesunden Gewebe vorgenommen werde, und dass der Wunddefekt derart angelegt sei, dass eine Vereinigung durch die Naht oder Deckung der Wunde mit gesunder Zungensubstanz möglich sei. Die Voroperationen, welche den Zweck haben, die Totalexstirpation der Zunge zu ermöglichen, den Mundboden bequemer zugänglich zu machen, wurden zum Teil bereits erörtert (temporäre Resektion des Unterkiefers).

Für die Operationen an der Zunge wird der Kranke horizontal oder mit hängendem Kopfe gelagert. Der Hals ist gestreckt und der Kopf in



dieser Lage fixiert. Der Mund wird mit dem Mundspiegel offen erhalten. Die Zunge wird mittelst einer durch ihre Substanz geführten starken Seidenligatur gefasst und vorgezogen.

Umschriebene Tumoren am Zungenrande werden vom Munde aus im Gesunden mit dem Skalpelle oder der Schere in Form eines Keiles exzidiert. Die Wunde lässt sich linear durch tiefgreifende und oberflächliche Nähte vereinigen.

Vor Exstirpationen der halben oder ganzen Zunge wird zur präventiven Blutstillung die Art. lingualis am Halse ein- oder doppelseitig unterbunden.

Soll die Exstirpation in den hinteren Anteilen der Zunge erfolgen, oder sollen mit der ganzen Zunge auch der Mundboden, die Glandulae sublinguales entfernt werden, so lässt sich das Operationsterrain durch Voroperationen bequemer zugänglich machen.

Diese Voroperationen sind:

1. Die quere Spaltung der Wange vom Mundwinkel aus;
2. die submentale Inzision nach Regnoli-Billroth;
3. die temporäre Spaltung des Unterkiefers.
  - a) in der Mittellinie (Sedillot),
  - b) am Kieferaste, entsprechend dem ersten Backzahn (Langenbeck).

Die Spaltung der Wange in horizontaler Richtung vom Mundwinkel aus ermöglicht ein bequemerer Operieren, indem das Operationsfeld geräumiger wird und sich besser beleuchten lässt. Nach vollendeter Operation an der Zunge ist der angelegte Wangenspalt durch Naht zu vereinigen.

Die submentale Entfernung der Zunge, zuerst von Regnoli in Pisa ausgeführt, erreicht die Zunge vermittelst eines halbmondförmigen Schnittes, der am Halse längs des Unterkieferastes angelegt wird. R. fügte diesem Bogenschnitt noch einen Vertikalschnitt vom Kinn bis an die Mitte des Zungenbeines bei. Billroth operierte mit dem einfachen Bogenschnitte.




Fig. 182.

Submentale Blosslegung der Zunge nach Billroth.

Man dringt an der Innenseite des Kieferastes vor, löst seitlich die Ansätze des Mylo-hyoideus, in der Mitte die der MM. genio-glossus, genio-hyoideus und Biventer vom Knochen, und eröffnet die Schleimhaut der Mundhöhle im ganzen Bereiche des Schnittes. Die Zungenspitze wird ange-

seilt und durch die Wunde in toto vorgezogen. Es sind auf diese Weise die Gebilde des Mundbodens, sowie die Zunge bis an ihre Basis Eingriffen bequem zugänglich (Fig. 182).

Die temporäre Resektion des Unterkiefers wird nach den pag. 242 angegebenen Regeln vorgenommen. Die Schnittflächen des Unterkiefers werden durch scharfe Haken voneinander




Fig. 183.

Schnittführung zur Zungenexstirpation nach Kocher.

entfernt, wodurch das Operationsterrain an Ausdehnung gewinnt. Die Durchtrennung des Unterkiefers kann linear oder zur besseren Adaptierung bei der Knochennaht stufenförmig vorgenommen werden.

Bei ausgebreiteter Erkrankung der Zunge nimmt Kocher die Exstirpation von der Zungenbasis aus vor.

**Präventive Tracheotomie.** Der Hautschnitt vom Proc. mastoides längs dem Vorderrande des Kopfnickers bis in die Höhe des Zungenbeins, von da, entsprechend der Halsmundbodenfalte, nach vorne, wo er median am Kinn endet (Fig. 183). Der so umschriebene Lappen wird aufgeklappt, worauf nach Unterbindung der Art. maxillaris ext. und lingualis die submaxillaren Drüsen entfernt werden. Die Mundhöhle wird durch den M. mylohyoideus eröffnet und die Schleimhaut vom Kiefer getrennt. Noch ist die Zunge vom Zungenbein zu lösen, worauf das ganze Organ vorgezogen und im Gesunden abgesetzt werden kann.

Nach allen ausgebreiteteren Exstirpationen an der Zunge soll der Stumpf am Mundboden durch Naht fixiert werden. Man vermeidet auf diese Weise das verderbliche Zurücksinken des Zungenstumpfes.

### **Operation der Ranula.**

Die zystische Geschwulst am Boden der Mundhöhle wird am einfachsten durch Entfernung ihrer prominierenden oralen Wand behandelt. Bei weit geöffnetem Munde wird aus der oberen Wand der Zyste mittelst Hakenpinzette und Hohlschere ein entsprechendes Stück im Zusammenhange mit der Mundbodenschleimhaut ausgeschnitten. Nachdem der zähflüssige Inhalt abgeflossen, wird im Umkreise der Wunde die Zystenwand mit der Schleimhaut durch einige Nähte vereinigt. Der Hohlraum wird tamponiert.

Die Exstirpation ist ein eingreifenderes und schwierigeres Verfahren. Prominiert die Geschwulst gegen die Regio submentalis, so kann von da aus die Eröffnung und Drainage oder die Auslösung vorgenommen werden.

### Tonsillotomie.

Die Amputation der hypertrophischen Tonsillen (Tonsillotomie) wird entweder aus freier Hand mit dem geknöpften Messer (Muzeux), oder mit dem Fahnenstock'schen Guillotineninstrument vorgenommen.

Im ersteren Falle wird die Mandel mit einer Hakenzange erfasst, aus ihrer Nische vorgezogen und mit einem geknöpften, der Fläche nach gekrümmten (Bell'schen) Messer von unten nach aufwärts mit sägenden Zügen abgekappt.




Fig. 184. Fahnenstock'sches Tonsillotom.

Das Fahnenstock'sche Tonsillotom ermöglicht ein rasches Operieren. Der Ring am unteren Ende des Instrumentes ist für den Daumen, die beiden seitlichen für Zeige- und Mittelfinger der operierenden Hand. Indem die Finger einander genähert werden, tritt das ringförmige Messer vor, während gleichzeitig eine Harpune in entgegengesetzter Richtung vorgestossen wird (Fig. 184).

Zur Tonsillotomie sitzt der Kranke dem Lichte zugekehrt auf einem Stuhl. Der Kopf ist zurückgeneigt, der Mund weit geöffnet. Der Operateur sitzt vor dem Kranken und führt mit der Rechten das geschlossene Tonsillotom ein, wäh-

rend er mit der Linken mit Hilfe eines Spatels die Zunge gegen den Mundboden drückt. Das Tonsillotom wird derart eingeführt, dass die Harpune gegen die Medianebene sieht. Ist der Ring über die Tonsille gelegt und gegen die Gaumenbögen leicht angedrückt, so wird durch einen kräftigen Fingerdruck die Tonsille abgekappt (Fig. 185). Operiert man an der rechten Tonsille,




Fig. 185.  
Tonsillotomie.

so muss man die Hände entweder kreuzen oder das Tonsillotom mit der Linken dirigieren.

Bei der in dieser Weise ausgeführten Abkappung der Tonsille besteht keine Gefahr einer profusen Nachblutung. Nur wenn der Amputationschnitt tiefer geht und in die Ebene der hinteren Tonsillarkapsel fällt, kann die Blutung schwer werden. Eine Gefahr, die Carotis interna zu ver-

letzen, besteht nicht. Das sicherste Mittel, diese Blutung zu stillen, ist die Vereinigung der Wunde durch tiefgreifende Nähte.

### **Eröffnung des Tonsillarabszesses.**

Der Kranke sitzt auf einem Stuhle dem Operateur gegenüber; der Kopf wird in überstreckter Stellung verlässlich festgehalten. Man eröffnet den Abszess an der prominentesten Stelle, der Mitte des Arcus palato-glossus entsprechend, also lateral von der Tonsille. Zur Eröffnung nimmt man ein spitzes Messer, welches bis nahe zur Spitze mit Heftpflaster umwickelt ist (kaschiertes Messer).

Die Zunge wird mit einem Spatel deprimiert und das Messer senkrecht eingestochen. In der Regel stürzt der unter Spannung befindliche Eiter aus der Wunde. Wenn dies nicht der Fall, geht man mit einer Hohlsonde oder geschlossenen Kornzange in die Wunde ein und erweitert diese durch Oeffnen der Branschen. In der Regel sieht man dann Eiter in langsamem Strome ausfließen.

### **Plastische Operationen.**

Wir verstehen unter dieser Bezeichnung ebenso diejenigen Hilfsoperationen, mit welchen wir vorhandene Wunddefekte mit Hautmaterial bedecken, als diejenigen Eingriffe, welche dazu dienen, angeborene oder erworbene Formfehler operativ zu beseitigen.


In die erste Kategorie gehört z. B. die Bildung gestielter Lappen zur Deckung von Wunddefekten, in die letztere die Hasenschartenoperation, die Rhinoplastik, Blepharoplastik etc.

Zur Deckung von Wunddefekten wird die benachbarte Haut entweder direkt oder nach Anlegung von Entspannungsschnitten herange-

**Keilförmige Exzision aus der Unterlippe.  
Lineare Vereinigung.**



**Fig. 186.**  
**Darstellung des Defektes.**



**Fig. 187.**  
**Linear vereinigter Defekt.**



# Cheiloplastik (Dieffenbach).




Fig. 188.  
Dreieckiger Defekt der Unterlippe. Rautenförmig begrenzte Lappen.




Fig. 189.  
Die Lappen durch Verschiebung gegen die Mitte aneinander-  
gebracht. Naht.

zogen und über dem Defekte vereinigt. In anderem Falle müssen die der Nachbarschaft entnommenen Lappen von ihrer Unterlage abgelöst, entweder seitlich verschoben oder um ihre Basis gedreht werden, damit sie, auf den Defekt gebracht, hier fixiert werden können.

Ein nicht zu breiter dreieckiger Defekt wird direkt verschlossen, indem man tiefgreifende Nähte parallel der Basis anlegt und so eine lineare Vereinigung erzielt. (Lineare Vereinigung nach Keilexzision aus der Unterlippe, Fig. 186, 187).

Ist der Defekt breiter, so können rautenförmige, symmetrisch von beiden Seiten desselben gebildete Lappen in die Medianebene verzogen zur Deckung desselben verwendet werden (Dieffenbach, Fig. 188, 189).

An Stelle der rautenförmigen Lappen können jederseits von der Basis des Defektes ausgehende Bogenschnitte je eine Partie der benachbarten Haut begrenzen, die mobilisiert über dem Defekte zur Vereinigung gebracht werden kann.

Viereckig oder oval begrenzte Defekte können durch einen oder zwei symmetrisch gebildete Lappen der nächsten Umgebung gedeckt werden (Cheiloplastik nach Bruns, nach Langenbeck, Fig. 190, 191).

Der Lappen wird der Form nach dem Defekte angepasst, doch etwas grösser als dieser geschnitten.

Diesen Methoden, bei welchen der Lappen der unmittelbaren Nachbarschaft des Defektes entnommen wird, steht diejenige gegenüber, bei welcher ein gestielter Lappen, einem entfernteren Körperteile angehörig, bis zur Anheilung am Defekte durch seinen Stiel mit dem ursprünglichen Standort in Zusammenhang bleibt (Rhinoplastik

mittelst eines dem Arme entnommenen Lappens nach Tagliacozza).

Eine andere Methode, um Haut entfernter Körperpartien zur Deckung von Defekten zu verwenden, besteht darin, dass ein brückenförmiger



Cheiloplastik nach Langenbeck.


Fig. 190.

Ovaler Defekt der Unterlippe. Umgrenzung des Lappens.

Lappen gebildet wird, unter welchen der zu deckende Teil derart eingeschoben und fixiert wird, dass Wunde auf Wunde zu liegen kommt. Erst nach erfolgter Anheilung des Lappens wird dieser durch quere Trennung seiner beiden Enden vom Boden abgetrennt.

Endlich können völlig aus ihrem Boden gelöste, also nicht gestielte Lappen auf Wundflächen zur Anheilung gebracht werden (Reverdin, Thiersch).

Thiersch schneidet mit einem breiten Mes-



### . Cheiloplastik nach Langenbeck.

Fig. 191.

Der abgelöste Lappen in den Defekt gelagert und **ingenäht**. Der Sporn mit dem unteren Rande vereinigt. Lippensaum aus der Schleimhaut der Wange und Rest der Unterlippe.

ser grössere und kleinere Epidermisläppchen aus, welche auf der zu deckenden Fläche dicht aneinandergereiht, am besten dachziegelförmig ausgebreitet werden. Die Läppchen werden durch sägende Züge mit einem breiten Messer gebildet, meist dem Oberschenkel entnommen; bei einiger

Uebung gelingt es, längere, riemenförmige Epidermislapfen zu bilden. Diese werden entweder auf die frische Wunde oder auf eine Granulationsfläche gebreitet.

Krause hat in neuerer Zeit grössere ungestielte, der ganzen Dicke der Haut entnommene Lapfen mit Erfolg auf frische, nicht blutende



Cheiloplastik nach Morgan.


Fig. 192.

Ein brückenförmiger Lapfen aus der Kinnhaut.

Wundflächen zur Anheilung gebracht.

Bei sehr ausgedehnten, nach Exstirpation der ganzen Unterlippe entstandenen Defekten kann (Morgan, Regnier) die Haut des Kinns und der Unterkinngegend zweckmässig in Form eines brückenförmigen Lappens zur Deckung herangezogen werden. Ein dem unteren Defekt-

rand paralleler Schnitt wird unter dem Kinn geführt. Die Entfernung des Schnittes vom Defektrand soll die Höhe des Defektes um ein geringes übertreffen. Die so gebildete Brücke wird von der Unterlage abpräpariert und gleich einem Visier nach oben gerückt, durch einen Nagel am



### Cheiloplastik nach Morgan.

Fig. 193.

Der Hautlappen ist über den Defekt gezogen und durch einen Nagel am Unterkiefer befestigt.

Unterkiefer fixiert und in den Defekt eingefügt (Fig. 192, 193).

**Rhinoplastik.** Plastischer Ersatz der Nase. Totale oder partielle Rhinoplastik, je nachdem es sich um den Ersatz der ganzen Nase oder von Teilen dieser handelt.

Bildung der Nase aus der Haut der Stirne. Im Wesen besteht die Operation darin,

dass auf den, an den Hauträndern wundgemachten Defekt der Nase ein annähernd dreieckiger Lappen der Stirnhaut aufgepflanzt wird, aus dessen Basis die Nasenflügel und das Septum gebildet werden. Durch die Spitze bleibt der Lappen im Zusammenhange mit der Haut an der Nasenwurzel.

Ist der Defekt angefrischt, so nehme man das Mass für den zu bildenden Lappen, indem man diesen aus Heftpflaster oder Leder ausschneidet und dem Defekte anzupassen sucht. Ist die richtige Form und Grösse gefunden, so wird das ausgebreitete Modell der Stirne angelegt und der Rand durch einen seichten Schnitt auf dieser konturiert.

Der dreieckige Lappen liegt mit seiner Höhe der Stirne schräg auf, mit der Spitze ist der Lappen gegen einen Supraorbitalrand gerichtet. Der eine Schenkel des Stirnlappens verläuft in direkter Flucht mit einer Seite des dreieckig angefrischten Defektes der Nase.

Der Lappen wird von der Unterlage im Zusammenhange mit der Beinhaut abgelöst, um etwa 180° gedreht und über den Defekt heruntergelegt.

Das mittlere Segment der Lappenbasis wird der Länge nach gefaltet, durch Nähte fixiert, zum Septum.

Die beiden seitlichen Teile werden umgeklappt, so dass Wunde auf Wunde zu liegen kommt, auf jeder Seite zur Formung der Nasenflügel verwendet (Fig. 194—196).

Nun wird die so gebildete Nase in den Defekt eingefügt und durch Nähte fixiert.

Vorerst sind die hinteren Enden der Nasenflügel und das Septum an die wundgemachte Wange resp. die Oberlippe zu heften, worauf die Seitenränder mit den seitlichen Teilen des Defektes zur Vereinigung kommen.




Fig. 194.




Fig. 195.

Modell zur Rhinoplastik.




Fig. 196.

Totale Rhinoplastik der Stirnhaut.

Der Stirndefekt ist bereits vor Bildung der Nasenflügel und des Septum durch Seidennähte



verkleinert. Der in der Mitte übrigbleibende Defekt wird der Heilung per granulationem überlassen oder mit Thierschläppchen gedeckt.

In die neugebildeten Nasenlöcher werden enge Kautschukröhrchen eingelegt. Es ergeben sich durch nachträgliche Verengerung der Nasenlöcher häufig Uebelstände, zu deren Vermeidung man bei der Rhinoplastik von der Bildung eines Septums völlig Abstand nehmen kann. Bei entsprechend gross angelegten Nasenlappen braucht dieser Mangel nicht aufzufallen.

Die entstellende Falte an der Nasenwurzel, die der Umschlagstelle des Lappens entspricht, kann nach erfolgter Heilung in einer zweiten Sitzung durch Exzision beseitigt werden.

Zahlreiche Verfahren haben den Zweck, der neugebildeten Nase ein festes Gerüste zu geben, damit das entstellende Einsinken der häutigen Nase vermieden werde. Thiersch entnimmt zunächst der angrenzenden Wangenhaut jederseits einen viereckigen Lappen mit der Mittellinie zugekehrter Basis. Die beiden Lappen werden mit der Wundfläche nach aussen in der Medianlinie über dem Nasendefekt vereinigt. Darüber erst kommt der in typischer Weise gebildete Stirnlappen zu liegen. Die Wundflächen werden durch Transplantation gedeckt.

König entnimmt der Stirne einen vertikalen, streifenförmigen Weichteilknochenlappen. Der Lappen hat seine Basis an der Nasenwurzel. Die Kortikalis des Stirnbeins, die im Bereiche des Lappens abgemeisselt wird, bleibt mit diesem in Zusammenhang. Der Hautknochenlappen wird über den Nasendefekt heruntergeschlagen, so dass seine wunde Fläche nach vorne gekehrt ist. Darüber erst wird der Weichteillappen in üblicher Weise aus der Stirne gebildet.

Ebenfalls in osteoplastischer Weise bildet Schimmelbusch die Nase: ein dreieckiger, gestielter Lappen mit der Spitze an der Nasenwurzel, der Basis an der Haargrenze, wird um-




**Bildung des Nasenflügels aus der Haut der Wange.**

**Fig. 197.**

**Defekt und Umgrenzung des Lappens.**

schnitten und mit der Kortikalschicht des Stirnbeins abgemeißelt. Durch Lappenverschiebung wird der Stirndefekt gedeckt, der Hautknochenlappen zunächst der Granulation überlassen. Nach 4 bis 8 Wochen, wenn alles nekrotische Gewebe

abgestossen ist, wird die Innenfläche des Lappens durch Transplantation nach Thiersch zur Benarbung gebracht. Erst nach erfolgter Ueberhäutung wird derselbe in einem neueren Operationsakt in den angefrischten Nasendefekt zur Einheilung gebracht. • Das Septum wird aus dem Hautrand der Apertura pyriformis durch zwei symmetrische Läppchen gebildet.



**Bildung des Nasenflügels aus der Haut der Wange.**

Fig. 198.

Der Lappen ist über den Defekt gelagert und eingenäht.

Die beiden letzteren Methoden lassen sich zweckmässig zur Operation der Sattelnase verwenden. Zu diesem Zwecke wird die Nase, entsprechend der tiefsten Sattelung, quer durchtrennt und nach unten verzogen. Der König'sche Knochenlappen wird nach abwärts geschlagen und an das periphere Segment der Nase derart

fixiert, dass er den Defekt überbrückt. Das Ganze deckt ein Lappen aus der Stirne von bekannter Form.

Gersuny hat zur Korrektur der Sattelnase die subkutane Einspritzung von erwärmtem Paraffin empfohlen. Sind die zu erhebenden Teile narbig am Knochen fixiert, so werden sie, ehe Paraffin eingespritzt wird, subkutan, mittelst Tenotom gelöst. Auf diese schonende Weise lassen sich kosmetisch schöne Erfolge erzielen. Bei der Einspritzung muss man sich zur Verhütung von Embolien vergewissern, dass die Nadel nicht in eine Vene taucht. Es geschieht dies durch Aspiration mit der Pravaz'schen Spritze.

Nach dem Vorgange des Tagliacozza wird die Haut zur Bildung der Nase dem Oberarme entnommen. Der rautenförmige Lappen bleibt zunächst durch seinen Stiel in Verbindung mit dem Arme und wird partiell in den angefrischten Defekt eingenäht. Dazu ist es nötig, dass der Arm unverrückbar in einer Position möglichst nahe dem Gesichte gehalten und fixiert werde. Erst wenn der Lappen eingeheilt ist, kann seine Brücke, die ihn am Arme noch fixiert, durchtrennt werden. In der üblichen Weise wird sodann aus dem Lappen die Nase gebildet.

Für **partielle Plastiken der Nase** lassen sich keine strikten Regeln formulieren. Aus den Elementen für die plastische Deckung von Defekten wird man sich das für den einzelnen Fall passende Verfahren konstruieren müssen.

Bei Mangel der Seitenwand der Nase kann der Lappen zur Deckung des Defektes ebenfalls der Stirne entnommen werden.

Zur Bildung eines Nasenflügels verwendet man gestielte Lappen aus dem Nasenrücken,

der anderen Seite der Nase, oder aus der Haut der Wange. Der Stiel des Lappens liegt am oberen Teil des Nasenrückens (Fig. 197, 198).

Ein gestielter Lappen, der Substanz der Oberlippe entnommen, kann durch Drehung in den an-




Fig. 199.

**Meloplastik nach Kraske-Gersuny.**

Penetrierender Wangendefekt, in dessen nächster Nachbarschaft ein ungestielter Lappen umschnitten wird.

gefrischten Defekt des Nasenflügels versetzt und hier durch Naht fixiert werden.

Zum Ersatz des fehlenden Septum kann das Material aus der Oberlippe zweckmässig benützt werden.

Die plastische Deckung von Defekten der **Wagenhaut (Meloplastik)**, die in ihrer ganzen Dicke fehlt, erfordert spezielle Vorschriften. Der dem Defekt aufgepflanzte Lappen muss an seiner der Mundhöhle zugekehrten Seite mit Haut oder Schleimhaut überzogen sein, damit keine




Fig. 200.

Meloplastik nach Kraske-Gersuny.

Der Lappen ist gegen den Defekt aufpräpariert und bleibt nur durch Unterhautzellgewebe in Zusammenhang mit der Umgebung.

narbige Schrumpfung eintrete.

Wölfler entnimmt Schleimhaut von anderen Stellen des Körpers, die er an die Innenfläche des Lappens transplantiert. Auch Thiersch'sche L ä p p c h e n wurden (Ewald) zu gleichem Zweck verwendet. Sicherer ist der Erfolg, wenn zum Ersatz des Schleimhautdefektes ein Hautlappen mit

seiner Epidermisfläche gegen die Mundhöhle zu, in den Defekt eingesetzt wird.

Kraske umschneidet die dem Defekt angrenzende Haut in Form eines Lappens, der von seinem Rande gegen den Defekt zu lospräpariert und mit der Hautseite gegen die Mundhöhle zu-gekehrt wird. Es ist nicht nötig, dass dabei die Basis des Lappens von dem Hautrand des Defek-




Fig. 201.

Meloplastik nach Kraske-Gersuny.

Der Lappen mit seiner Hautseite gegen die Mundhöhle gekehrt, ist in den Defekt eingenäht.

tes gebildet werde. Gersuny hat erwiesen, dass die Ernährung des Lappens auch dann eine ausreichende ist, wenn dieser nur noch durch eine Zone des Unterhautzell- und Fettgewebes mit der Unterlage zusammenhängt. Aus Fig. 199—201 ergibt sich das Operationsverfahren. Die Aussen-seite des Lappens, wie der durch die Plastik ent-

## Hasenschartenoperationen.

### Nelatons Verfahren.

- Fig. 202. Anfrischung.  
 Fig. 203. Wunde nach Verziehung der Lippe.  
 Fig. 204. Naht.

### Malgaignes Verfahren.

- Fig. 205. Anfrischung.  
 Fig. 206. Die Läppchen beiderseits nach abwärts disloziert.  
 Fig. 207. Naht.

standenen Defekte lassen sich durch Lappenplastik oder Thiersch'sche Transplantation decken.

Czerny verwendet zur Meloplastik einen langen Halshautlappen, der gefaltet als gedoppelter Lappen in den Defekt zu liegen kommt. Der Lappen ist doppelt so lang als der zu deckende Defekt.

Israel bildet ebenfalls einen langen Lappen aus der Haut des Halses, dessen Ende in den Defekt derart eingenäht wird, dass die Hautfläche nach der Mundhöhle gerichtet ist. Nach erfolgter Einheilung wird der Lappen an seiner Insertionsstelle abgetrennt und das freie hintere Stück gefaltet und Wunde an Wunde auf die bereits eingeeheilte Partie des Lappens gebracht. Der den Defekt deckende Lappen ist auf diese Weise gedoppelt mit seinen Hautflächen einerseits gegen die Mundhöhle, anderseits gegen die Oberfläche gerichtet.

## Hasenschartenoperationen.

Nelatons Verfahren, für die unvollständige Hasenscharte geeignet, besteht darin, dass die Oberlippe über dem Spaltwinkel, diesem parallel, durchschnitten wird. Der Spaltrand wird nach unten verzogen und die rhombische Wunde linear



# Hasenschartenoperationen.




Fig. 202.



Fig. 205.




Fig. 203.




Fig. 206.



Fig. 204.




Fig. 207.

## Hasenschartenoperationen.

### Methode nach Mirault-Langenbeck.

Fig. 208. Anfrischung.

Fig. 209. Wunde.

Fig. 210. Naht.

### Operation der doppelseitigen Hasenscharte.

Fig. 211. Anfrischung.

Fig. 212. Wunde.

Fig. 213. Naht.

senkrecht auf die quere Mundspalte vereinigt (Fig. 202—204).

Malgaigne bildet jederseits aus dem Lippenrot des Spaltes ein Läppchen und entfernt den Spaltwinkel. Die Läppchen werden nach abwärts geschlagen und miteinander vereinigt (Fig. 205 bis 207).

Eine Modifikation dieser Methode bildet die Anfrischung nach Mirault-Langenbeck. Aus dem einen Defektrand wird das Malgaigne'sche Läppchen in typischer Weise gebildet. Der zweite Spaltrand wird winkelig angefrischt und das Lippenrot im Spaltwinkel entfernt. Das Läppchen stellt nach erfolgter Vereinigung den unteren Lippensaum dar (Fig. 208—210).

Bei der doppelseitigen Hasenscharte müssen sowohl das Mittelstück, wie die beiden seitlichen Spaltränder angefrischt werden. Man bildet rechts und links je ein Malgaigne'sches Läppchen, welches entsprechend seiner Spitze abgekappt wird. Die Läppchen werden nach unten verlagert, unter dem Mittelstück miteinander vereinigt. Der Spaltrand kommt jederseits an das angefrischte Mittelstück, mit welchem es vereinigt wird, zu liegen (Fig. 211—213).

Klafft der Lippenspalt so stark, dass die Ränder nicht aneinander gebracht werden können, so

# Hasenschartenoperationen.




Fig. 208.




Fig. 211.




Fig. 209.



Fig. 212.




Fig. 210.




Fig. 213.

sind Entspannungsschnitte an den Nasenflügeln zur Mobilisierung der Spaltränder angezeigt (Fig. 214).




Fig. 214.  
Entspannungsschnitte bei breitem  
Lippenspalt.

Bei stark prominierendem Mittelstück kann die plastische Verschlussung des doppelten Lippenpaltes erst nach Rücklagerung des Zwischenkiefers vorgenommen werden. Zu diesem Zwecke wird am Septum, entsprechend dem unteren freien Rande, die Schleimhaut gespalten

und beiderseits vom Vomer abgehoben.

Der Vomer wird in seiner ganzen Höhe mit einem Scherenschlag durchtrennt, worauf die Rücklagerung des Zwischenkiefers durch Druck von vorne her leicht gelingt.

### Staphyloraphie und Uranoplastik.

Die St. — der plastische Verschluss angeborener Defekte des weichen Gaumens — besteht aus der Anfrischung des Defektrandes und der Vereinigung des Defektes durch die Naht.

Die Operation wird entweder bei aufrechter Stellung des Kranken oder besser am hängenden Kopfe vorgenommen.

Man fasst die Lefzen des Defektes einzeln mit der Pinzette und führt die Anfrischung mit einem spitzen, schmalen Messer aus.

Die Vereinigung wird mit kleinen, stark ge-

krümmten Nadeln vorgenommen. Können die Wundlefen nur unter starker Spannung aneinander gebracht werden, so empfiehlt es sich, durch die Substanz des Gaumensegels jederseits einen Entspannungsschnitt zu führen.

Der plastische Verschluss von Defekten des harten Gaumens (Uranoplastik) enthält drei Phasen. Der erste Akt der Operation ist die Anfrischung der Defektränder und die Bildung zweier seitlich vom Defekt gelegener brückenförmiger Lappen, derart, dass beiderseits parallel dem Defektrande am Alveolarrand des Gaumens, vom letzten Backzahn bis an den äusseren Schneidezahn reichend, je ein Schnitt durch die Schleimhaut des Gaumens bis auf den Knochen geführt wird.

In der zweiten Phase der Operation wird der so umschnittenen Lappen mobilisiert, indem mittelst eines vom äusseren Schnitte aus eingeführten schmalen Raspatoriums der mukös-periostale Ueberzug des Gaumens vom Knochen abgehoben wird.

Zur Mobilisierung des weichen Gaumens wird der Ansatz dieses am Gaumenbein mit einem der Fläche nach gekrümmten Messer abgetrennt, so dass die Lappen allenthalben ohne Spannung in die Mittellinie verlagert werden können.

Der letzte Akt der Operation, die Naht, wird analog wie bei der Staphyloraphie in der Medianlinie vorgenommen.

Zur Vermeidung grösserer Spannung der aneinander adaptierten Lappen wurden halbmondförmige seitliche Entspannungsschnitte durch das Velum (Dieffenbach) empfohlen. Billroth verzichtet auf diese Velumschnitte und nimmt die Abmeisselung der medialen Platten der Proc. pterygoidei der Keilbeine vor, durch deren Ver-

schiebung nach innen die Entspannung erreicht wird. Wolff erzielt durch ausgiebige Ablösung des Involucrum palati eine genügende Mobilisierung auch des weichen Gaumens, so dass er Hilfsoperationen für entbehrlich hält.

### **Operationen an den Nerven.**

Sind im Verlaufe der Trigeminalneuralgie die konservativen Methoden ohne Erfolg geblieben, so tritt die operative Behandlung in ihre Rechte. Die einfache Durchtrennung des Nerven (*Neurotomie*) hat keine Berechtigung, da erfahrungsgemäss die Querschnitte des durchtrennten Nerven alsbald wieder aneinanderheilen.

Die Ausschneidung eines Stückes aus dem Nerven (*Neurektomie*) gibt diesbezüglich grössere Sicherheit, doch regeneriert sich der Nerv nach längerer Pause auch nach dieser Operation.

Grosse Strecken der Nerven mit ihren feinsten Verzweigungen können nach dem Verfahren von Thiersch extrahiert werden (*Extraktion der Nerven, Neuraxairesis*).

Der betreffende Nerv wird an bestimmter Stelle blossgelegt, mit einem zangenartigen Instrumente quer gefasst und durch langsames Drehen (eine halbe Drehung in der Sekunde, Thiersch) sowohl in seinen peripheren Verzweigungen, als in seinem zentralen Verlaufe auf grössere Strecke extrahiert.

**Erster Ast des Trigeminus (Ramus ophthalmicus).** Der schwächste der drei Aeste tritt durch die Fissura supraorbitalis in die Augenhöhle. Von den Aesten des Ramus primus ist bloss der N. frontalis chirurgisch von Bedeutung. Derselbe verläuft entlang dem oberen Orbitaldache;


von seinen Aesten verlässt der N. supratrochlearis über der Trochlea die Augenhöhle, um die Haut des oberen Augenlides und der Stirne zu versorgen. Der N. supraorbitalis zieht durch die Incisura supraorbitalis zur Stirne.

Zur Blosslegung des Nervus frontalis wird ein Schnitt unterhalb der Augenbraue parallel dem Supraorbitalrande angelegt. Durchtrennung der Haut und der Fascia tarso-orbitalis; der Inhalt der Orbita wird sorgfältig abgehoben, worauf am Dache der Augenhöhle der Stamm des Nerven sichtbar wird. Man sucht die Stämme auf, um sie mit der Zange zu fassen und einzeln auszureissen (Fig. 215).

**Zweiter Ast des Trigeminus.** Der Ramus supramaxillaris verlässt die Schädelhöhle durch das Foramen rotundum, gelangt in die Fovea sphenopalatina und in direkter Flucht durch die Fissura infraorbitalis in den, am Boden der Augenhöhle befindlichen Canalis infraorbitalis, den er durch das Foramen infraorbitale verlässt, um sich im Gesichte fächerförmig in seine Astgruppen aufzulösen. Das Foramen infraorbitale befindet sich entsprechend der Mitte des Infraorbitalrandes etwa 0,5 cm von diesem entfernt in der Fossa canina.

Zur Blosslegung des Nervus infraorbitalis an seiner Austrittsstelle in die Fossa canina verläuft der Schnitt etwa 0,5 cm unterhalb des Infraorbitalrandes, diesem parallel, in der Ausdehnung von etwa 4 cm. Der untere Wundrand wird mit Haken abgezogen, der Schnitt durch den M. quadratus labii sup. bis auf den Knochen geführt, und das Periost nach abwärts abgehebelt, wobei in der Wunde der aus dem Foramen infraorbitale austretende Stamm des Nerven, sowie die Ausstrahlungen desselben (Pes anserinus) sichtbar werden.

Nach Spaltung der Membrana tarso-orbitalis inf. lässt man den Inhalt der Orbita nach oben verziehen, wobei am Boden der Orbita der von einer dünnen Lamelle gedeckte Infraorbitalkanal blossliegt. Diese Lamelle wird möglichst zentral mit dem Meissel entfernt, der Nerv erfasst und sein zentrales Ende allmählich herausgezogen (Fig. 216).



**Fig. 215.**

**blosslegung des Nerv. frontalis.**

Das periphere Nervenende kann durch Aufrollen über die Thiersch'sche Zange bis in die feinsten Verzweigungen extrahiert werden.

Soll der Infraorbitalnerv an der Schädelbasis blossgelegt werden, so wird der Weg zu demselben durch temporäre Resektion des Jochbeins (Lossen, Braun) gebahnt. Hautschnitt (Kocher) wie zur Freilegung des N. infraorbitalis, in seinem lateralen Ende über den Jochhöcker verlängert. Das Jochbein wird im Zusam-



menhange mit dem Jochfortsatz des Oberkiefers und der Crista zygomatica des Keilbeins reseziert, so dass ein grosser Teil der lateralen Orbitalwand wegfällt. Das Jochbein wird, wenn es auch im Temporalfortsatz durchtrennt ist, nach aussen verzogen und der Nerv am Foramen rotundum mit der Thiersch'schen Zange erfasst und extrahiert.

**Dritter Ast des Trigeminus.** Der dritte Ast des N. Trigeminus verlässt die Schädelhöhle durch




Fig. 216.

Blosslegung des Nervus infraorbitalis.

das Foramen ovale. Von der oberen Gruppe der Nerven (Crotaphytico-buccinatorius) kann bloss der N. buccinatorius das Objekt eines chirurgischen Eingriffes sein.

Derselbe durchbohrt den M. pterygoideus ext. und verläuft an der Aussenfläche des M. buccinator bis an den Mundwinkel. Der Nerv ist bisweilen der Sitz isolierter Neuralgien.

Von den mächtigen Stämmen des Ramus inferior sind von chirurgischer Bedeutung: der Nervus mandibularis und der Nervus lingualis.

Der N. mandibularis, der stärkste Ast des Nerven, zieht zwischen M. pterygoideus ext. und int. nach abwärts; an der Innenfläche des Unterkieferastes tritt er mit der Arterie gleichen Namens in das Foramen mandibulare, durchläuft den Kanal, um als N. mentalis denselben im Foramen mentale zu verlassen.

Der N. lingualis verläuft in seinem Anfangsstücke gemeinsam mit dem Mandibularis nach abwärts. Am vorderen Rande des M. pterygoideus int. wendet er sich nach vorne und gelangt, über den M. mylohyoideus verlaufend, an den Seitenrand der Zunge.

**Extrabukkale Blosslegung des N. buccinatorius** (E. Zuckerkandl). Hautschnitt in der Richtung vom Tragus zur Mitte der Nasolabialfalte; der in der Wunde sichtbare Ductus Stenonianus wird nach abwärts verzogen. Nach Spaltung der Fascia masseterica erscheint der bukkale Fettpfropf, der aus seiner Nische hervorgeholt und extirpiert wird. Es ist nun in der Wunde sichtbar: der Proc. coronoideus des Unterkiefers mit dem kantig vorspringenden untersten Teile der Sehne des Schläfenmuskels. Am medialen Rande dieser Sehne liegt, in lockeres Zellgewebe gehüllt, der Stamm des N. buccinatorius.

Der **Nervus mandibularis** kann blossgelegt werden: vor seinem Eintritte in den Kanal, innerhalb des Kanals, und nach seinem Austritte aus dem Foramen mentale.

Vor seinem Eintritte in den Kanal, an der Lingula, ist der Nerv sowohl extrabukkal (Sonnenburg-Lücke), wie intrabukkal von der Mundhöhle her (Paravicini) zugänglich.

Sonnenburg führt einen Schnitt um den Unterkieferwinkel, löst den Ansatz des *M. pterygoideus int.* vom Kiefer ab und dringt an der Innenfläche des Kieferastes bis an die Lingula vor, wo der Nerv mit stumpfem Haken gefasst, vorgezogen und reseziert oder mit der Zange extrahiert wird.

Sonnenburgs Methode bietet insoferne Schwierigkeiten, als man genötigt ist, in grosser Tiefe zu operieren; selbst das Operieren am hängenden Kopfe erleichtert den Vorgang nur unwesentlich.

Nach Paravicini wird der Nerv von der Mundhöhle her, durch Abhebung des *M. pterygoideus int.* von der Innenfläche des Kieferastes an der Lingula blossgelegt.

Blosslegung des *N. mandibularis* innerhalb des Kieferkanales.


Am bequemsten gelangt man an den Nerven, wenn man ein Stück aus der äusseren Lamelle des Knochens, entsprechend der Stelle, wo der Körper des Unterkiefers an den Kieferast stösst, ausmeisselt und den *Canalis mandibularis* auf diese Weise freilegt.

Bogenförmiger Hautschnitt am Kieferwinkel. Ablösung der Ansätze des *M. masseter*, der mit dem Raspatorium im Bereiche des Kieferwinkels vom Knochen abgehoben wird. In der Mitte einer Linie, die den Kieferwinkel mit dem letzten Mahlzahn verbindet, wird mit dem Hohlmeissel ein linsengrosses Stück der äusseren Wand des Kiefers ausgemeisselt. Ist die Kortikalis passiert, so zeigt eine heftigere arterielle Blutung aus der verletzten *Art. mandibularis* an, dass der Kanal eröffnet ist. Mit einem Neivenhäkchen lässt sich der Nerv leicht aus seinem Bette heben und wird entweder reseziert oder besser mit der Zange extrahiert.

Der *N. lingualis* lässt sich am leichtesten

**Tab. 19a. Blosslegung des II. und III. Astes  
des Trigeminus an der Schädelbasis nach  
Krönlein.**


Das Jochbein mit dem Masseter nach unten, der Proz. coronoideus mit der Temporalsehne nach oben geschlagen. In der Wunde verläuft die Art. maxillaris interna, die mit dem Musc. pterygoideus ext. nach unten verzogen ist. Hinter der Wurzel des Proc. pterygoideus ist der Stamm des II. Astes. Am Foramen ovale der hier austretende, sich verzweigende dritte Ast.



**Fig. 217.**  
**Intrabukkale Blosslegung des N. mentalis.**

von der Mundhöhle her erreichen. Schnitt an der Seite der Zunge, entsprechend der Umschlagstelle der Schleimhaut von der Innenseite des Unterkiefers auf die Zunge. Der kräftige Nervenstamm liegt knapp unter der Schleimhaut.

Die Methoden Sonnenburg, Paravicini zur Blosslegung des N. mandibularis gestatten es auch, den N. lingualis in seinem oberen Verlaufe zu erreichen.





Der **N. mentalis** ist entsprechend seiner Austrittsstelle aus dem Kiefer sowohl extra-, als intrabukkal zugänglich. Zur extrabukkalen Blosslegung wird der Hautschnitt am Kinn in der Höhe des Eckzahns der betreffenden Seite, einige Zentimeter nach aussen geführt. Man dringt bis auf den Knochen, hebelt die Weichteile vom Kiefer ab, wobei der Nerv als gespannter Faden, aus dem Foramen mentale austretend, sichtbar wird.

Intrabukkal geht man in analoger Weise vor. Der Schnitt wird an der Umschlagstelle der Schleimhaut von der Innenfläche der Unterlippe auf den Kiefer angelegt (Fig. 217).

### **Operation zur Blosslegung des II. und III. Astes an der Schädelbasis nach Krönlein (Tab. 19a).**

Halbkreisförmiger, nach unten konvexer Lappen aus der Wange, dessen Basis der oberen Begrenzung der Jochbrücke entspricht.

Der Hautlappen wird nach oben präpariert, die Fascia temporalis oberhalb der Jochbrücke quer abgelöst, hierauf die Jochbrücke vor dem Tuberculum articulare und am Jochbeinkörper durchsägt und mit dem Ansätze des Masseter nach unten geschlagen.

Der blossgelegte Proc. coronoideus des Unterkiefers wird durchgekneipt und mit der Sehne des Temporal Muskels nach oben verzogen.

An den III. Ast gelangt man, wenn man vom oberen Rande des M. pterygoideus ext. an die Schädelbasis knapp hinter der Wurzel des Proc. pterygoideus, wo das For. rotundum sich befindet, herangeht.

Um an den Nervus supramaxillaris zu gelangen, muss man in der Wunde nach vorne zu in die Fossa pterygopalatina vordringen, wo man in der Tiefe der Nische den Nerven knapp nach

### Tab. 19b. Intrakranielle Blosslegung des Trigeminus nach Krause.

Am hängenden Kopfe ist durch temporäre Resektion die Dura blossgelegt; sie ist von der Schädelbasis abgehoben; man sieht am Foramen in spina die unterbundene Art. meningea med., und vor ihrem Eintritte in das Foramen rotundum resp. ovale die intrakraniellen Teile des II. und III. Astes des Trigeminus.

---

seinem Austritt aus dem Canalis rotundus mit einem Häkchen fassen und vorziehen kann.

Zur Wundversorgung werden die losgelösten Knochen an ihren ursprünglichen Standort durch Knochennaht befestigt; die Hautwunde wird vereinigt.

### Blosslegung des III. Astes an der Schädelbasis.

Retrobukale Methode von Krönlein.

Hautschnitt an der Wange in der Richtung vom Mundwinkel zum Ohrläppchen.


Der Wagenfettpfropf wird aus seiner Nische gehoben und in toto entfernt, worauf der Proc. coronoideus durchtrennt und nach oben disloziert wird. An der Innenseite des Unterkieferastes werden der N. lingualis und alveolaris inf. blossgelegt, isoliert und unter Abziehung des M. pterygoideus ext. nach oben bis an die Schädelbasis verfolgt.

Salzer bildet aus der Wangenschläfen- gegend einen Lappen mit unterer Basis, welcher den Jochbogen fingerbreit überragt.

Der Jochbogen wird reseziert und im Zusammenhang mit der Haut nach unten geklappt. Der Temporalmuskel wird, an seiner Insertion beginnend, vom Knochen abgelöst.

Von der Aussenfläche des Schläfenbeins an die untere Seite des Keilbeins vorschreitend, gelangt man an das Foramen ovale. Der Nerv wird







mit einem konkavschneidigen Tenotom an dieser Stelle durchtrennt.

Nach Mikulicz wird der Weg an den Nervenstamm durch temporäre Resektion des Unterkiefers dicht vor dem Ansatz des M. masseter gebahnt. Der Hautschnitt zieht vom Proc. mastoideus längs des Kopfnickers bis an das Horn des Zungenbeins, von da im Bogen an den Vorderrand des Masseter.

### **Intrakranielle Operation am Trigeminus, nach Krause (Tab 19 b).**

„Uterusförmiger“ Lappen aus der Schläfengegend, dessen Basis über dem Jochbogen gelegen ist. Die Höhe des Lappens beträgt 6,5 cm. Der Schnitt dringt bis auf den Knochen.

Das Kranium wird in der Form und Grösse des Hautlappens mit der Kreissäge resp. mit Meissel und Hammer durchtrennt und die Haut im Zusammenhang mit dem Knochenlappen nach unten geklappt.

Zwischen knöcherner Schädelbasis und Dura wird in der mittleren Schädelgrube bis an das Foramen in spina vorgedrungen, wo der Stamm der Art. meningea unterbunden und durchtrennt wird.

Dazu muss das von der Dura umschlossene Hirn mit breitem Spatel vorsichtig nach oben gelüftet werden. Unter weiterer Lösung der Dura vom Knochen und Abhebung des Hirns nach oben erscheint in der Tiefe der mittleren Schädelgrube das extradural gelegene Ganglion Gasseri. Dieses wird am Uebergange zum Trigeminusstamm quer mit der Thiersch'schen Zange erfasst, worauf der II. und III. Ast an den intrakraniellen Mündungen des Kanals durchschnitten wird. Vorher war bereits der I. Ast an seiner unmittelbaren Ver-

bindung mit dem Ganglion abgetrennt worden. Ein weiteres Verfolgen des I. Astes ist wegen Gefahr der Sinusverletzung nicht geboten.

Durch Drehen der Zange wird das Ganglion im Zusammenhange mit einem Stück des zentralen Trigeminusstammes extrahiert.

Um den Zugang zu erleichtern, die notwendige Hebung des Hirns zu verringern, vergrößert Lexer die Wunde nach unten zu durch temporäre Resektion des Jochbogens und Ausmeisselung der Schädelbasis bis an das Foramen ovale.

### **Operationen an den Luftwegen.**

Die Luftwege können eröffnet werden: im Bereiche des Kehlkopfes (Laryngotomie) und im Bereiche der Luftröhre (Tracheotomie). Die Schnitte zur Eröffnung des Respirationstraktes sind longitudinal und werden an der Vorderseite des Halses, der Mitte dieses entsprechend, angelegt.

Die oberen und unteren Zungenbeinmuskeln, die den Respirationstrakt zunächst bedecken, sind symmetrisch angeordnet und stossen in der Mittellinie des Halses aneinander. Zwischen den medialen Rändern dieser Muskel (*Linea alba colli*) kann man, indem man bloss Faszienblätter und Zellgewebsräume passiert, an den Kehlkopf resp. die Trachea gelangen.

### **Die Eröffnung des Kehlkopfes (Laryngotomie).**

Ueber die Lage der knorpeligen Bestandteile des Kehlkopfes ist an der Oberfläche des Halses eine genaue Orientierung durch Palpation möglich; die *Prominentia laryngea*, die Kante, an welcher die Schildknorpelplatten aneinander grenzen, der

Bogen des Ringknorpels sind palpabel, ebenso wie das Lig. crico-thyreoideum, als eine weniger resistente Stelle, zwischen Schild- und Ringknorpel nicht zu verkennen ist.

Der Kehlkopf wird entweder im Bereiche des Schildknorpels, entsprechend der Medianlinie gespalten (Thyreotomie) oder im Bereiche des Ligamentum conicum eröffnet (Crico-thyreotomie); endlich kann der Kehlkopf der ganzen Länge nach bis an den obersten Trachealring durch den medianen Schnitt eröffnet werden (Laryngofissur).

Der Thyreotomie resp. Laryngofissur wird stets die Tracheotomie und Einlegung einer Trachealkanüle vorausgeschickt.

Die Thyreotomie wird vorgenommen:

1. bei Fremdkörpern des Larynx, die eingekeilt, endolaryngeal sich nicht entfernen lassen;
2. bei narbigen Verengerungen des Larynx;
3. bei Tumoren des Larynx;
4. als Vorakt der totalen oder halbseitigen Larynxexstirpation.

Die Laryngofissur kann bei Geschwulstexstirpationen nötig werden, wenn zur Ausrottung derselben ein weiterer Zugang in das Innere des Kehlkopfes geschaffen werden soll.

Zur Ausführung der Thyreotomie resp. Laryngofissur befindet sich der Kranke mit erhöhtem Oberkörper in Rückenlage; die Halswirbelsäule ist stark gestreckt.

Schnitt genau in der Medianlinie vom Zungenbein bis an den Ringknorpel. Die Halsfaszie trennend, dringt man zwischen den Musculis sternohyoideis, stets mit dem Messer arbeitend, bis an

## Tab. 20. Laryngofissur.

Die membrana hyo-thyreoidea, der Schildknorpel, das Lig. conicum und der Ringknorpel sind median gespalten.

Die Schildknorpelplatten sind mit Haken von einander gezogen; man übersieht das Innere des Kehlkopfes, die Aryknorpel, die Taschenbänder und die wahren Stimmbänder.


---

den Schildknorpel vor. Der Schildknorpel wird an seinem unteren Rande mit einem scharfen Häkchen fixiert und ein spitzes Messer im Ligam. conicum bis in das Kehlkopflumen eingestossen. Von dieser Lücke aus wird der Schildknorpel mit der Schere, mit dem Knopfmesser, wenn nötig, mit der Knochenschere streng median aufwärts bis in das Ligam. hyo-thyreoideum gespalten.

Die Schildknorpelplatten werden durch eingesetzte scharfe Wundhaken voneinander gezogen, worauf das Innere des Larynx etwaigen Eingriffen zugänglich ist (Tab. 20).

In der Natur des Eingriffs ist es bisweilen gelegen, dass der Larynx während der Nachbehandlung offen erhalten werde. Im anderen Falle werden die Knorpelplatten und darüber die Haut durch die Knopfnahst geschlossen. Dabei bleibt für die ersten Tage der Wundheilung die Luftzufuhr durch die in der Trachea liegende Kanüle gesichert.

Die Crico-thyreotomie, die Eröffnung des Larynx im Ligam. krico-thyreoideum kann bei der oberflächlichen Lage des Lig. conicum, wenn nötig, in kürzester Zeit ausgeführt werden; aus diesem Grunde ist die Cricothyreotomie die Operation, vermitteltst welcher man die akute Erstickungsgefahr, wie sie nach Verlegung des Kehlkopfes durch einen Fremdkörper, bei Laryngospasmus etc. vorkommt, wirksam zu bekämpfen vermag. Ein kurzer Hautschnitt von der Mitte der Schildknorpelkante nach abwärts bis über den



Lith. Aust. F. Reichhold. München.





Ringknorpel (Fig. 218). Man kann, wenn Gefahr im Verzuge ist, schon nach Spaltung der Haut das untere Ende des Ringknorpels mit einem durch das Lig. eingestossenen einfachen spitzen Haken fassen und festhalten; ist man durch Tasten mit dem Finger über die Lage des Ligamentes orientiert, so wird dieses mit dem spitzen Messer in der Mittellinie vorsichtig eingeschnitten, bis man mit dem Messer das Gefühl hat, in der Lichtung des Kehlkopfes sich zu befinden. Sofort wird durch zwei, rechts und links eingesetzte Haken der Spalt im Ligament zum Klaffen gebracht, und wenn nötig, noch eingekerbt. Die Kanüle wird eingeführt und durch Bändchen, die im Nacken geknüpft werden, fixiert.

Bei dieser Art des Vorgehens ist eine Blutstillung nicht nötig, die Kanüle liegt den Wänden der kleinen Wunde so dicht an, dass sie als Tampon wirkt.

Hat man genügende Zeit zur Ausführung der Operation, so wird bei grösserer Länge des Hautschnittes das Ligamentum conicum sorgfältig prae-  
parando blossgelegt. Nach Pässierung des Unterhautzellgewebes wird die Halsfaszie gespalten und das Ligamentum conicum blossgelegt. Der untere Ringknorpelrand wird mit Hilfe eines einfachen, spitzen Hakens, der in der Mitte eingestossen wird, emporgehoben und hierauf nach vertikaler Spaltung des Bandes eine Kanüle eingelegt. Wenn nötig, wird der Längsschnitt im Ligamente rechts und links eingekerbt; durch den so zustande gekommenen + Schnitt geht die Einführung der Kanüle leicht von statten.

### **Totale und partielle Entfernung des Kehlkopfes.**


**Totalexstirpation der Larynx nach Billroth.** Tracheotomie einige Tage vor der

### Tab. 21. Exstirpation des Kehlkopfes.

Letzter Akt der Operation. Die Trachea ist quer durchschnitten, der Larynx (L.) ist gehoben, wobei sich die Verbindungen zwischen der vorderen Pharynxwand und dem Ringknorpel anspannen. Nach oben zu hängt der Kehlkopf noch durch das Ligamentum hyo-thyroideum mit dem Zungenbein (Z.) zusammen. Ph. Hintere Pharynxwand. Li. Nerv. laryngeus inf.

Operation. Einlegung der Tamponkanüle. Hängender Kopf. Längsschnitt in der Medianlinie über den Schildknorpel, dem in der Höhe des Zungenbeins eine quere Inzision angeschlossen wird. Nach Spaltung der Fascia colli werden von der Medianlinie aus die Ansätze der Sternothyroidei vom Schildknorpel gelöst. Allmählich gelangt man so bei Drehung der Larynx an dessen hintere Kante, wo auch die Ansätze des Schlundkopfschnürers vom Kehlkopf abpräpariert werden. Ist auch der obere Pol der Schilddrüse jederseits stumpf abgelöst, so ist der Kehlkopf genügend frei, um ganz aus seinem Gefüge gehoben zu werden. Zu diesem Zwecke wird die Trachea quer durchschnitten und nach oben gezogen, und während der Kehlkopf stark gehoben wird, lassen sich die Verbindungen zwischen der vorderen Pharynxwand und dem Ringknorpel mit dem Messer trennen (Tab. 21). Endlich hängt der Kehlkopf bloss noch am Ligamentum hyo-thyroideum, welches nach Unterbindung der Art. laryngea superior mit der Schere jederseits durchschnitten wird. Die Wunde im Pharynx wird möglichst verkleinert und ein Schlundrohr eingelegt. Die Tamponkanüle wird durch eine gewöhnliche Kanüle ersetzt. Die Wunde in der Haut wird durch Nähte verkleinert; die Höhle wird tamponiert.

Die partiellen Entfernungen am Kehlkopfe erfordern stets als Vorakt die Laryngofission. Diese ermöglicht eine genaue Orien-





tierung und die Bestimmung der zu entfernenden Teile. Man kann die halbseitige Resektion (wobei man sich an die früher angegebenen Regeln hält) ausführen oder die Exzision nur auf die Schleimhaut beschränken.

### **Tracheotomie.**

Die T. ist die kunstgerechte Eröffnung der Luftröhre mittelst Schnittes. Dem Eingriff wird in allen Fällen die Einlegung einer Kanüle durch den Schlitz der Luftröhre angeschlossen.

#### **Indikationen:**

1. Verletzungen des Kehlkopfes (Stich-, Schnitt-, Schussverletzungen, Frakturen des Kehlkopfgerüsts mit Dislokation der Fragmente);
2. Fremdkörper der Trachea, die sich auf endolaryngealem Wege nicht entfernen lassen.
3. Stenosen des Larynx und der Trachea;
  - a) Kompressionsstenosen (Strumageschwülste, Aneurysmen);
  - b) Obturationsstenosen. Verlegung des Kehlkopf- oder Tracheallumens, Schwellung der Kehlkopfschleimhaut (bei diffuser submuköser Laryngitis, bei Larynxerkrankungen tuberkulöser, syphilitischer, typhöser Natur);  
Verlegung der Kehlkopflichtung resp. der Trachea durch Exsudatmassen (diphtheritischer Kroup), durch Geschwülste (Karzinome, Papillome, Granulationsgeschwülste);
  - c) Narbige Verengerungen des Larynx. Nach ausgeheilten ulzerösen Prozessen, nach operativen Eingriffen im Larynx;

4. Präventiv als Vorakt oder in Verbindung mit Operationen am Larynx und Pharynx wird die Tracheotomie ausgeführt, um

- a) das Einfließen von Blut in die Bronchien zu verhindern (Tamponkanüle);
- b) nach ausgeführter Operation mit Umgehung des offen gebliebenen oder durch Tamponade verschlossenen Larynx dem Kranken Luft zuzuführen;

5. Asphyxien oder Intoxikationen zur Ermöglichung und Einleitung der künstlichen Atmung.

Die Luftröhre schliesst sich dem Kehlkopf an und verläuft in der Medianlinie des Halses gegen die obere Brustapertur. Die oberen Anteile der Trachea sind der Oberfläche des Halses am nächsten. Der suprasternale Teil der Luftröhre ist von der Haut nebst den beiden Blättern der Halsfaszie durch eine ansehnliche Zellgewebsschicht getrennt, in welchem zahlreiche Venen enthalten sind. Die Schilddrüse überlagert mit ihren beiden durch den Isthmus verbundenen Lappen die Luftröhre etwa zwischen dem 3. und 6. Knorpelringe; oft deckt auch ein Lobus pyramidalis der Schilddrüse den obersten Teil der Luftröhre.

Die vordere Seite der Luftröhre und der Schilddrüse ist durch die vom Brustbein zum Zungenbein resp. Schildknorpel ziehenden Muskel (sterno-hyoidei, sterno-thyreoides) gedeckt. In der Mittellinie bleibt zwischen den Muskeln ein Streifen der Trachea bloss von den Halsfaszien bedeckt. In dieser „Linea alba colli“ wird auf die Luftröhre vorgedrungen. Durch den Isthmus der Schilddrüse zerfällt die Luftröhre in eine pars supra- und infrathyreoidea. Die Eröffnung der ersteren — Tracheotomia superior, die der letzteren — Tracheotomia inferior.

### **Tracheotomia superior.**

Rückenlage bei überstrecktem Hals. In Schulterhöhe ein walzenförmiges Kissen unter dem Rücken. Der Operateur ist an der rechten, der Assistent an der entgegengesetzten Seite des Kranken postiert. Der Hautschnitt genau in der Medianlinie des Halses von der Mitte des Schildknorpels bis über die Schilddrüse. Ist die Haut und das Unterhautzellgewebe passiert, so wird die straffe Faszie des Halses auf der Hohlsonde gespalten. Es erscheinen die medialen Ränder der Musculi sternohyoidei, die mit stumpfen Haken symmetrisch abgezogen werden. Man orientiert sich mit dem tastenden Finger über die Lage der Trachea und legt die obersten Ringe dieser bloss, indem man mittelst zweier anatomischer Pinzetten das Zellgewebe von der Trachea abstreift. In zweckmässiger Weise erweitert man das Operationsfeld, wenn man das Faszienblatt, welches zwischen dem oberen Rande der Schilddrüse und der Trachea ausgespannt ist, einschneidet und die Drüse mittelst eingesetztem, stumpfem Haken nach abwärts disloziert.

Ehe man an die Eröffnung der Trachea geht, müssen die obersten Ringe dieser völlig freipräpariert vorliegen. Erst dann wird die Luftröhre knapp unter dem Ringknorpel, genau entsprechend der Medianlinie, mit einem einfachen, spitzen Haken erfasst, etwas gehoben und in dieser Lage fixiert erhalten.

Mit dem spitzen Messer wird die Trachea genau in der Mittellinie von unten nach oben in der Ausdehnung von etwa 1 cm geschlitzt; die so gesetzte Trachealwunde wird durch eingesetzte einfache, spitze Haken aufgeklafft, ev. rechts und links etwas eingekerbt. Während das ganze System der drei Haken unverrückt festgehalten wird, führt der Operateur die Kanüle in die Trachea ein.

### Tab. 22. Tracheotomia inferior.

Seitlich begrenzt ist die Wunde von den *Musc. sterno-hyoideis*. Die Luftröhre ist blossgelegt und an ihrer Vorderseite zur Einlegung der Kanüle eröffnet. Von der Schilddrüse sieht man Venenstämme (*Venae thyreoideae imae*) nach abwärts ziehen. Der Trachea knapp angelagert liegt rechterseits in der Tiefe die *Arteria anonyma*.

Die Hautwunde wird durch Knopfnähte verkleinert und die Kanüle durch Bändchen exakt fixiert.


### Tracheotomia inferior.

Lagerung des Kranken wie zur *Tr. sup.* Hautschnitt vom unteren Rande der Schilddrüse bis über das Jugulum (Fig. 218). Nach Passierung der Haut und des Unterhautzellgewebes wird das oberflächliche Blatt der Halsfaszie blossgelegt und in der Richtung des Hautschnittes auf der Hohlsonde gespalten. Eine beträchtliche Schicht lockeren Zellgewebes wird stumpf mittelst zweier anatomischer Pinzetten passiert, während der mediale Rand des *Musc. sterno-hyoideus* jederseits abgezogen wird. In der dichten Lage des Zellgewebes verlaufen die *Venae thyreoideae imae* senkrecht nach abwärts zur *V. anonyma sinistra*, und müssen geschont, eventuell vor der Durchtrennung doppelt ligiert werden. Während des stumpfen Präparierens soll man stets durch Tasten mit dem Zeigefinger über den Situs der Trachea, auf deren Konvexität vorgedrungen wird, orientiert sein.

Ehe man an die Trachea gelangt, wird noch das tiefe Blatt der Halsfaszie auf der Hohlsonde gespalten; erst wenn dies geschehen, lässt sich die Trachea genügend isolieren.

Vor der Eröffnung wird die Luftröhre mit einem spitzen, einfachen Haken erfasst, in das Niveau der Haut gehoben und fixiert gehalten.







Während die Trachea von unten nach oben eingeschnitten wird, kommt der Zeigefinger der linken Hand in den unteren Wundwinkel hinter das Jugulum zu liegen, so dass die hinter dem Manubrium sterni quer über die Trachea ziehende Vena anonyma sinistra, sowie die der Luftröhre




Fig. 218. Hautschnitte am Halse.

- a) Pharyngotomia infrahyoidea, b) Cricothyreotomia.  
c) Tracheotomia inf.

innig anliegende Arteria anonyma genügend geschützt bleiben. Die Trachealwunde wird durch eingesetzte einfache, spitze Haken klaffend erhalten, eventuell rechts und links eingekerbt, worauf die Einführung der Kanüle vorgenommen wird (Tab. 22). Liegt die Kanüle in der Trachea, so werden die Haken entfernt; die Kanüle wird mit

Bändchen fixiert und die Hautwunde durch Nähte verkleinert.

Kann man die Tracheotomie in Ruhe ausführen, so bietet der typische Eingriff keine Schwierigkeiten. Anders, wenn bei drohender Lebensgefahr, bei schwerer Dyspnoe die Operation vorgenommen werden muss. Es bedarf der ganzen Kaltblütigkeit und Geistesgegenwart des Operierenden, um Herr der oft kritischen Situation zu werden. Die kleinsten Venen des Halses sind dila-



Fig. 219.  
Trachealkanüle.




Fig. 220.  
Trendelenburgs Tamponkanüle.

tiert und strotzend gefüllt. Man lege in solchem Falle den Hautschnitt grösser an, weil dadurch das Fassen und Ligieren der Venen wesentlich erleichtert wird. Die Wände der dünnwandigen Venen sind in ausgespanntem Zustande nicht als solche kenntlich. Venen, die dem Vorgehen in die Tiefe hindernd im Wege stehen, werden doppelt ligiert und zwischen den Ligaturen durchtrennt. Man sucht sich während des schichtweisen Präparierens stets über die Lage der Trachea zu orientieren; es kann sich bei Ausserachtlassung dieser Vorsicht ereignen, dass man an der Trachea vorbei, in die Tiefe vordringt.

Ehe man an die Eröffnung der entsprechend blossgelegten Trachea geht, sollen alle blutenden Gefässe durch die Ligatur bereits geschlossen sein. Das Einhaken der Trachea hat den Zweck, das Organ, welches namentlich bei Dyspnoe, mit den Atembewegungen in der Richtung des Halses auf- und absteigt, ruhig zu stellen und in das Niveau der Wunde zu ziehen.

Die Eröffnung der Luftröhre soll genau entsprechend der Mittellinie vorgenommen werden,

#### Krieshaber'sche Kanüle.




Fig. 221.

a) Kanüle, zur Einführung mit Konduktor armiert.




Fig. 222.

b) Definitive innere Kanüle.

dabei ist zu achten, dass der Schnitt bis in die Lichtung der Trachea und nur gerade bis hierher dringe. Ist die Eröffnung unvollständig, so kann es passieren, dass die Trachealkanüle unter der Schleimhaut sich einen Weg bahnt; bei unvorsichtigem Gebahren kann auch die hintere Trachealwand, ja selbst der Oesophagus mit dem Messer verletzt werden.

Nach Eröffnung der Luftröhre wird der Schnitt in derselben mit Haken klaffend erhalten, während gleichzeitig bei Einführung der Kanüle

die Trachea selbst unverrückt fixiert wird; es ist dies besonders wichtig, da im anderen Falle bei den Bewegungen der Luftröhre der Schlitz in dieser aus dem Gesichtsfelde verschwindet; abgesehen davon, dass dieser Umstand die exakte Einlegung der Kanüle unmöglich macht, kann es zu Hautemphysem kommen, welches von der Wunde aus sich rasch auf die Zellräume des Halses ausbreitet.




Fig. 223.

Gersunys Trichterkanüle.

Die Kanüle (Fig. 219) wird, entsprechend ihrer Krümmung, im Bogen eingeführt; das pfeifende Geräusch, mit welchem die Luft — nach einer kurzen Phase der Apnoe — aus dem Rohr entweicht, ist das Zeichen für die richtige Lage der Kanüle. Viel gebraucht wird, namentlich in Frankreich, die Kieselhaber'sche Kanüle (Fig. 221, 222), die zur Einführung mit einem konisch geformten Konduktor armiert wird. Ist die Kanüle in situ, so wird der Konduktor durch eine definitive innere Kanüle ersetzt.

Gersuny verwendet eine Kanüle, die er wegen ihrer konischen Form „Trichterkanüle“ nennt. Sie ist vorwiegend bei tiefer Tracheotomie bei Kindern am Platze. Vermöge ihrer Form liegt ihr tracheales Ende nirgends der Schleimhaut an, so dass Druckgeschwüre vermieden werden. Ihr weites Kaliber gestattet freie Respiration. Das Fenster liegt genau in der Achse der Luftröhre (Fig. 223).

Bis zur Fixierung der Kanüle mit dem Bändchen muss diese in der Wunde unverrückt festgehalten werden.

Die Tracheotomie zum Zwecke der Tamponade der Trachea, bei gleichzeitiger Sicherung der Luftzufuhr, wird vor blutigen Eingriffen im Bereiche der Mundhöhle, des Larynx und Pharynx angewandt. Die Tamponkanüle hat den Zweck, bei der Operation das Einfließen von Blut, im weiteren Verlaufe die Aspiration von Wundsekreten zu verhindern.

Die hier zur Anwendung kommende sog. Tamponkanüle ist (Hahn) mit Pressschwamm umwickelt, der in der Trachea aufquillt und das Luftröhre völlig ausfüllt, oder trägt (Trendelenburg) über dem Rohre einen kleinen Kautschukballon, der durch ein über dem Schilde angebrachtes Gebläse mit Luft gefüllt werden kann (Fig. 220).

Der Ballon wird aufgeblasen, wenn die Kanüle bereits in die Trachea eingelegt ist. Der aufgeblähte Ballon legt sich den Wandungen der Luftröhre innig an und verschliesst die Lichtung derselben wie ein Stöpsel den Hals einer Flasche.

### Intubation.

Die Intubation ist ein unblutiger Eingriff, um den Kehlkopf bei etwaigen Atmungshindernissen durch Einlegung einer starren Röhre wieder durch-

gänglich zu machen. Dieses Verfahren ist vor einigen Jahren als Ersatz für die Tracheotomie bei der kroupösen Larynxstenose vorgeschlagen worden und hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr Anhänger erworben.

Die hauptsächlichste Indikation zur Intubation ist die Larynxstenose, wie wir sie beim Larynxkroup beobachten.

Weitere Indikationen sind die verschiedenen chronischen Stenosen des Larynx an

**O'Dwyers Instrumentarium zur Intubation.**




Fig. 224.  
Mundspiegel.




Fig. 225 und 226.  
Tuben mit Konduktor.

Erwachsenen. Hiert tritt die Intubation an Stelle der Tubage.

Auch als palliatives Mittel gegen Keuchhusten und Laryngospasmus wurde die Intubation empfohlen.

Kontraindiziert ist der Eingriff:

- a) bei komplettem Abschluss des Cavum pharyngo-nasale;
- b) bei hochgradigem Glottisoedem;
- c) bei Diphtherie, welche mit Retropharyngealabszess kompliziert ist.



Das Originalinstrumentarium von O'Dwyer, trotz aller Modifikation das beste, besteht:

1. aus einem Mundspiegel (Fig. 224);
2. aus einer Reihe verschieden grosser Metalltuben (Fig. 225, 226). Jedes Rohr trägt an seinem oberen Ende, einen der Krempe eines Hutes gleichenden, breiten Rand, mit welchem der Tubus den Stimmbändern aufrufen soll. In diesem Rande ist linkerseits eine Oese für den fixie-



Fig. 227. Intubator.




Fig. 228. Extubator.

renden Faden angebracht. Ferner ist jeder Tubus mit einem Konduktor versehen, der die Dirigierung der starren Röhre erleichtern soll;

3. aus dem Intubator (Fig. 227), an welchen der erwähnte Konduktor angeschraubt wird. Die Tube soll dem Konduktor genau angepasst sein; durch eine Hebelvorrichtung kann der Tubus im geeigneten Momente vom Konduktor abgestreift werden;

4. aus dem Extubator (Fig. 228). Das Ende dieses, ähnlich dem Intubator geformten Instrumentes kann in die Höhlung des Tubus eingeführt, dortselbst festgeklemmt werden und dient auf diese Weise zur Entfernung des Röhrchens.

Der Eingriff wird, wie folgt, vorgenommen:

Eine Wärterin nimmt das zur Intubation bestimmte Kind auf den Schoß, klemmt die Beine des Kindes zwischen ihre Kniee ein und hält mit der rechten Hand den Kopf, mit der linken Hand die Hände des betreffenden Kindes fest. Während ein Assistent den Mund mittelst des Mundspiegels offen hält, sucht man mit dem Zeigefinger der linken Hand den Kehlkopfdeckel, zieht ihn nach vorne, so dass der Kehlkopf frei wird, und führt dann den Intubator, welchem der entsprechende Tubus angepasst ist, neben dem Finger ein. Der Tubus wird dabei genau in der Sagittalebene horizontal gehalten, der Griff des Instrumentes vertikal erhoben. Wird der Griff des Intubators nach aufwärts gehoben, so gleitet das untere Tubusende am Finger in den Kehlkopfeingang.

Ist man nach einer leichten Bewegung nach oben gewiss, dass der Tubus in den Kehlkopf eingedrungen ist, so schiebt man denselben sachte hinein, befreit ihn von dem Intubator (entweder mit dem Finger der linken Hand oder durch einen leichten Druck nach vorne auf die Schiebervorrichtung) und drückt ihn dann mit dem Zeigefinger der linken Hand tief in den Larynx hinein. Hat man beobachtet, dass das Kind gut atmet, so kann man entweder den am Tubus angebrachten Faden belassen und ihn an der Wange mittelst Heftpflasters befestigen, oder aber man fährt nochmals mit dem Zeigefinger in den Mund hinein, fixiert die Tube und zieht den durchschnittenen Faden langsam heraus.

Die Extubation geht in derselben Weise

vor sich; man führt wieder unter Leitung des Zeigefingers der linken Hand den Extubator in den Mund ein und bringt dessen geschlossene Branchen in das Lumen des Tubus. Durch einen Druck auf den oberen Teil des Instrumentes werden dann die beiden Branchen auseinander gebracht und so der Tubus in schonender Weise herausgezogen.

In den allermeisten Fällen kann man vom Gebrauch des Mundspiegels bei der Intubation absehen; natürlich muss dann der Zeigefinger der linken Hand zum Schutze mit einem Metallring versehen sein.

### **Pharyngotomie.**

Man kann den Schlund blosslegen:

1. in seinem oberen Abschnitte durch temporäre seitliche Unterkiefer-Resektion;

2. entsprechend seiner Pars laryngea, durch quere Trennung des Ligamentum hyo-thyreodeum (Malgaigne);

3. in ausgedehntem Masse durch seitliche Eröffnung (Langenbeck), bei welcher die tieferen Pharynxabschnitte zugänglich werden.

### **Pharyngotomia infrahyoidea.**

Die Durchtrennung des Lig. hyo-thyreodeum macht den laryngealen Teil des Schlundes erreichbar. Diese Art der Eröffnung des Schlundes und Kehlkopfes (Malgaignes Laryngotomie soushyoideenne) eignet sich zur Ausführung chirurgischer Eingriffe an der Epiglottis, im Kehlkopf und am Schlundkopfe selbst.

Die Pharyngotomia infrahyoidea wurde ausgeführt:

### Tab. 23. Pharyngotomia infrahyoidea.

Es ist praeventiv die Tracheotomia inf. gemacht und eine Kanüle eingelegt.

In der Pharyngotomiewunde sieht man die Stümpfe der durchtrennten Zungenbeinmuskeln, sowie das Zungenbein (H).

Die Epiglottis (E) ist aus der Wunde vorgezogen; es spannen sich die Ary-epiglottischen Falten (A e). Der Grund der Wunde wird von der hinteren Wand des Pharynx gebildet.

zur Entfernung von Fremdkörpern des Larynx und Pharynx;


zur Exstirpation von Geschwülsten der Epiglottis, des Kehlkopfs und des Schlundes;

zur Behandlung narbiger Strikturen des Oesophagus.

Ausführung der Operation: Der Kranke befindet sich in Rückenlage, der Kopf hängt über den Tischrand, die Halswirbelsäule ist überstreckt. Präventive Tracheotomie.

Man orientiert sich durch Tasten über die Lage des Zungenbeins und des Schildknorpels. Der Hautschnitt wird parallel dem Zungenbeinkörper in querer Richtung näher dem Os hyoideum über das Ligamentum hyo-thyreoideum geführt (Fig. 218); ist die Halsfaszie gespalten und sind die Musc. sternohyoidei und thyreohyoidei quer durchtrennt, so liegt die Membran bloss. Man löst diese von der hinteren Fläche des Zungenbeins ab und eröffnet den Schlund entsprechend der Mitte, am oberen Rande des Zungenbeins. Auf diese Weise nur bleibt die Epiglottis geschont, die nach Durchtrennung des Lig. hyo-epiglotticum nach abwärts sinkt, worauf auch die seitlichen Partien des Lig. hyo-thyreoideum mit je einem Scherenschlage durchschnitten werden. Es sind nun die Epiglottis, die ary-epiglottischen Falten, die Stimmbänder, das ganze Kehlkopfinnere, wie die Wände der Pars laryngea pharyngis, eventuellen Eingriffen zugänglich gemacht (Tab. 23).

*Tab 23.*





### Seitliche Pharyngotomie.

Die seitliche Eröffnung des Schlundkopfes wurde von Langenbeck zur Entfernung ausgedehnter Geschwulstbildungen in den tieferen retrolaryngealen Abschnitten des Pharynx empfohlen. Durch Dislokation des Kehlkopfes lassen sich hier alle Teile der Pharynxwand in den Bereich der Wunde bringen.

**Praeventive Tracheotomie.** Der Hautschnitt zieht an der kranken Seite, von der Mitte des Unterkieferastes über das grosse Zungenbeinhorn nach abwärts bis an den Ringknorpel, oder über diesen hinaus, bis nahe an die Tracheotomiewunde.

Man passiert die *Fascia colli superf.*, das *Platysma* und durchschneidet den *M. omohyoideus*. In die Tiefe präparierend, werden die *Arteria lingualis*, *Art. thyreoidea sup.* und Aeste der *Vena facialis* ligiert und durchschnitten. Wird noch der hintere Biventerbauch und der *M. stylohyoideus* vom Zungenbein abpräpariert und durchtrennt, so ist die seitliche Pharynxwand zur Inzision in genügendem Maasse freigelegt. In der klaffenden Pharynxwunde sind der Kehlkopf, die Epiglottis, der Zungengrund sichtbar. Durch Drehung des Kehlkopfes kann man beliebige Teile des Pharynx in die Wunde einstellen (Tab. 24).

### Oesophagotomia externa.

Die Eröffnung der Speiseröhre am Halse ist angezeigt:

1. bei Fremdkörpern des Oesophagus;
2. bei impermeablen, hochsitzenden Stenosen des Oesophagus (Karzinom, Narbenstriktur) zur Anlegung einer Ernährungsfistel jenseits der verengten Stellen;
3. bei Narbenstrikturen von tieferem Sitz;

### Tab. 24. Seitliche Pharyngotomie nach Langenbeck.


Die geräumige Wunde ist nach aussen begrenzt von der Art. carotis, an der die Stümpfe der durchschnittenen Art. lingualis (L.) und Art. thyroidea sup. (Ts.) sichtbar sind. Nach innen sind die oberen und unteren Zungenbeinmuskeln, Mylohyoideus, Hyoglossus, Sternothyroideus, Thyrohyoideus, der Stumpf des Omohyoideus (Oh.) sichtbar. Im oberen Wundwinkel die Gland. subm., die Stümpfe des Biventer (B.) und der Nervus hypoglossus (Hg.). Der Pharynx ist seitlich breit, eröffnet; man sieht in der klaffenden Wunde den Kehldeckel, den Larynx und die hintere Pharynxwand. Sch. Musc. laryngopharyngeus. Z. Zungenbein.

- 
- a) zur Ausführung der Dilatation von der angelegten Fistel her;
  - b) zur Ausführung der Oesophagotomia int. von der Wunde aus (Gussenbauers kombinierte Oesophagotomie).

Die Speiseröhre wird in ihrem knapp unter dem Schlundkopf gelegenen Anteile, jenseits des Ringknorpels eröffnet, wo sie hinter der Luftröhre gelegen, über die linke Seite dieser vorragt. Der zwischen der Trachea und dem Oesophagus von unten nach oben verlaufende Nervus laryngeus inferior muss geschont werden.

Der Kranke befindet sich in Rückenlage, die Halswirbelsäule ist überstreckt, der Kopf nach rechts gedreht. Hautschnitt entsprechend dem vorderen Rande des M. sterno-cleido-mastoideus, wie zur Unterbindung der Art. carotis comm. Die Scheide des Kopfnickers wird eröffnet, der Muskel nach aussen verzogen. Das tiefe Blatt der Halsfaszie wird auf der Hohlsonde gespalten und das ganze Paket der Gefässe und Nerven mit stumpfen Haken ebenfalls nach aussen verzogen. Lässt man gleichzeitig die Schilddrüse nach innen dislozieren, so wird in der Wunde die Trachea und hinter dieser, etwas über den Rand der Luftröhre vorragend, die Speiseröhre — an ihrer differenten







Färbung und Längsfaserung kenntlich, sichtbar. Dieselbe wird mit Fixationsfäden erfasst, in das Niveau der Wunde gezogen und entsprechend dem Hautsnitte mit der Schere eröffnet (Fig. 299).

Ist der Engriff derart beschaffen, dass die Wunde der Speiseröhre primär verschlossen werden kann (z. B. nach Fremdkörperextraktion), so wird die Wand des Oesophagus in zwei Etagen




Fig. 229.

### Oesophagotomie.

Die Wand des Oesophagus ist mit Fixationsfäden armiert, eröffnet und vorgezogen.

mit Knopfnähten verschlossen. Die erste Reihe von Nähten stellt den Verschluss der Schleimhaut her, die zweite umfasst die Muskulatur.

Soll eine Oesophagusfistel etabliert werden (z. B. zur Dilatation einer Stricture oesophagi), so wird die Speiseröhrenwand durch Knopfnähte mit der Haut vereinigt.

## Gefäßunterbindungen im Bereiche des Halses.

### Truncus anonymus.

Der *Truncus anonymus*, der gemeinschaftliche Stamm der *Art. carotis* und *subclavia dextra*, entspringt aus dem Aortenbogen; an die *Trachea* angelagert, verläuft das mächtige Gefäß in der Richtung nach rechts und oben; etwa in der Höhe der *Articulatio sterno-clavicularis* erfolgt die Teilung.

Vom *Manubrium sterni* gedeckt, ist der *Truncus* von der *Fovea suprasternalis* aus, hinter dem freien Rande des *Musc. sterno-hyoideus*, resp. *sterno-thyreoideus* zugänglich. Der Stamm der Arterie wird von der quer gelagerten *Vena anonyma sinistra* gekreuzt. Um die Arterie ist der *N. recurrens vagi* geschlungen.

Zur Unterbindung befindet sich der Kranke in Rückenlage. Der Hals ist überstreckt.

Nach Gräfe wird der Hautschnitt entsprechend dem vorderen Rande des *M. sterno-cleido-mast.* geführt und derart angelegt, dass das untere Ende desselben den Sternalansatz des Muskels überschreitet. Man eröffnet die Scheide des Kopfnickers, spaltet die *Fascia media colli*, worauf der mediale Rand des *M. sterno-hyoideus*, und unter diesem der des *M. sterno-thyreoideus* sichtbar werden. Diese Muskeln werden mit stumpfen Haken abgezogen; längs der rechten Seite der *Trachea* geht man nun nach abwärts und findet erst die *Carotis c. d.*, bei weiterem Vordringen den *Truncus*, der *Trachea* anliegend. Die Arterie lässt sich aus dem lockeren Zellstoff der Umgebung stumpf isolieren und unterbinden.

In derselben Weise gestaltet sich die Aufsuchung der Arterie, wenn man an Stelle der Gräfe'schen Schnittführung einen das Jugulum überschreitenden Schnitt in der Mittellinie des Halses anlegt.

### **Arteria carotis.**

Die *Arteria carotis* ist rechts ein Ast des *Truncus anonymus*, links entspringt sie direkt aus dem Bogen der *Aorta*.

Die *Arteria carotis communis* zieht jederseits an der Seite der *Trachea* und des Kehlkopfes fast senkrecht am Halse empor, bis in der Höhe des Schildknorpels die Teilung in die primitiven Aeste (*Carotis interna*, *externa*) erfolgt. In ihrem Verlaufe ist die *Art. carotis* mit der *Vena jugularis*, dem *Nervus vagus* und *descendens hypoglossi* im lockeren Zellstoff derart situiert, dass die Vene lateralwärts von der *Art.* zu liegen kommt. Die Gefäße sind von einer fibrösen Faszie gedeckt, die gleichzeitig die hintere Wand der Scheide des *Musc. sterno-cleido-mastoideus* darstellt.

Um die Arterie zugänglich zu machen, wird es also notwendig werden, die Fasern des *M. sterno-cleido-mastoideus* blosszulegen, den Muskel zu verziehen und die hintere Wand der Muskelscheide vorsichtig zu spalten.

### **Unterbindung der *Art. carotis comm.***

Rückenlage, der Hals gestreckt, der Kopf gegen die gesunde Seite gedreht. Man orientiert sich durch Tasten über die Lage des Kehlkopfes und über den Verlauf des *Musc. sterno-cleido-mastoideus*.

Am besten legt man die Arterie in der Höhe des Ringknorpels bloss, gerade oberhalb der Stelle, wo sie vom *Musculus omo-hyoideus* gekreuzt wird.

Hautschnitt in der Richtung des Kopfnickers entsprechend dem vorderen Rande des Muskels, vom Schildknorpel 8—10 cm lang nach abwärts (Fig. 230).

Tab. 25. 1. Blosslegung der Art. carotis am Halse. Der M. sternocleidomast. (K) ist lateralwärts verzogen. Das tiefe Blatt der Halsfaszie (F. c.) ist gespalten und auf diese Weise die Art. carotis comm. (C), die Vena jugularis (J), der N. vagus und descendens hypoglossi sichtbar gemacht. Man sieht die Teilung der Art. carotis in die carotis ext. und int. An der ersten, die hier abnormerweise lateral gelegen ist, ist der Abgang der Art. thyreoidea freipräpariert. Z. Unt. Zungenbeinmuskeln.

2. Blosslegung der Art. subclavia unter der Klavikula. Der grosse Brustmuskel (P, links) ist in der Richtung des Hautschnittes bis an den M. deltoides (D) gespalten. Unter dem Brustmuskel ist die Arteria subclavia (A), zwischen Vene (V) und den Nerven des Plexus brachialis (P, rechts) gelegen, sichtbar.





Fig. 230.  
Gefässunterbindungen am Halse.  
Hautschnitte.

- a) Art. lingualis.
- b) Art. carotis comm.
- c) Art. subclavia oberhalb des Schlüsselbeines.
- d) Art. subclavia unterhalb des Schlüsselbeines.







Ist die Haut und das Platysma durchtrennt, so erscheint, von der Faszie gedeckt, der *Musculus sterno-cleido-mast.*; die Faszie wird in der Richtung des Hautschnittes gespalten, der mediale Rand des blossgelegten Muskels vorsichtig lateralwärts verzogen, worauf die sog. Faszia med. colli und der *Musc. omo-hyoideus* sichtbar werden. Oberhalb dieses Muskels wird die Faszie vorsichtig über der Hohlsonde gespalten, die Arterie stumpf isoliert und aus ihrem Bette gehoben.

Lateralwärts von der Arterie liegt die *Vena jug. interna*; zwischen beiden Gefässen der *Nervus vagus*.

### **Unterbindung der Art. carotis externa.**

Lagerung des Kranken wie zur Unterbindung der *Art. carotis communis*. Die Schnittrichtung entspricht dem vorderen Rande des *Musc. sterno-cleido-mastoideus*. Der Hautschnitt hat sein oberes Ende in der Höhe des Zungenbeins. Ist die Haut, das Platysma und die oberflächliche Faszie gespalten, so erscheint die *Vena facialis communis*; dieselbe wird mit dem stumpfen Haken medialwärts verzogen. Durch stumpfes Präparieren gelingt es, den Stamm und die Aeste der *Art. carotis ext.* vor dem grossen Horn des Zungenbeins, zwischen *M. omohyoideus* und hinterem Bauch des *Biventer*, freizulegen.

Mit derselben Schnittführung lassen sich die grossen Aeste der *Art. carotis ext.*, die *Art. maxillaris ext.*, *lingualis*, *thyreoidea sup.* entsprechend ihren Wurzelstücken zur Ligatur freilegen.

Chirurgisch wichtig sind von den Aesten der *Art. carotis externa*: die *Arteria thyreoidea superior* und die *Arteria lingualis*.

### Tab. 26. Blosslegung der Art. lingualis.

Die Gland. submaxillaris (Sm) ist nach Spaltung der Haut und der Faszie aus ihrer Nische gehoben. Das Trigonum linguale ist auf diese Weise sichtbar gemacht. Es wird begrenzt: von der Sehne des Musc. digastricus (B), vom lateralen Rande des Musc. mylohyoideus (Mh) und vom Nervus hypoglossus (H), der von einer Vene begleitet ist. Der Grund des Dreieckes wird gebildet vom M. hyoglossus (Hg). Die Fasern dieses Muskels sind innerhalb des Dreieckes auseinandergedrängt und die Art. (L) auf diese Weise sichtbar gemacht.

Die Art. thyreoidea superior entspringt in der Höhe des Zungenbeins, knapp oberhalb der Teilung, aus dem Stamme der Carotis externa. Die Arterie zieht im Bogen nach abwärts an die Schilddrüse.


Zur Unterbindung wird ein Hautschnitt, entsprechend dem vorderen Rande des M. sternocleidomast., vom Zungenbein bis an den Schildknorpel angelegt. Nach Spaltung der Haut, des Platysma und der Halsfaszie findet man das im Bogen nach abwärts ziehende Gefäss am grossen Horn des Zungenbeins.

Die Arteria lingualis zweigt etwa in der Höhe des Zungenbeins vom Stamme der Carotis ext. ab. In leichtem Bogen wendet sich das Gefäss nach vorne oben und zieht, vom Musc. hypoglossus gedeckt, in die Substanz der Zunge.

### Unterbindung der Art. lingualis.

Ein bogenförmiger Schnitt vom Kieferwinkel an das Zungenbein und von da aufsteigend bis nahe an das Kinn (Fig. 230).

Nach Durchtrennung der Haut, des Platysma erscheint das oberflächliche Blatt der Halsfaszie, unter welcher die Glandula submaxillaris sichtbar wird. Die Faszie wird, entsprechend dem unteren Rande der Speicheldrüse, geschlitzt und die Drüse





stumpf aus ihrem Bette erhoben und nach oben verzogen.

Vom tiefen Blatt der Faszie gedeckt, übersieht man die bogenförmig verlaufende, glänzende Sehne des *Musc. digastricus*, über welche der von Venen begleitete *Nervus hypoglossus* in horizontaler Richtung verläuft.

Der freie Rand des *Musc. mylohyoideus* schliesst mit der Sehne des *Digastricus* und dem *Nervus hypoglossus* ein Dreieck ein, dessen Grund von den Fasern des *Musc. hyoglossus* gebildet wird.

Um die *Arteria lingualis* freizulegen, wird vorerst die Faszie über diesem „*Trigonum linguale*“ gespalten; weiters müssen die senkrecht vom Zungenbein zur Zunge aufsteigenden Fasern des *Musc. hyoglossus*, die den Boden des erwähnten Dreieckes bilden, stumpf auseinandergetrennt werden, worauf, wenn die Muskelpatte passiert ist, die Arterie im Grunde des Dreieckes sichtbar wird und unterbunden werden kann (Tab. 26).

Eine Unterbindung der *Art. lingualis* kann auch weiter zentralwärts, unterhalb des hinteren Biventerbauches, nahe dem Abgang des Gefässes vorgenommen werden. Für die Anaemisierung der Zunge vor Operationen hat die letztgenannte Methode keine Vorteile gegenüber der oben geschilderten Methode *Pirogoffs*.

### Unterbindung der *Art. subclavia*.

Die *Art. subclavia*, rechts ein Ast des *Truncus anonymus*, links aus dem Aortenbogen direkt entspringend, ist mit ihrem Wurzelstücke der Pleurakuppe aufgelagert; sie verlässt den Viszeralraum durch die obere Brustapertur und benützt die Muskellücke zwischen *M. scalenus anticus* und *medius* (hintere Skalenus-

Tab. 27. Lage der Art. subclavia in der Fovea supraclavicularis.

Man übersieht die vordere Skalenuslücke zwischen dem Kopfnicker (K) und dem M. salenus ant. (Sa); ferner die hintere Skalenuslücke zwischen dem letztgenannten Muskel und dem M. scalenus med. (Sm). Durch diese Lücke treten: die Nerven des Plexus brachialis (N), und nach einwärts von den Nerven, der ersten Rippe aufliegend, die Arterie.




Fig. 231.


Hintere Skalenuslücke (L) zwischen M. scalenus ant. (Sa) und M. scalenus med. (Sm).

lücke (Fig. 231), um an die Vorderfläche der ersten Rippe zu gelangen, von wo aus sie in absteigender Richtung gegen den Arm zu verläuft. Die Stelle, an welcher die Arterie die erste Rippe kreuzt, ist an letzterer durch ein Knochenleistchen (Tuberculum Lisfranci seu scaleni) markiert.

Die Nerven des Plexus brachialis benutzen ebenfalls die Pforte der hinteren Skalenuslücke, um an den Arm zu gelangen. Die Nerven sind oberhalb und lateral von der Arterie gelagert. (Tab. 27).

Die Vena subclavia tritt durch die Lücke zwischen M. sterno - cleido - mast.

und scalenus anticus (vordere Skalenuslücke) ein, um sich mit der Vena jugularis interna zu ver-







einigen. Die Vene ist auf diese Weise durch den M. scalenus ant. von der Art. subclavia geschieden.

Die Art. subclavia wird oberhalb und unterhalb der Klavikel zur Unterbindung blossgelegt; in der Fovea supraclavicularis gerade an der Stelle, wo sie, aus der Skalenuslücke kommend, die erste Rippe kreuzt. Unterhalb des Schlüsselbeins entsprechend dem unteren Rande der ersten Rippe.

### **Unterbindung des Art. subclavia oberhalb des Schlüsselbeines.**

Der Kranke ist mit erhöhtem Oberleibe gelagert, der Kopf ist nach der dem Operationsfelde entgegengesetzten Seite gedreht; der Arm liegt dem Rumpfe an; ein leichter Zug am Arme lässt die Grenzen der Supraklavikulargrube deutlicher erscheinen.

Man übersieht so die Clavicula, welche die Basis des dreieckigen Raumes bildet; nach vorne zu stellt der laterale Rand des M. sterno-cleido-mast., nach hinten zu der vordere Rand des M. cucullaris die Begrenzung desselben dar. Das Niveau der Fovea supraclavicularis ist mehr oder minder vertieft.

Querer Hautschnitt parallel der Clavicula fingerbreit über derselben, vom lateralen Rand des M. sterno-cleido-mast. bis an den medialen Rand des M. cucullaris (Fig. 230).

Man durchtrennt die Haut, das Platysma, die Nervi supraclaviculares und dringt, stumpf präparierend, durch das lockere Zellgewebe des Supraklavikularraumes bis an das tiefe Faszienblatt, welches die Musculi scaleni, den Plexus brachialis und die Arterie deckt. Hat man die Faszie gespalten, so orientiert man sich über die hintere Skalenuslücke, tastet am Grunde dieser, knapp hinter dem Ansätze des M. scalenus anticus an der

ersten Rippe, die Arterie, lateralwärts vom Tuberculum Lisfranc. Die Arterie liegt am tiefsten Punkte der Lücke, nach einwärts von den Nervenbündeln des Plexus brach. der ersten Rippe auf, und kann mit zwei anatomischen Pinzetten zur Ligatur isoliert werden.

### **Unterbindung der Art. subclavia unterhalb des Schlüsselbeines.**

Lagerung des Kranken wie zur vorigen Unterbindung. Unterhalb der Clavicula ist die Trennungsfläche der Klavikularportionen des Musc. deltoideus und des M. pectoralis major durch eine dreieckige Einsenkung (Mohrenheim'sches Dreieck) markiert. Vom Skelette des Schultergürtels soll man sich durch Tasten über die Lage des Processus coracoideus genau orientieren. Der Hautschnitt wird querfingerbreit unter der Clavicula bis oberhalb der Spitze des Proc. coracoideus angelegt (Fig. 230). Die Klavikularportion des grossen Brustmuskels wird in der Richtung des Hautschnittes gespalten; nach Spaltung der locker gewebten Fascia coracoclavicularis liegt der obere Rand des M. pectoralis minor frei, der mit stumpfem Haken nach abwärts verzogen wird. Im lockeren Zellgewebe unterhalb der Clavicula erscheint in der Richtung zur vorderen Skalenuslücke, zu oberst die leicht zugängliche Vena subclavia; lateralwärts von der Vene verlaufen die mächtigen Bündel des Plexus brachialis. Die Arterie ist zwischen der Vene und den Nerven, näher der Thoraxwand gelagert und kann stumpf aus lockerem Zellgewebe ausgelöst werden (Tab. 25).

Einer anderen Methode folgend, geht man mit demselben Hautschnitt in das Mohrenheim'sche Dreieck ein und legt die Arterie, ohne den Pectoralis major durchtrennt zu haben, bloss.

Die oberflächliche Faszie wird gespalten und durch Distraction der Ränder des *M. pect. maj.* und des *M. deltoideus* die Mohrenheim'sche Grube zugänglich gemacht.

In der Tiefe derselben ist nach Spaltung der *Fascia coraco-clavicularis* das Paket der Gefässe und Nerven unterhalb der *Clavicula* sichtbar.

Von den Aesten der *Art. subclavia* sind von chirurgischer Wichtigkeit:

Die *Art. thyreoidea inferior* (zur Verödung von Kropfgeschwülsten unterbunden);

die *Art. vertebralis*, deren Unterbindung zur Behandlung der Epilepsie empfohlen wurde;

die *Art. mammaria int.*, deren Unterbindung bei Hieb, Stichverletzungen der vorderen Brustwand notwendig werden kann.

Die *Art. thyreoidea inferior* wird an jener Stelle zur Unterbindung blossgelegt, wo sie, der Wirbelsäule (resp. *M. longus colli*) aufliegend, hinter der *Carotis communis* im Bogen nach oben medianwärts zur Schilddrüse zieht.

Nach Kocher wird ein Schrägschnitt geführt, der, ober dem Jugulum beginnend, dem vorderen Kopfnickerrand entsprechend nach aussen oben zieht. Die *Art. carotis communis* wird hier blossgelegt und nach aussen verzogen. An der Innenseite der Gefässe dringt man zwischen diesen und der medial verzogenen Schilddrüse bis auf die Wirbelsäule vor, wo die Arterie, charakteristisch durch den nach oben konvexen Bogen, den sie beschreibt, gefunden wird.

Bei Ligatur des Gefässes muss dieses klar isoliert sein, damit nicht der zur Arterie in inniger Beziehung stehende *Nerv. laryngeus inf.*, der motorische Nerv des Kehlkopfs, in die Ligatur gefasst werde.

### Tab. 27 a. Exstirpation der Schilddrüse.

Die Geschwulst ist zum Teil ausgeschält und über den medialen Wundrand herausgewälzt. Man sieht hinter der Struma die ebenfalls verzogene Trachea, den Kehlkopf und den Oesophagus. Zur Schilddrüse zieht in fast querer Richtung die Art. thyreoidea inferior, den tiefer gelegenen Nervus laryngeus inferior kreuzend. Am oberen Pol der Geschwulst, durch ein unterschobenes Ligaturinstrument, die Art. und Vena thyreoidea sup. sichtbar.


Nach Wölfler wird das Gefäss durch einen Schnitt am äusseren Rande des Kopfnickers medial vom M. scalenus ant., bevor es die Carotis kreuzt, blossgelegt.

Die **Arteria vertebralis** entspringt aus der Art. subclavia auf der Höhe des Bogens, medial vom Truncus thyreo-cervicalis. Am Innenrande des M. scalenus ant. emporsteigend, gelangt sie zwischen diesem und dem M. longus colli an den Querfortsatz des sechsten Halswirbels, wo sie den Kanal der sechs oberen Halswirbel betritt.

Hautschnitt am Aussenrande des Kopfnickers vom Schlüsselbein bis an den Kehlkopf. Wird der Kopfnicker mit den grossen Gefässen medialwärts verzogen, so kann man längs des vorderen Skalenusrandes nach aufwärts bis an den (durch das prominente *Tuberculum caroticum* kenntlichen) Querfortsatz des sechsten Halswirbels gelangen; unter demselben findet man zwischen den Rändern des Scalenus ant. und Longus colli die Arterie.

### Kropfoperation.

Aus den Ausfallerscheinungen nach Total-exstirpation der Schilddrüse haben wir die Erkenntnis geschöpft, dass die Gland. thyreoidea ein lebenswichtiges, für den Haushalt des Körpers unentbehrliches Organ darstellt. Die totale Ent-





fernung der erkrankten Schilddrüse, ein früher vielfach geübter Eingriff, kann nach den gemachten Erfahrungen heute keine Berechtigung mehr haben.

Die konservativen Methoden, die bei Kropf zur Anwendung kommen müssen, sind die intraglanduläre Ausschälung der Knoten aus der Schilddrüse, die halbseitige Exstirpation der Schilddrüse, ferner die Resektion der Schilddrüse.

Die intraglanduläre Ausschälung (Porta, Socin) ist bei Zystenkröpfen, sowie bei umschriebenen, innerhalb der Schilddrüse gut abgrenzbaren Kropfknoten ausführbar.

Der Hautschnitt wird über die grösste Vorwölbung der Geschwulst, je nach der Lage derselben entweder longitudinal, in der Mittellinie des Halses, oder quer in einem nach oben konkaven Bogen (Kocher) geführt. Nach Durchtrennung der Haut des Platysma gelangt man auf die über der Kropfgeschwulst verlaufenden, auseinandergebreiteten unteren Zungenbeinmuskeln, die je nach der Richtung des Hautschnittes entweder durchtrennt oder mit Haken abgezogen werden. Die Kapsel des Kropfes, ferner das über dem Kropfknoten befindliche gesunde Schilddrüsenparenchym sind zu durchtrennen, worauf der Knoten resp. die Kropfzyste stumpf aus ihrem Bette gelöst und entfernt wird.

Die Spaltung des Knotens und isolierte Entfernung der beiden Hälften ist eine von Kocher empfohlene Modifikation der Enukektion.

**Halbseitige Strumektomie.** Hautschnitte: Längsschnitt in der Mittellinie des Halses, oder entsprechend dem vorderen Rande des Kopfnickers. Winkelschnitt (Kocher) beginnt in der Höhe des Larynx auf dem Wulste des Kopfnickers, zieht quer bis in die Mit-

tellinie des Halses und von da nach abwärts bis an das Jugulum. Der quere Bogenschnitt Kochers fällt in die Spaltrichtung der Haut des Halses.

Ist die Fascia colli superf. gespalten, so wird der Vorderrand des Kopfnickers isoliert und der Muskel lateralwärts verzogen. Die Faszie wird ferner in der Mittellinie durchtrennt, worauf die Ränder der unteren Zungenbeinmuskeln freigemacht in der Nähe des Kehlkopfs quer eingeschnitten werden, so dass die Kropfgeschwulst mit einem grossen Teile ihrer Vorderfläche frei vorliegt. Die Kapsel wird gespalten und lateralwärts von der Kropfgeschwulst abgehoben, worauf diese, wenn ihre laterale Begrenzung freigemacht ist, von ihrer Unterlage erhoben gegen die Mitte zu luxiert wird.

Ist auch der obere und untere Pol der Geschwulst isoliert, so werden die Hauptgefässe der Schilddrüse, die Art. thyreoidea sup. und inf., am unteren Pol überdies die Vena thyreoidea ima gefasst und zwischen zwei Ligaturen durchtrennt.

Bei Ligatur der Art. thyreoidea inf. muss auf den N. laryngeus inf., der knapp an den Stamm der Art. angelagert ist, Rücksicht genommen werden (Tab. 27 a).

Der Isthmus thyreoideae, welcher durch Heben des unteren Poles der Kropfgeschwulst zugänglich erscheint, wird stumpf von der Vorderwand der Trachea gelöst, doppelt ligiert und quer zwischen den Ligaturen durchtrennt.

Bei der Resektion des Kropfes (Mikulicz) wird ein Stück der Drüse, gewöhnlich mit der Einmündungsstelle der Arteria thyreoidea inf., unversehrt zurückgelassen. Die Operation wird wie im vorigen Falle ausgeführt, am oberen Pole sind die Gefässe unterbunden; ist der Isthmus durchtrennt und die Schilddrüse auch seitlich



von der Trachea abgelöst, so wird sie nicht komplett ausgeschält, sondern vor dem unteren Pol im Parenchym abgeklemmt, partienweise ligiert und mit der Schere vor den Ligaturen durchschnitten. Ein Rest der Schilddrüse bleibt so in Verbindung mit der Arterie zurück. Das Verfahren bietet den Vorteil, den Nervus recurrens sicher zu schonen.

### **Die Tenotomie des Kopfnickers.**

Bei angeborenem Caput obstipum zur Korrektur der fehlerhaften Stellung des Kopfes angezeigt. Der Kopfnicker wird, seinem sehnigen Ansätze am Sternum resp. der Clavicula entsprechend, in offener Wunde durchschnitten.

Durch Drehung des Kopfes nach der gesunden Seite wird die Sehne des Kopfnickers stark gespannt. 3 bis 4 cm langer Schnitt parallel der Faserung des Muskels, entsprechend dem Sternalansätze. Die Sehne wird blossgelegt, isoliert, mit einem stumpfen Häkchen vorgezogen und mit einem Scherenschlag durchtrennt. Wenn nötig, werden auch der Klavikularansatz und straff gespannte Faszienanteile durchtrennt, bis der Kopf sich ohne Widerstand nach der gesunden Seite hin bewegen lässt. Die Hautwunde wird vernäht und der Kopf in überkorrigierter Haltung im starren Verbands fixiert.

## Operationen am Rumpfe und am Becken.

### Paracentesis thoracis.

Die Eröffnung der Brusthöhle durch Stich oder durch den Schnitt wird dann vorzunehmen sein, wenn Flüssigkeitsansammlungen im Pleuraraume entweder durch ihre Menge oder ihren Charakter lebensgefährliche Symptome bedingen. Im allgemeinen gilt der Satz, dass seröse und blutige Ergüsse durch die Punktion, eitrige Exsudate dagegen durch den Schnitt beseitigt werden sollen.

Der Operation geht also stets eine probatorische Aspiration des Pleurainhaltes mittelst der Pravaz'schen Spritze vorher.

Die Operation der Thorakozentese wird vorgenommen, indem man den Troikart zwischen zwei Rippen in den Pleuraraum stösst und die Flüssigkeit einfach ablaufen lässt oder sie durch Aspiration entfernt.

Ist der Troikart derart konstruiert, dass die Aspiration von Luft während der Entfernung des Stachels vermieden werden kann, so genügt die erstere Methode allen Ansprüchen.

Der Billroth'sche Troikart (Fig. 232) besitzt ein seitlich angesetztes Abflussrohr, welches durch einen Hahn verschliessbar ist; an das Abflussrohr ist ein Kautschukschlauch von entsprechender Länge angebracht; auch der Schenkel, in dem das Stilet liegt, ist nach Entfernung dieses, durch einen Hahn verschliessbar.

Der Kranke befindet sich in sitzender Stellung, den Rumpf vornüber gebeugt.

Man sticht, sofern es sich nicht um einen abgesackten Erguss handelt, an der höchsten Konvexität der Rippen im vierten, fünften oder sechsten Intercostalraum oder an den unteren Thoraxpartien zwischen siebenter und neunter Rippe ein, und zwar knapp am oberen Rande der betreffenden Rippe. Der Operateur markiert mit dem linken Zeigefinger genau die Stelle des Einstichs. Am Troikart ist der Hahn zum Abflussschlauch geschlossen. Der Troikart wird senkrecht eingestochen und so weit geführt, bis man aus dem




Fig. 232.  
Billroth'scher Troikart.

Schwinden des Widerstandes der Thoraxwand merkt, dass die Spitze des Instrumentes in den Hohlraum eingedrungen ist. Nun erfasst der Operateur mit der linken Hand das Instrument, entfernt den Stachel und lässt am seitlich angesetzten Rohre die Flüssigkeit ablaufen. Das Ende des Kautschukschlauches taucht in ein Gefäß mit antiseptischer Flüssigkeit.

Der Abfluss soll stetig und langsam vor sich gehen.

Bei dieser Art des Vorgehens wird man den Lufteintritt mit Sicherheit vermeiden können.

Stockt der Ablauf der Flüssigkeit mit einemmale, so kann man dem durch eine veränderte

Stellung der Kanüle abhelfen, wenn ein Anliegen der Lunge die Ursache der Verstopfung des Lumens war. Verlegungen der Lichtung durch Koagula lassen sich durch Einführung einer Knopfsonde in den Tubus beheben.

Das Ausströmen der Flüssigkeit lässt sich besser regulieren, wenn an die Punktion die *Aspiration* des pleuralen Exsudates angeschlossen wird.

An Stelle des Troikarts kommt eine spitze Hohnadel zur Verwendung, die durch einen Schlauch mit dem Mundstück einer luftdicht schliessenden Spritze oder Flasche verbunden ist (*Aspirateur* von Dieulafoy, Potain). Durch Aufziehen des Spritzenstempels wird die Luft im Glaszylinder entsprechend verdünnt und die Flüssigkeit derart angesaugt.

Auf diese Weise kann noch Flüssigkeit entfernt werden, wenn im Pleuraraume kein Ueberdruck mehr besteht.

Die permanente Ausheberung des Eiters nach der Punktion (Playfair und Bülau) aus der Pleurahöhle ermöglicht ein ganz allmähliches Ausströmen der Flüssigkeit. Punktion mit einem starken Troikart in der Axillarlinie und Einschlebung eines Kautschukdrains durch das Troikartrohr in die Pleurahöhle; das Rohr wird in der Wunde fixiert und durch ein Zwischenstück mit einem längeren Schlauch in Verbindung gebracht, welcher in ein tiefer gelegenes Gefäss mit antiseptischer Flüssigkeit taucht.

### **Thorakotomie.**

Die Thorakotomie, Eröffnung der Pleurahöhle durch den Schnitt, ist bei eitriger Beschaffenheit des Pleuraexsudates angezeigt.

Handelt es sich nicht um ein umschriebenes, abgesacktes Exsudat, so wird der Einschnitt entsprechend dem fünften oder sechsten Interkostal-

raum an der höchsten Konvexität der Rippe vorzunehmen sein. Um eine Verletzung der Interkostalgefäße hintanzuhalten, dringt das Messer




Fig. 233.  
Rippenresektion.

knapp am oberen Rande der Rippe in die Tiefe. Man durchtrennt die doppelte Schicht der Interkostalmuskulatur, die Fascia endothoracica und die Pleura im ganzen Bereiche des Schnittes.

Durch Einlegung eines Kautschukschlauches in die Wunde wird eine Drainage des Pleuraumes etabliert.

Zur Erzielung eines bequemerer Zuganges, zur Ermöglichung ausgiebigerer Drainage wird die Resektion eines 3—4 cm langen Stückchens aus der Kontinuität der Rippe empfohlen. Die Inzision wird in der Axillarlinie zwischen fünfter und sechster Rippe, oder am Rücken, in der Gegend der siebenten bis neunten Rippe angelegt. Der Hautschnitt dringt in diesem Falle direkt auf die Rippe, deren Periost im Bereiche des 5—6 cm langen Schnittes gespalten wird. Die Beinhaut wird mittelst Raspatorium nach oben und unten von der Vorderseite, hierauf mit besonderer Sorgfalt auch an der Rückseite der Rippe vom Knochen abgehelt.

Das blossgelegte Stück der Rippe wird mit der Knochenschere (Rippenschere von Gluck) oder mit der Drahtsäge in der angegebenen Ausdehnung reseziert. Die unverletzte Pleura wird eingeschnitten, der eitrige Inhalt ablaufen gelassen und eine Drainage etabliert. Von einem Hautschnitte aus lassen sich, um einen weiteren Zugang zu erzielen, zwei Rippen in der angegebenen Weise blosslegen und resezieren (Fig. 233).

Kann bei Pleuraerkrankungen mit Lungenschrumpfung, vorhandener Pleurafistel das Empyem wegen Starrheit der Thoraxwand nicht zur Ausheilung kommen, so ist die Resektion einer ganzen Reihe von Rippen ein geeignetes Verfahren, die Wand des Thorax nachgiebiger zu gestalten; durch die so geschaffene Möglichkeit der Annäherung des parietalen Blattes der Pleura an das viszerale sind die Bedingungen für die Ausheilung des langwierigen Eiterungsprozesses wesentlich bessere.

Esthlander reseziert zu diesem Zwecke in der Axillarlinie fünf bis sieben Rippen in der Ausdehnung von 3—10 cm mit Hilfe eines langen Vertikalschnittes. Die Pleura wird im Bereiche der angelegten grossen Oeffnung breit eröffnet.

Weitergehend ist Schedes Thorakoplastik. Er schneidet aus der Thoraxhaut einen grossen Weichteillappen mit oberer Basis. Die oberen Enden der Schnitte liegen: vorne in der Achselhöhle, hinten zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt an der zweiten Rippe. Im Bereiche des abpräparierten und nach aufwärts geschlagenen Lappens werden sämtliche knöcherne Rippen in ganzer Ausdehnung bis an das Tuberculum costae reseziert. Nach breiter Eröffnung der Pleura und Toilette derselben wird der Weichteillappen über die Lunge geschlagen und in dieser Lage durch den Verband fixiert.

Ist die Lunge mit starren, derben Pleuraschwarten bedeckt, so müssen diese, um die Entfaltbarkeit zu ermöglichen, abgetragen (Dekortikation) oder mit dem Paquelin gespalten werden.

Die Eröffnung der Lunge, Pneumotomie, wird bei Lungenabszess, Lungengangrän, Echinokokkus und Aktinomykose vorgenommen. Die Eröffnung der Thoraxhöhle, die Wegnahme mehrerer Rippen schafft den Zugang zur Lunge. Ist die Lungenpleura mit der Thoraxwand verwachsen, so ist nach erfolgter Rippenresektion die Lunge direkt zugänglich. Durch Probepunktion ermittelt man den Eiterherd, den man mittelst Paquelin breit eröffnet und tamponiert.

Ist der Pleurasack nicht verstrichen, so operiert man zweizeitig, indem man die Kostalpleura zur Erzielung von Verwachsungen an die Lunge durch kreisförmige Naht fixiert. Ist während der Operation ein Pneumothorax zustande gekommen,

so fasst man die Lunge, zieht sie vor und fixiert sie durch dichte Naht in der Wunde.

### Operationen am Herzen.

**Die Punktion des Herzbeutels** ist bei blutigen und serösen Ergüssen in den Herzbeutel angezeigt, wenn diese so hochgradig sind, dass sie mechanisch die Herztätigkeit stören.

Der Troikart wird im vierten oder fünften Interkostalraum, 3—4 cm vom linken Sternalrand entfernt, eingestochen.

**Die Eröffnung des Herzbeutels** ist angezeigt, wenn die Probepunktion einen eitrigen Erguss im Perikard nachweisen liess. Querschnitt im dritten, vierten oder fünften Interkostalraum, links vom Sternum. Präparierend wird in die Tiefe gegangen (Unterbindung der Art. mammaria int.) und der blossgelegte Herzbeutel in geringem Umfang mit der Schere geschlitzt. Ollier und Durand führen den Schnitt von der Mittellinie über den fünften linken Rippenknorpel und resezierten diesen.

Kocher reseziert ein Stück der 6. Rippe, während die Knorpel der 3., 4. und 5. Rippe von einem Längsschnitt aus durchschnitten werden. Rotter empfiehlt ein osteoplastisches Verfahren und bildet einen mit der Basis dem Sternum zugekehrten Lappen dessen oberer Schenkel längs der dritten, dessen unterer längs der 5. Rippe verläuft.

Bei Herzverletzungen benützt man die vorhandene Wunde als Bahn, erweitert diese, entfernt die im Wege liegenden Rippen durch Resektion und legt so atypisch den Herzbeutel frei. Die Wunde im Herzbeutel wird erweitert, das Blut aus demselben entfernt und das Herz gefasst und vorgezogen. Die Herzwunde wird durch Seidennaht geschlossen.



### Unterbindung der Art. mammaria interna.

Hautschnitt im dritten oder vierten Interkostalraum vom lateralen Rande des Brustbeins, 4 bis 5 cm lang nach aussen. Durchtrennung der Haut,




Fig. 234.

#### Blosslegung der Art. mammaria int.

Der Knorpel der dritten Rippe ist nahe am Sternalansatz reseziert. Der Musc. pectoralis ist durchtrennt. Im oberen und unteren Wundwinkel Stümpfe von Interkostalmuskeln. In der Tiefe die Art. mammaria von einer Vene begleitet.

des Unterhautzellgewebes, M. pectoralis major und des M. intercostalis internus im Bereiche des Schnittes. Vor dem Brustfell gelegen, sieht man nun im Winkel zwischen Rippe und Brustbein die

in der Richtung der Körperachse verlaufende Arteria mammaria von zwei Venen begleitet. Die Isolierung der Gefässe lässt sich im lockeren Zellgewebe leicht bewerkstelligen.

Esmarch legt neben dem Sternum einen Longitudinalschnitt an und vergrössert das Operationsfeld durch Resektion eines Rippenknorpels (Fig. 234).

### **Die Abtragung der Brustdrüse. Amputatio mammae.**

Umschriebene Geschwülste von gutartigem Charakter lassen sich aus dem Drüsengewebe der Mamma leicht ausschälen. Der Hautschnitt wird, bei oberflächlichem Sitz des Tumors, linear in der Richtung des Radius der Mamma, bei tieferem Sitz halbkreisförmig, entsprechend der unteren Begrenzung der Drüse, angelegt. Mit dem letzteren Schnitte lassen sich, ohne entstellende Narbe auch grössere Tumoren (Adenome, Kystome) aus der Mamma auslösen. Auch die ganze Brustdrüse kann auf diese Weise unter Schonung der Haut entfernt werden.

Wird die Abtragung der Mamma im Zusammenhang mit der sie bedeckenden Haut notwendig, so umkreist man die Brustdrüse mit zwei Schnitten, die ein Oval einschliessen, dessen Längsachse von aussen oben nach innen unten, von der vorderen Achselfalte bis nahe an den Schwertfortsatz reicht. Die Haut wird bis an den Rand der Drüse abgelöst, diese vom Pektoralmuskel abgehoben und abpräpariert. Die Hautwunde kann linear vernäht werden.

Bei Karzinom der Mamma muss in jedem Falle, gleichgültig ob die benachbarten Lymphdrüsen vergrössert sind, im Zusammenhang mit der Brustdrüse das ganze axillare Fett mit den Drüsen entfernt werden. Die Brustdrüse wird

im Zusammenhange mit der sie bedeckenden Haut und mit den beiden Pektoral Muskeln (Halstedt, Rotter) extirpiert. Bei der Kocher'schen Art des Vorgehens lassen sich die Gebilde der Achselhöhle ausserordentlich übersichtlich darstellen. Trotz des Wegfalls der Brustmuskeln sind auch die funktionellen Resultate gute.

Der Hautschnitt (Fig. 235) beginnt an der Clavicula, nahe dem Ansatz der Pektoral Muskeln, durchquert diese und zieht im Bogen an der unteren Begrenzung der Brustdrüse bis an den Schwertfortsatz. Ein zweiter Bogenschnitt zieht von diesem Punkt über die Brust und mündet in den ersten.


Zunächst werden die Ansätze der Brustmuskeln am Oberarm und am Processus coracoideus quer komplett durchschnitten. Zieht man die Stümpfe der Muskeln auseinander, so ist ein breiter Zugang zur Achselhöhle geschaffen.

An den grossen Gefässen beginnend, wird, von oben nach unten präparierend, das Fett der Achselhöhle ausgelöst. Deutlich sichtbar sind die Gefässstränge, die von den grossen Gefässen zum Drüsenpakete und zum Thorax ziehen; sie werden isoliert, an ihrem Abgange, zwischen zwei Ligaturen durchschnitten. Es sind dies die *Arteria thoracica suprema* und *Art. thoracica longa*. Bei weiterer Auslösung des Fettes wird die hintere Achselfalte frei; wir sehen den *Musculus subscapularis*, den *Latissimus dorsi* und am Rande der Scapula die mächtige *Art. subscapularis* von Venen und Nerven begleitet (Tab. 28). Häufig wird auch die Unterbindung der *Art. und Vena subscapularis* oder der *Art. und Vena circumflexa humeri post.* notwendig.

Küster hat auf die Wichtigkeit der Schonung des *Nervus thoracicus longus* hingewiesen.


**Tab. 28. Amputation der karzinomatösen  
Brustdrüse I.**

Die Brustmuskeln (Pm, Pmi.) sind quer durchtrennt. Die Gebilde der Achselhöhle, Art. axillaris (A.), Vena axillaris (V.), die Wurzeln des Nerv. medianus (M.) liegen bloss. Das axillare Fett mit den Lymphdrüsen ist aus der Achselhöhle gehoben und bleibt im Zusammenhange mit der nach abwärts gesunkenen Mamma. Ss. Art. und Vena subscapularis. Tl. Nerv. thoracicus longus.



**Fig. 235.**

**Hautschnitt (nach Kocher) zur Amputation der Brustdrüse im Zusammenhange mit den Achseldrüsen und den Brustmuskeln.**





Gelingt es nicht, die Drüsen rein von der Vena axillaris zu isolieren, so ist man oft genötigt, ein Stück der Vene zu opfern. Nach Anlegung von Ligaturen wird diese, in solchem Falle, in entsprechender Ausdehnung reseziert und im Zusammenhange mit den Drüsen entfernt.




Fig. 236.  
Hautnaht nach Amputation der Mamma.

Die Rippenansätze der beiden Brustmuskeln, an die man, nach abwärts präparierend, gelangt, werden vom Thorax abgelöst und gegen das Brustbein zu geschlagen. Man setzt diese Ablösung, dem hinteren Bogenschnitte, der sukzessive vertieft wird, folgend, weiter fort, bis das ganze

### Tab. 29. Amputation der karzinomatösen Brustdrüse II.

Die Mamma, im Zusammenhange mit den axillaren Drüsen und den Brustmuskeln, ist vom Thorax abgelöst und medialwärts geschlagen. Es erscheint die blossgelegte Thoraxwand mit den Rippen, der Interkostalmuskulatur und den Zacken des Serratus (Sr.). Nach rückwärts der Skapularrand mit dem *M. subscapularis* (Ss.), weiter lateralwärts der freigelegte *M. latissimus dorsi* (Ld.).

Drüsengewebe der Achsel, die beiden Brustmuskeln mit der Mamma, eine vom Thorax abgelöste Masse bilden, die in toto entfernt wird (Tab. 29).


Vom oberen Ende des Schnittes aus kann man die Gegend unter dem Schlüsselbein noch revidieren. Der Schnitt wird über die Clavicula verlängert, sogar, wenn nötig, die temporäre Durchschneidung der Clavicula (Madelung) vorgenommen. Auf diese Weise ist die Fovea supraclavicularis zugänglich gemacht.

Der axillare Teil der Wunde lässt sich stets vollständig durch die Naht schliessen. Bisweilen, allerdings unter Spannung der Haut, auch der untere Anteil der Wunde (Fig. 236). Ist dies nicht der Fall, so überlässt man die offengebliebene Partie (die oft nur guldengross ist) der Heilung durch Granulation, oder deckt sie, nach Thiersch, durch transplantierte Hautläppchen.

### Punktion des Wirbelkanales.

Die Eröffnung der Rückgratshöhle durch Stich, Lumbalpunktion (Quinke) wird aus diagnostischen Motiven, dann zur Einführung von medikamentösen Lösungen in den Arachnoidealraum zur Erzielung von Anaesthesie ausgeführt. Die Operation wird am sitzenden Kranken oder in Seitenlage vorgenommen; in beiden Fällen soll die Wirbelsäule möglichst nach vorne gekrümmt







sein, damit die Zwischenwirbelräume besser zugänglich werden. Man geht im Zwischenraume zwischen 3. und 4. oder 4. und 5. Lendenwirbel in der Medianlinie oder fingerbreit lateral von dieser mit einer langen Nadel ein. Man erleichtert sich die Ausführung, wenn man zur Markierung der Punktionsstelle die obersten Punkte der Cristae ilei durch eine Linie verbindet. Diese entspricht dem 5. Lumbalwirbeldorn. Median, oder 1 cm seitlich wird der dünne, lange Troikart senkrecht in die Tiefe gestochen. Man fühlt stets die Passage durch das derbe Band zwischen den Wirbelbögen. Nach Entfernung des Stachels muss, wenn die Operation richtig ausgeführt wurde, klare Flüssigkeit durch das Rohr in Tropfen ausfließen.

### **Punctio abdominis.**

Die kunstgerechte Eröffnung der Bauchhöhle durch Stich, zur Entleerung angesammelter Flüssigkeit. Es kann sich handeln um die Entleerung freier Flüssigkeit im Peritonealraum, um abgesackte Flüssigkeitsansammlungen und um die Entleerung von Flüssigkeit aus Zysten.

Im ersteren Falle wählt man in der Regel den Monro'schen Punkt als Einstichstelle des Troikarts, d. i. den Halbierungspunkt einer Linie, welche den Nabel mit der Spina ant. sup. der linken Seite verbindet. Trzebizky hat den Nachweis erbracht, dass in einer, wenn auch sehr geringen Anzahl der Fälle Verletzungen der Art. epigastrica oder eines ihrer Aeste bei dieser Wahl der Punktionsstelle vorkommen können. Sticht man den Troikart in der äusseren Hälfte der Nabel-Darmbeinstachellinie ein, so ist man vor dieser unangenehmen Eventualität sicher geschützt.

Die Vorschrift, die Punktion an der linken Bauchseite vorzunehmen, ist nicht von prinzipieller Bedeutung. Bei vergrößerter Leber wird man an der linken Seite punktieren; ein Milztumor von grösserer Ausdehnung wird uns zur Vornahme der Punktion an der rechten Seite veranlassen. Auch in der Linea alba, in der Mitte zwischen Nabel und Symphyse kann zweckmässig der Einstich erfolgen.




Fig. 237.

Punktion des Bauches bei Aszites.

Die Wahl der Punktionsstelle bei Zysten und abgesackten Exsudaten richtet sich nach der Lokalisation der Flüssigkeitsansammlung.

Zur Vornahme der Punktion bedienen wir uns des geraden Troikarts mit seitlichem Abflussrohr.

Zur Punktion befindet sich der Kranke entweder in unvollständiger Seitenlage, oder er wird mit erhöhtem Oberkörper gelagert. Ehe der Troikart eingestossen wird, soll durch genaue Perkus-

sion ermittelt werden, ob nicht an jener Stelle Darm an die Bauchwand fixiert ist.

Der Zeigefinger der linken Hand markiert die Einstichstelle. Der Troikart wird senkrecht durch die Bauchdecke eingestossen (Fig. 237), mit der linken Hand erfaßt, während die Rechte den Stachel entfernt. Durch einen am Abflussrohr angebrachten Schlauch läßt man die Flüssigkeit langsam abfließen.

Läßt der intraabdominelle Druck nach, so sucht man das Ausfließen durch Kompression mit der flachen Hand oder durch Zuziehen eines um den Bauch geschlungenen, breitgefalteten Tuches zu begünstigen.

Es ist eine alte Regel, niemals die gesamte im Bauchraum angesammelte Flüssigkeit ablaufen zu lassen. Man entfernt den Troikart zu einer Zeit, da noch eine gewisse Quantität Flüssigkeit im Bauche enthalten ist, und deckt die Wunde mit einem Verbande.

### **Unterbindung der Arteria iliaca.**

In der Höhe des IV. Lendenwirbels teilt sich die Aorta in die beiden Arteriae iliacae, die jederseits entsprechend der Articulatio sacro-iliaca in zwei Aeste — die Art. iliaca externa und interna zerfallen. Die erstere — das Bauchstück der Art. femoralis — zieht an der Aussen- seite der entsprechenden Vene, längs des M. psoas zur Lacuna vasorum.

Die Art. iliaca interna, auch hypogastrica genannt, lenkt von der Symphysis sacro-iliaca ins Becken ab, um die Organe dieses, sowie die Muskulatur des Gesäßes und die Genitalien mit Blut zu versorgen.


**Tab. 30. Blosslegung der Art. iliaca ext.**

Es sind gespalten: die Aponeurose des M. obliq. ext. (O. e.), die Fasern des Obliquus int. (O. i.) und die Fascia transversa (F. t.). Das Bauchfell (P) ist stumpf abgelöst und abgehoben. Es sind die Art. und Vena iliaca im subserösen Raume blossgelegt.

Unterbindung der Arteria iliaca externa. Die Arterie wird im subserösen Raume knapp vor ihrem Eintritt in die Lacuna vasorum blossgelegt.

Hautschnitt parallel dem Poupart'schen Bande über der Mitte desselben. Durchtrennung der Faszie des M. obliquus externus, der Fasern des M. obl. int. und transversus, in der Richtung und Ausdehnung des Hautschnittes. Nach Durchtrennung der Fascia transversa liegt das subseröse Fett und das Bauchfell vor. Das letztere wird stumpf vom Poupart'schen Bande und dem Beckenrande abgedrängt, worauf im Grunde der Wunde die in lockeren Zellstoff gehüllten Vasa iliaca externa sichtbar werden; die Isolierung der Arterie (die Vene liegt medialwärts) wird stumpf mit zwei anatomischen Pinzetten ausgeführt (Tab. 30).

Zur Unterbindung der Arteria iliaca interna verläuft der Hautschnitt von der Spitze der letzten Rippe senkrecht nach abwärts bis an den Darmbeinkamm und längs dieses bis nahe an die Spina ant. sup. Die Schichten der Bauchwand und die Fascia transversa werden durchschnitten, das Bauchfell von der Darmbeingrube stumpf abgelöst und mit breiten Spateln oder der flachen Hand medialwärts verschoben. Zwischen M. iliacus und psoas liegt die Art. iliaca ext. und kann zentralwärts bis an die Symphysis sacroiliaca verfolgt werden, wo die gegen das Becken abzweigende Art. iliaca int. sichtbar ist, und zur Ligatur isoliert werden kann. Die Vene ist dem medialen Rande der Arterie angelagert.







Die eben angeführte Methode der Schnittführung dient auch zur Blosslegung der *Art. iliaca communis*.

Die Art und Weise, in welcher wir die *Arteriae iliacae* blossgelegt haben, stellt im allgemeinen den Typus dar, nach welchem wir an die Gebilde des subserösen Raumes gelangen. Mit dem Schnitte zur Unterbindung der *Iliaca interna* legen wir die Niere, den Harnleiter in seinem Verlaufe bloss. In derselben Weise gelingt es uns, mit Schonung des Bauchfells im subserösen Raum gelegene Eiteransammlungen (*Psoasabszess*, *parametrane*, *paravesikale Abszesse*) zu eröffnen.

Wird nach Eröffnung der Bauchhöhle mittelst Laparotomie das parietale Peritoneum an der hinteren Bauchwand gespalten und auf diese Weise der Retroperitonealraum blossgelegt, so spricht man von einer *transperitonealen Blosslegung* der *Art. iliaca*, der Niere, des Harnleiters etc. In diesem Falle muss das Bauchfell an zwei Stellen, entsprechend der vorderen und hinteren Bauchwand, durchtrennt werden.

### Laparotomie.

Die kunstgerechte Eröffnung der Bauchhöhle von den Bauchdecken her, mittelst Schnitt, wird als Laparotomie bezeichnet.

Die Laparotomie ist die Voroperation zur Ausführung intraperitonealer Eingriffe aller Art.

Die Bauchdeckenschnitte sind bald längs gerichtet, bald mehr oder minder schief, selbst rein quer.

Die Längsschnitte werden in der *Linea alba*, oder entsprechend dem lateralen Rande des *M. rectus abdom.* geführt. Im *Epigastrium* und *Hypogastrium* sind ebenso Schrägschnitte, parallel dem

Rippenbogen, resp. dem Poupart'schen Bande, als Längs- und Querschnitte durch die Bauchdecke gebräuchlich. Der Schnitt in der Lin. alba ist bei grossen, den Bauchraum füllenden Gebilden angezeigt; unterhalb des Nabels wird der Bauchschnitt geführt, wenn die Organe des Beckens Gegenstand der Operation werden. Durch das Epigastrium bahnt man sich den Weg an den Magen, resp. rechterseits an die Leber, die Gallenblase. Im Hypogastrium wird man einschneiden, um rechts das Zoekum, den Wurmfortsatz, links das Kolon descendens, die Flexur, zu erreichen (Fig. 238).

Die Kranken sind zur Ausführung intraperitonealer Eingriffe entweder horizontal gelagert oder der Körper ruht derart auf einer schiefen Ebene, dass der Kopf dem tiefsten, das Becken dem höchsten Punkte der geneigten Fläche entspricht (Trendelenburg's Beckenhochlagerung, Fig. 1). Die letztere Lage gewährt nach Eröffnung der Bauchdecke eine klare Uebersicht der Anordnung der Beckenorgane dadurch, dass die Därme gegen das Epigastrium in die Höhlung des Zwerchfells zurücksinken. So gestattet die Beckenhochlagerung genaue Orientierung und bietet Schutz gegen das störende Vorfallen der Därme während der Operation.

Ausführung der Schnitte durch die Bauchdecken. In der Linea alba, wie an den übrigen Partien der Bauchdecke, wird stets schichtweise mit dem Skalpell präpariert. Man durchtrennt die Haut, das Unterhautfettgewebe, gelangt auf die derbe fibröse obere Decke der Rektusscheide oder zwischen die Musculi recti. Meist werden hiebei die medialen Ränder beider M. recti in der Wunde sichtbar. Nach Durchtrennung der hinteren

Scheide des Rektus erscheint eine Schichte lockeren Zellgewebes, bei fettleibigen Personen eine Fettschicht von oft beträchtlicher Ausdehnung, die dem Bauchfell unmittelbar aufliegt. Der ganze Weg wird *praeparando* zwischen zwei Pinzetten zurückgelegt; das Bauchfell als Falte erhoben, wird an einer Stelle geschlitzt und der Schnitt mit der Schere oder dem geknöpften Messer in der Richtung und Ausdehnung der Wunde nach oben und unten erweitert.

Die longitudinalen schiefen oder queren Schnitte im Epigastrium dringen ebenso wie die im Hypogastrium sukzessive durch die Schichten der Bauchmuskeln bis auf das subseröse Fett und das Bauchfell. Das Bauchfell wird zwischen zwei Pinzetten als Falte erhoben und mit der Schere geschlitzt, der Schnitt wie oben komplettiert.

Die Bauchdeckenmuskeln sollen bei der Durchtrennung möglichst geschont werden; man drängt ihre Fasern stumpf voneinander und bahnt sich auf diese Weise den Weg. Ohne jede Muskelverletzung kann man die Bauchhöhle, durch die Scheiden des Rektus dringend, eröffnen. Nach Inzision der vorderen Wand wird der gerade Bauchmuskel seitlich verzogen und so die hintere Wand und das Peritoneum zugänglich gemacht.

Die Naht der Bauchdecken soll primär entsprechend resistent sein; die gesetzte Narbe soll keinerlei Neigung zur Ektasie, zur Bildung von Ventralhernien zeigen.

Die Naht wird mit Seide oder resorbierbarem Materiale in Etagen angelegt.

In der Linea alba fasst die tiefste Schicht von Nähten bloss das Bauchfell; beim Adaptieren der Nähte dieser Etage wird darauf geachtet, dass glatte Serosaflächen aneinander zu liegen kommen.

Die zweite Schicht fasst die Muskulatur des Rektus im Vereine mit der vorderen fibrösen

Scheide des Muskels; einige tiefgreifende Nähte sichern das Aneinanderliegen der Muskel, oberflächlichere, nur durch die vordere Rektusscheide geführte Nähte legen die Aponeurosen exakt aneinander.




Fig. 238.

**Bauchdeckenschnitte.**

a) Longitudinaler Schnitt für Operationen am Magen. b) Schnitt zur Gastrotomie. c) Schnitt für Gallenblasenoperationen. d) Schnitt zur Epizystotomie. e) Schnitt zur Ligatur der Art. iliaca ext. f) Schnitt zur Kolotomie. g) Schnitte zur Operation bei Appendizitis.

Die oberste Schicht von Nähten vereinigt die Haut in der üblichen Weise.

In analoger Form werden auch Bauchdeckenwunden in den sonstigen Regionen des Abdomens in drei Etagen vereinigt. Die tiefste Etage betrifft stets das Bauchfell, die mittlere die Muskulatur und die Aponeurosen, die oberste die Haut.

## **Operationen am Darme.**

### **Darmnaht, Enterorrhapie.**

Es handelt sich entweder um den Nahtverschluss von penetrierenden oder nicht bis in die Lichtung des Darmes reichenden Wunden oder um die Vereinigung zweier Darmpartien.

Am Darme soll die Naht im allgemeinen derart angelegt werden, dass die resistenteren Schichten der Wand (Muskularis) Wunde an Wunde zu liegen kommen. Ueber dieser Schichte werden breitere Falten der Serosa, die zur raschen primären Verklebung neigen, durch die Naht aneinander gebracht. Zu allen Operationen wird der Darm vorgezogen, auf der Bauchdecke aseptisch verwahrt und gelagert. Um das Ausströmen von Darminhalt hintanzuhalten, wird der Darm durch Klemmzangen, durch Fingerdruck oder durch Streifen steriler Gaze oder Dochte dies- und jenseits der offenen Stelle umschnürt und abgesperrt. Das beste Nahtmaterial ist Seide; die Nadeln haben kein messerförmiges Ende, sondern sind spulrund. Neben bogenförmig gekrümmten, kommen am Darm auch gerade Nadeln zur Verwendung.

Lineare Darmwunden (das gleiche gilt für den Magen) werden derart geschlossen, dass zunächst alle durchtrennten Schichten mit der

### Tab. 31. Darmnaht.

Fig. 1. Von der Serosaseite her angelegte Darmnähte.

a) Alle Schichten mit Ausnahme der Mucosa fassende Naht.


b) Lembert'sche Sero-serosanaht.

Fig. 2. Zirkuläre Darmnaht; vom Darmlumen her angelegte Naht.


Naht gefasst werden, dabei ist es gleichgültig, ob man die Schleimhaut mitfasst; hauptsächlich sollen breite Schichten der Muskularis aneinander adaptiert werden. Die Nähte werden entweder von der Serosaseite her eingestochen, oder vom Darmlumen aus angelegt; im ersteren Falle sind die Nähte an der Aussenseite, im zweiten an der Schleimhautseite zu knüpfen. Liegt diese Naht in ganzer Ausdehnung der Wunde, so wird darüber durch Aneinanderlegen von Serosafalten ein weiterer Verschluss erzielt (Lembert'sche Naht). Dabei sollen 4—5 mm breite Serosaflächen aneinanderliegen. Man bewerkstelligt dies, indem man die Nadel in entsprechender Entfernung vom Wundrande ein- und knapp vor diesem wieder austicht (in umgekehrter Reihenfolge am anderen Wundrand). Durch das Knüpfen dieser Naht wird die Serosa faltenförmig erhoben, und es kommen breite Flächen des Peritoneum zur Adaptierung. Um dieser Naht grössere Festigkeit zu geben, fasst man mit der Serosa auch das subseröse Gewebe, ja selbst etwas Muskularis mit; die durch die Naht erhobenen Falten sind dadurch substanzreicher und liegen mit breiterer Fläche aneinander an (Tab. 31). Zur Erzielung grösserer Sicherheit pflegt man der ersten Reihe Lembert'scher Nähte eine zweite analoge Etage aufzusetzen, so dass die Wunde dreireihig geschlossen ist.

Beide Schichten der Darmnaht können in Form von Knopfnähten oder als fortlaufende Naht angelegt werden.

*Fig 1.*



*Fig. 2.*







Sind quer getrennte Darmlumina zirkulär zu vereinigen, so wird nach denselben Prinzipien vorgegangen. Auch hier ist die Naht in drei Etagen angelegt. Die erste Reihe umfasst die Mukosa, die zweite die Muskularis, über welche in dritter Reihe breite Serosaflächen zur Verlötung aneinander geheftet werden. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass korrespondierende Stellen der Zirkumferenz aneinander liegen. Zu diesem Zwecke legt der Operateur entsprechend dem Mesenterialansatze und am entgegengesetzten Punkte der Umrandung je eine, sämtliche Schichten beider Stümpfe umfassende Naht an. Dadurch ist der Kreis in zwei Halbbogen getrennt; an der dem Operateur abgewandten Peripherie des Darmes wird die Vereinigung zunächst durchgeführt. Es empfiehlt sich da, die Mukosanaht von der Schleimhautseite her anzulegen und gegen das Darmlumen zu zu knüpfen (Tab. 31).

Diese Naht fasst die Mukosa des Darmes. An der dem Operateur zugewandten Hälfte des Darmumfanges werden die Nähte von der Aussenfläche, von der Serosaseite her, angelegt und geknüpft. Die muskuläre und sero-seröse (Lembert'sche Schicht wird im ganzen Umfange des Darmes über die erste Nahtreihe gesetzt. Auch hier ist es zweckmässig, ausser dem Bauchfell auch Muskularis mitzufassen, da die Falten, auf diese Weise substanzreicher geworden, besser aneinander liegen.

Sind ungleich grosse Lumina von Därmen zu vereinigen, so kann man (Billroth) den engeren Darm schräg abschneiden, um auf diese Weise die gewünschte Kongruenz zu erzielen.

Vielfältig sind Versuche unternommen worden, an Stelle der zeitraubenden Naht die Darmstümpfe zum Zwecke der Wiederherstellung der Kontinuität über einen röhrenförmigen Körper

# Tab. 32. Darmvereinigung mit dem Murphyknopf.

Fig. 1 a) b) Die beiden Hälften des Knopfes.

c) Die beiden Hälften des Knopfes ineinander geschoben.

d) zeigt die Anlegung der Naht zur Einbindung der Knopfhälfte.

Fig. 2. Vollendete Vereinigung mittelst des Murphyknopfes.  
Der Schlitz im Mesenterium ist linear geschlossen.




Fig. 239.

Die Murphy'sche  
Tabaksbeutelnaht.

A. Mesenterialansatz.

durch Umschnürung zu fixieren; erst Murphys Darmknopf konnte dieser Methode zu voller Leistungsfähigkeit verhelfen. Dieser ist aus vernickeltem Eisenblech hergestellt und besteht aus zwei mit einem hohlen Stempel und pilzförmig aufgeworfenem Rande versehenen Kapseln, die ineinander geschoben und durch Fingerdruck aneinander gebracht, vermöge ihrer Konstruktion in dieser Lage verharren (Tab. 32). Die Querschnitte des Darmes werden mit einer umschlungenen Schnürnaht versehen (Fig. 239), die, nachdem der Knopf in den Darm eingeführt ist, gezogen und geknüpft wird. Ist auch der andere Darmteil so armiert, so werden die Knopfhälften ineinander geschoben und aneinander gedrückt, worauf sie in

dieser Lage dauernd verbleiben (Tab. 32). So sind die Darmstümpfe mit breiten Serosaflächen aneinander adaptiert.





Fig. 2.





Die kleinen seitlichen Löcher im Knopfe dienen dazu, den von den abgeklemmten Teilen gelieferten Sekreten Abfluss zu verschaffen, während Darminhalt und Gase durch die grössere zentrale Oeffnung passieren.

Sind die abgeklemmten Ränder des Darmes nach ein bis zwei Wochen nekrotisiert, so ist der Verschluss bereits gesichert. Der Knopf ist freige worden und geht mit dem Darminhalt ab.


Murphy's Knopf ermöglicht zweifellos eine rasche Ausführung der exakten Vereinigung durchtrennter Darmlumina. Unglücksfälle kommen durch Perforation gelegentlich vor, doch ist man gegen diese auch bei der Anwendung der Naht und sicherer Beherrschung der Technik keineswegs gefeit. Wo eine rasche Vollendung der Operation von vitaler Bedeutung ist, mag man sich des Knopfes bedienen, in den übrigen Fällen bleibt es dem Operateur anheimgestellt, für welche der beiden Methoden er sich entscheiden will.

In den bisher erwähnten Methoden der Darmvereinigung wurden stets die Schnittflächen endständig miteinander vereinigt. Eine andere Methode schliesst die durchschnittenen Därme an ihrem Ende und stellt die Kontinuität des Rohres durch seitliche Anastomosenbildung (pag 349) her. Man kann dabei breite Flächen aneinander nähen, ohne dass dadurch, wie bei der zirkulären Naht, die Lichtung des Darmes eingeengt würde. Die ungleiche Grösse der zu vereinigenden Darmlumina ist für die Darmnaht durch seitliche Anastomosenbildung ohne Belang. Um den Darm endständig zu schliessen, kann man ihn vor der Durchtrennung mit einem kräftigen, zangenartigen Instrument (Enterotrib) in der Amputationsfläche einklemmen, wobei alle Schichten bis auf die Serosa schwinden. Nun ist die Anlegung einer Ligatur zum Verschlusse des Darmes

# Endständiger Verschluss eines Darmstückes.


**Fig. 240.**

Das Ende mit einem Faden abgeschnürt. Lembert'sche Nähte sind durchgeführt.



**Fig. 241.**

Das abgeschnürte Ende ist invaginiert und mit Lembert'schen Nähten übernäht.



möglich. Ueber diesen Stumpf muss die Serosa in breiter Schicht genäht werden. Dies geschieht durch zwei Reihen linearer Lembert'scher Nähte oder durch eine zirkulär angelegte Schnürnaht.

War der Darm ohne Hilfe des Ekrasement durchtrennt worden, so kann man die Schnittflächen durch eine lineare, alle Schichten umfassende Naht, über welche die Serosa in ein oder zwei Etagen genäht wird, vereinigen.

Die beiden am Ende verschlossenen Darmstücke werden nun zum Zwecke der Anastomosen-

bildung derart aneinander gelagert, dass sie mit breiten Flächen aneinander liegen, während die vernähten Stümpfe voneinander abgewendet sind. Die Anastomose wird nach den pag. 350 auseinander gesetzten Regeln gebildet.

Eine dritte Methode erzielt die Vereinigung durchschnittener Därme auf die Weise, dass das eine Darmstück mit seinem Ende in die zu diesem Zweck eröffnete Seitenfläche des anderen eingefügt wird, welches an seinem Ende durch Naht geschlossen ist (*termino-laterale Darmnaht*). Die Art der Ausführung entspricht der Technik der Anastomosenbildung.

### **Enteroanastomose.**

Man versteht unter dieser Bezeichnung die operative Herstellung einer Kommunikationsöffnung zwischen zwei differenten Darmteilen.

Auf diese Weise wird dem Darminhalt mit Umgehung eines Teiles ein neuer Weg eröffnet, so dass man durch die Anastomosenbildung erkrankte Partien des Darmes ausser Funktion zu setzen vermag.

In diesem Sinne wird die Operation bei Veränderungen der Darmwand angezeigt sein, die zur Verengerung der Lichtung geführt haben, und bei denen die radikale Entfernung durch Resektion entweder unmöglich ist, oder nicht opportun erscheint (Tumoren, tuberkulöse Erkrankungen, Narbenstrikturen des Darmes).

Hacker hat die Indikationen für die Anastomosenbildung erweitert und empfiehlt sie bei penetrierenden Verletzungen aneinanderliegender Därme, sowie für die Behandlung von Kotfisteln.

### Tab. 33. Darmanastomose.

I. Die Darmstücke sind an ihrer, dem Mesenterialansatz gegenüberliegenden Seite durch Serosanähte linear vereinigt.

II. Beide Darmstücke sind eröffnet. Die hintere Hälfte der alle Schichten umfassenden Ringnaht ist angelegt.

Auch Harnblasen-Darmfisteln liessen sich zweckmässig durch Ausschaltung des erkrankten Darmteiles mit der Anastomosenbildung behandeln.


Je nach den miteinander zu verbindenden Darmteilen wird die Operation der Enteroanastomose verschiedene Benennungen erfahren: z. B. Ileo-kolostomie, Kolo-kolostomie, Gastro-duodenostomie, Gastro-jejuno-stomie etc.

Zur Ausführung der Anastomosenbildung werden die beiden miteinander zu verbindenden Darmstücke, wenn möglich, vor die Bauchdeckenwunde gebracht und nach Ausstreifung des Inhaltes, am besten durch Fingerkompression abgeschnürt.


Man kann die Anastomose durch die Naht oder mit Hilfe des Darmknopfes herstellen.

Zur Naht werden die beiden Darmrohre aneinander gelegt und an der dem Mesenterialansatz gegenüberliegenden Wand in der Ausdehnung von etwa 8—10 cm durch Serosanähte linear miteinander vereinigt. Die beiden Darmstücke werden, nachdem sie durch Ausstreifen kotleer gemacht und entsprechend, zentral und peripher von der Operationsstelle, abgeklemmt sind, in der Längsrichtung, jederseits 0,5 cm von der Serosanaht entfernt, in Ausdehnung von 5—6 cm eröffnet. Will man die Anastomose in drei Etagen nähen, so spaltet man jederseits im Ausmaasse der anzulegenden Oeffnung erst Serosa und Muskularis bis auf die





*Fig. 1.*



*Fig. 2.*




Schleimhaut und vereinigt diese miteinander, ehe man die Schleimhaut nach Eröffnung des Darmes näht. In analoger Weise, doch in umgekehrter Ordnung, geht man an der anderen Hälfte vor. Zunächst wird die Mukosa, nach dieser die Muskulo-Serosa genäht und endlich eine Reihe Lembert'scher Nähte darüber gesetzt (Tab. 33).

Die Nähte müssen in dichter Reihe angelegt werden; zur rascheren Vollendung und exakteren Adaptierung empfiehlt sich die Ausführung der Anastomose mittelst fortlaufender einfacher Naht. Gerade Nadeln, die mit der Hand, ohne Hilfe von Nadelhaltern geführt werden, sind vorteilhaft.

Zur termino-lateralen Anastomose (pag. 349) wird der durchschnittene Darm mit seinem Querschnitt an die Seitenfläche des anderen adaptiert. In dieser Stellung wird der Darm in der Hälfte seiner Zirkumferenz durch eine Serosanaht an die Längsseite des zweiten geheftet; hier wird im Bereiche der anzulegenden Oeffnung Serosa und Muskularis durchtrennt und mit der des freien Randes des anderen Segmentes vereinigt. Nach longitudinaler Eröffnung des Darmes erfolgt die Naht der Mukosa. In umgekehrter Reihenfolge werden die drei Etagen in der zweiten Hälfte des Umfanges angelegt, so dass der Verschluss in der ganzen Umrandung der angelegten Oeffnung hergestellt ist.


Zur Bildung der Anastomose mit Hilfe des Murphy'schen Knopfes werden zunächst die beiden Längsschnitte angelegt, um jede eine fortlaufende Naht geschlungen (Fig. 242), welche nach Einfügung der betreffenden Knopfhälfte zusammengezogen und um den Hals derart zugeschnürt wird, dass die Ränder des Schlitzes über die Wölbung des Knopfes bis an das zylindrische Rohr dieses herangezogen werden. Sind beide Oeff-

# Anastomosenbildung mittelst Murphyknopfs.



**Fig. 242.**

Am unteren Darmstück ist die Anlegung der Schnürnaht um den Schlitz ersichtlich gemacht. Am oberen Darm ist die eine Knopfhälfte eingeführt und fixiert.



**Fig. 243. Vollendete Anastomosenbildung.**

nungen derart armiert, so schiebt man die Stiele des Knopfes ineinander, bis die zwischen den Rändern des Knopfes liegenden Gewebsteile dicht aneinander liegen (Fig. 243).

### **Anlegung einer Fistel am Darne. Enterostomie.**

Eine wandständige Fistel am Darne wird angelegt, wenn dem Darminhalt zeitweise Abfluss verschafft werden muss. In einer anderen Gruppe wird die Oeffnung am Darne etabliert, um auf dem Wege der Fistel die Ernährung zu ermöglichen. Endlich kann es sich darum handeln, den gesamten Darminhalt dauernd durch eine angelegte Oeffnung nach aussen zu befördern. Im letzteren Falle spricht man von der Anlegung eines *Anus artificialis (praeternaturalis)*.

Die Anlegung einer wandständigen Darmfistel ist ein wertvolles Mittel, um bei Darmverschluss verschiedener Form, bei Peritonitis und starker Ausdehnung der Därme, Kot und Gase aus diesen zu entleeren. Die Enterostomie ist in Fällen dieser Art an Stelle der früher üblichen Punktion der Därme getreten.

Kurzer Hautschnitt über dem Poupart'schen Bande, der Richtung dieses entsprechend. Durchtrennung der Muskulatur und Eröffnung des Bauchfells. Stellt sich geblähter Dickdarm (an den Längsstreifen, den Haustris, sowie den Appendices epiploicae kenntlich) ein, so wird dieser vorgezogen, im anderen Falle eine geblähte Dünndarmschlinge, die sich in der Wunde zeigt, in der Ausdehnung eines Zehnpfennigstückes mit dem parietalen Bauchfell umsäumt. Man fasst dabei am Darne nicht bloss die dünne Serosa, sondern auch Muskularis mit, wodurch der erzielte Verschluss an Festigkeit gewinnt.

Wenn möglich, wird die Eröffnung des Darmes in einer zweiten Sitzung (24—48 Stunden spä-

ter) vorgenommen, wenn der Abschluss der Bauchhöhle durch peritoneale Adhaesionen hinlänglich gesichert ist. Im anderen Falle wird der Darm unmittelbar nach Anlegung der serösen Ringnaht mit dem spitzen Messer oder dem Paquelinbrenner angestochen.

### Jejunostomie.

Die Fistel zum Zwecke der Ernährung wird am Dünndarme so weit als möglich zentral, am Jejunum angelegt. Von Maydl ursprünglich als ein Konkurrenzverfahren der Gastro-enterostomie gedacht, wird die Jejunostomie gegenwärtig in jenen Fällen für angezeigt erachtet, in denen die Gastroenterostomie unausführbar ist. Also bei sehr ausgebreiteten Karzinomen des Magens, ferner bei Verätzungen des Magens, wenn dieser so klein ist, dass eine Gastrostomie nicht ausführbar ist.

Eiselsberg hat das Witzel'sche Prinzip der Gastrostomie auf die Bildung der Jejunumfistel übertragen. Schnitt in der Linea alba zwischen Nabel und Symphyse; nach Eröffnung des Bauchfells wird am grossen Netze das Querkolon vorgezogen und nach oben geschlagen. An der Wurzel des Gekröses ist die Flexura duodeno-jejunalis sichtbar, worauf die oberste Jejunumschlinge vor die Wunde gebracht wird. Zur Bildung der röhrenförmigen Fistel wird ein Drain dem Mesenterialansatz gegenüber in der Längsrichtung auf den Darm gelegt; rechts und links vom Rohre werden durch Erfassen der Serosa und Muskularis mit Nähten zwei parallele Längsfalten gebildet und über dem Rohre durch Knüpfen der Fäden vereinigt. Am unteren Ende zwischen den Fäden wird der Darm, so weit als es zur Einführung des Drains erforderlich ist, eröffnet und die Darmwand über das versenkte Rohr vernäht. Die ganze Schlinge

muss durch Peritonealnähte in der Wunde suspendiert bleiben, worauf darüber die Muskulatur und Haut vernäht werden kann. Das äussere Ende des Kautschukrohres ist zur Wunde herausgeleitet. Durch den Schlauch geht die Ernährung vor sich. Da die Naht exakt schliesst, gehen Galle und Pankreassekret dem Körper nicht verloren.

### **Anus praeternaturalis.**

Die Anlegung des widernatürlichen Afters wird dann notwendig, wenn es sich darum handelt, dem gesamten Darminhalte dauernd durch eine Fistel Abfluss zu schaffen. Am häufigsten wird der künstliche After im Bereiche des Kolon descendens oder des Flexur angelegt (Kolo stomie) bei Neoplasmen oder narbigen Verengungen des Mastdarmes.

Das Kolon descendens wird intraperitoneal blossgelegt. Der Hautschnitt verläuft in der linken Regio hypogastrica 3 bis 4 Querfinger oberhalb des Poupart'schen Bandes, der Richtung dieses entsprechend. Nach Eröffnung des Bauchfells zieht der Operateur eine Schlinge der Flexur, an den Appendices epiploicae kenntlich, durch die Wunde vor. Entsprechend der Mitte der Schlinge, knapp am Darmansatz des Gekröses, wird ein Gazestreifen durch einen Schlitz des Mesenteriums durchgeführt, so dass die Darmschlinge gewissermassen auf demselben reitet. Um das Zurückweichen der Schlinge zu hindern, kann man die Serosa des Wundrandes durch einige Nähte an die Serosa der vorgezogenen Schlinge heften (Tab. 34).

In einer zweiten Sitzung wird die Kolonschlinge an ihrer Konvexität, gegenüber dem Mesenterialansatz, mit dem Paquelin quer eröffnet. In wenigen Tagen kann man den Schnitt bis auf

**Tab. 34. Darm- (Magen-) Fistel und Anus  
präternaturalis.**

**Gastrostomie.** Einnähung einer Partie der vorderen Magenwand in die Bauchdeckenwunde. Der Serosarand der Wunde ist durch fortlaufende Naht an die Serosa des Magens geheftet.

**Kolostomie.** Eine Flexurschlinge ist vorgezogen und in die Wunde fixiert.

den Mesenterialansatz komplettieren, so dass endlich in der Wunde beide Darmlumina nebeneinander zu liegen kommen.


Man kann die Operation auch in einer Sitzung ausführen, die Schlinge vorziehen, zwischen zwei Ligaturen durchtrennen und beide Stümpfe nebeneinander in der Wunde fixieren, worauf erst die Ligaturen gelöst werden. Soll die Kolostomie mit der völligen Ausschaltung des Mastdarmes kombiniert werden, was jedoch ohne prinzipielle Bedeutung ist, so wird in der gleichen Weise vorgegangen, das periphere Ende des Darmes aber blind geschlossen und versenkt, während der zentrale Stumpf zur Wunde herausgeleitet und hier fixiert wird.

**Darmresektion. Enterektomie.**

Man versteht unter dieser Bezeichnung die Ausschneidung eines Stückes aus der Kontinuität des Darmrohres; der zugehörige Gekröseanteil wird entweder mit entfernt oder bleibt erhalten. Nach geschehener Resektion kann man die Kontinuität des Rohres durch Vereinigung der Darmstümpfe wieder herstellen, oder man lässt die Stümpfe des Darmes durch die Wunde nach aussen münden, man etabliert einen Anus artificialis.

Darmresektionen werden vorgenommen: bei Verletzungen, bei Gangrän, bei Neoplasmen, bei







Stenosen des Darmes, zur Heilung von Darmfisteln.

Der zu resezierende Darmteil muss von seiner Umgebung völlig losgelöst sein, so dass er vor die Bauchdeckenwunde gebracht werden kann. Die Schlinge wird durch Ausstreifen kotleer gemacht und durch passende Instrumente, durch Fingerdruck oder Umschnürung mit Gazestreifen doppelt abgeklemmt. Die Durchtrennung des Darmes wird zwischen den abgeklebten Partien mit der Schere vorgenommen.

Nach Kocher soll die Trennungsfläche derart angelegt werden, dass an der Konvexität mehr Darm wegfällt als am Mesenterialansatze, weil auf diese Weise die Quergefässe des Darmes keinen Verletzungen ausgesetzt sind.

Das Mesenterium wird partienweise ligiert und am Darne quer abgetrennt, oder in Form eines Keiles, dessen Basis vom resezierten Darm gebildet wird, exzidiert und linear vereinigt; im ersten Falle wird das freie Gekröse nach erfolgter Resektion der Länge nach gefaltet und vernäht.

Nachdem die über die Schnittflächen vorquellende Schleimhaut sorgfältig abgewischt ist, kann an die Versorgung der Darmstümpfe geschritten werden (vide Darmnaht pag. 343).

In neuerer Zeit wird an Stelle der zirkulären Darmnaht vielfach nach der Resektion die Anastomosenbildung bei lateraler Apposition vorgenommen. Dazu werden die Stümpfe blind geschlossen (pag. 347) und durch je eine seitliche Längsöffnung miteinander in Verbindung gebracht. Es ist zweckmässig, die beiden Blindsäcke so nebeneinander zu lagern, dass das Ende des zentralen Stumpfes nach abwärts, das des peripheren in die entgegengesetzte Richtung gekehrt ist. Die Methode hat den grossen Vorteil, dass ungleiche Lumina der

**Tab. 34 a. Lagerung des Ileo-Zoekum zur Resektion des Appendix.**

Das Zoekum ist derart vor die Wunde gelagert, dass das Ende des Ileum, wie die vordere Taenie gut sichtbar sind; am Ende der letzteren die Basis des Appendix. Das Mesenteriolum des Appendix ist in eine Ligatur gefasst.

---

zu vereinigenden Därme der Ausführung keineswegs hinderlich sind.

**Darmausschaltung** (Salzer) ist eine der Resektion verwandte Operation; bei derselben wird der Darm im Gesunden, dies- und jenseits des erkrankten Teiles, wie bei der Resektion quer durchtrennt, worauf die Kontinuität durch Zirkulärnaht oder laterale Apposition und Anastomosenbildung wieder hergestellt wird. Das ausgeschaltete Darmstück wird aber nicht entfernt, sondern verbleibt im Körper, während ein Ende, oder seine beiden Enden in die Haut eingenäht werden.

Die Operation ist bei Darmstenose dort angezeigt, wo eine radikale Entfernung des erkrankten Gewebes entweder unmöglich (inoperable Tumoren) erscheint, oder nicht für nötig erachtet wird (chronisch entzündliche Prozesse), wobei es aber wünschenswert ist, dass der erkrankte Darmteil völlig ausser Kontakt mit dem Darminhalt gesetzt werde.

**Amputation des Processus vermiformis.**

Zur Abtragung des Processus vermiformis im freien Intervall, nach abgelaufener Entzündung, wird der Hautschnitt in der Regio epigastrica, der Faserrichtung des Obliquus externus entsprechend, angelegt. Nach Beck beginnt der Hautschnitt drei Querfinger oberhalb der Symphyse und zieht in der Faserrichtung des Obliquus ext. bis drei Querfinger unter das vordere Ende








Fig. 244.

**Tabaksbeutelnaht nach erfolgter Amputation des Appendix.**




Fig. 245.

**Der Appendixstumpf durch Schluss der Schnürnaht versenkt,  
wird mit Serosa übernäht.**

der elften Rippe. Ein schräger Schnitt über der Rektusscheide ist aus dem Grund vorteilhaft, weil man die Bauchhöhle ohne jegliche Muskelverletzung eröffnet. Nach Spaltung der vorderen Wand wird der blossgelegte Rektus verzogen, so dass die Bauchhöhle durch die hintere Wand der Scheide eröffnet werden kann.

Die Bauchfellwunde wird bei mässiger Beckenhochlagerung durch Spateln aufgeklafft, so dass die Gebilde der rechten Beckenschaufel blossliegen. Gewöhnlich ist das Zoekum sichtbar und wird vor die Wunde gebracht. In einfachen Fällen ist der Appendix auch nach schweren abgelaufenen Anfällen frei und lässt sich vorziehen. In anderen muss der Wurm erst aus abnorm fixierter Lage gelöst werden, ehe es gelingt, ihn zur Amputation vor die Wunde zu bekommen. Die Lösung muss mit grösster Schonung erfolgen. Zur Orientierung bringt man stets das Zoekum in der Tab. 34a angegebenen Position zur Ansicht. Die Einmündung des Ileum muss sichtbar sein; am Ende der Taenie ist die Wurzel des Appendix, den man von hier aus, wenn er nicht frei ist, weiter verfolgt. Ist er mobilisiert, so fasst man das Mesenteriolum in eine Ligatur und durchschneidet es, so dass der Appendix an seiner Wurzel frei ist. Mit einer Klemme wird die Wurzel des Appendix quer bis auf die Serosa durchquetscht und in der Schnürfurche ligiert. Jenseits der Ligatur erfolgt nun die Abtragung mit dem Messer. Eine zirkuläre Naht wird um den ligierten Stumpf gelegt (Fig. 244) und dieser durch Zuschnüren der Naht versenkt und mit Peritoneum gedeckt. Zur grösseren Sicherheit kann man noch Schnürnaht und Stumpf des Mesenteriolum durch eine lineare Lembertnaht decken (Fig. 245).

Operiert man im Anfalle, so wird nach Eröffnung der Bauchhöhle, behutsam das oft dem



Appendix aufliegende verdickte Netz abgehoben, der Appendix unter grösster Schonung der Umgebung aus seinen lockeren Verlötungen gelöst und nach den oben gegebenen Regeln abgetragen. Sitzt die Perforation nahe der Basis, so kann die Ligatur oft nicht nach den Regeln der Kunst erfolgen; man ist dann genötigt, atypisch die Implantationsstelle am Zoekum ovalair auszuscheiden und den Defekt durch Etagnennaht zu schliessen.

Stets wird in eitrigen Fällen die Wunde in den Bauchdecken nur partiell geschlossen und das Wundbett des Appendix ausgiebig drainiert.

Ist ein grösserer Eiterherd schon durch die Bauchdecken palpabel, so zieht der Schnitt über die grösste Vorwölbung. Sind die Bauchdecken bis auf das Peritoneum gespalten, so sucht man durch vorsichtiges Eingehen mit der Kornzange oder der Hohlsonde den Eiterherd zu eröffnen. Ist dies gelungen, so wird die Zugangsöffnung stumpf in ausreichendem Maasse erweitert. Ist der Appendix sichtbar und leicht zugänglich, so entfernt man ihn; ein Suchen nach demselben wird nicht empfohlen. Die Eiterhöhle wird durch Kautschuk- oder Glasröhren ausreichend drainiert.

Ist der Eiterherd nicht abgesackt, besteht allgemeine Peritonitis, so entleert man den Eiter und drainiert die Bauchhöhle.

Der im Kavum Douglasii bei Appendizitis typisch vorkommende Eiterherd kann durch rektalen oder vaginalen Einschnitt, von der Kreuzbeinseite her, durch die Zellräume des Mittelfleisches praerektal eröffnet werden. Auch hier beschränkt sich der Eingriff auf Eröffnung und Drainage der Eiterhöhle. Die in einer zweiten Operation vorzunehmende Abtragung der Appendix wird gewöhnlich keine Schwierigkeiten bieten.

### Kolopexie.

Die operative Fixierung der Flexura sigm. an die Bauchwand ist bei hochgradigem Mastdarmprolaps ausgeführt worden. Der Schnitt wird links im Epigastrium von der Mitte des Poupart'schen Bandes, schief nach oben aussen bis zur Spina ant. sup. geführt. Man passiert die Bauchdeckenmuskulatur und eröffnet das Peritoneum, worauf die Flexurschlinge aus dem Becken herausgeholt und bis in die Höhe der Wunde verzogen wird. Hier wird sie derart gelagert, dass ihre Längsrichtung mit der der Wunde zusammenfällt. Nähte durch die Muskulatur der Bauchdecke und das Peritoneum umfassen auch die Serosa und Muskularis des in der Wunde liegenden Darmes. Wenn sie geknüpft werden, so schliessen sie die Bauchdecke und fixieren gleichzeitig das Kolon im Niveau der Wunde. Hautnaht.

### Operationen am Magen.

#### Anlegung einer Fistel am Magen. Gastrostomie.

Die Fistel wird am Magen angelegt, um durch dieselbe Nahrung einzuführen, wenn die Speiseröhre durch Krebs oder narbige Verengerung unwegsam geworden ist. Im letzteren Falle soll die Fistel überdies die instrumentelle Erweiterung des Oesophagus ermöglichen oder erleichtern.

Man gelangt an den Magen, wenn man die Bauchdecke im Bereiche des Epigastriums median oder in ihrer linken Hälfte spaltet. Der Magen ist leicht kenntlich an der charakteristischen Ausstrahlung der Gefässe von der grossen und kleinen Krümmung her; überdies ist er in seiner Wandung dicker als die dünnen Därme, vom Kolon durch den Mangel an Haustris leicht zu unterscheiden.

Am besten wird man den Magen erreichen, wenn man einen Zipfel des grossen Netzes erfasst und diesen zentralwärts bis an die *Curvatura major* verfolgt.

Die ursprüngliche und primitivste Methode der Gastrostomie ist das folgende: Hautschnitt 6—8 cm lang, parallel dem linken Rippenbogen, etwa 2—3 cm von diesem entfernt. Das obere Ende des Schnittes liegt daumenbreit nach links von der Spitze des Schwertfortsatzes (Fig. 238). Die Bauchdeckenmuskeln werden stumpf auseinandergedrängt und das Bauchfell in der Richtung des Hautschnittes eröffnet.

Man zieht den Magen durch die Wunde vor, so dass dessen Kuppe bis an das Hautniveau reicht; eine fortlaufende Naht heftet das parietale Bauchfell der Wunde, zirkulär an die Basis der vorgezogenen Magenpartie.

Die Eröffnung des Magens wird zweckmässig 24 Stunden später mit dem Paquelin vorgenommen. Wenn Gefahr im Verzuge, kann der Magen auch im unmittelbaren Anschlusse eröffnet werden, wobei man die kleine Inzision am Magen der Richtung der Hautwunde entsprechend anlegt. Man kann zweckmässig die Ränder der Magenwunde mit der Haut vereinigen.

Die auf diese Weise geschaffene Fistel hat den Uebelstand der *Inkontinenz*. Die eingespritzte Nährflüssigkeit fliesst bei aufrechter Stellung aus, und die umgebende Haut leidet unter dem Kontakte mit dem scharfen Magensaft. Trotzdem wird man die Fistel in dieser Form etablieren, wenn man die Absicht hat, durch die Oeffnung am Magen die Erweiterung des Oesophagus vorzunehmen.

Es lassen sich kontinente Fisteln am Magen erzielen, wenn man den Magen nicht auf kürze-

stem Wege direkt nach aussen münden lässt, sondern einen längeren Fistelkanal bildet. Die wichtigsten Methoden dieser Art sind die folgenden:


### Gastrostomie nach Hacker-Witzel.

Vertikaler Hautschnitt über der Mitte des linken M. rectus abdominis, vom Rippenbogen 7 bis 8 cm lang nach abwärts. Man drängt die Fasern des Muskels auseinander, spaltet die hintere Rektusscheide und das Bauchfell und zieht eine Kuppe des Magens, die an ihrer Basis mit dem parietalen Bauchfell umsäumt wird, vor.

Eine Oeffnung am Magen, gross genug, um ein Kautschukrohr von etwa 5—6 mm Durchmesser einzuführen, wird angelegt (Fig. 246). Das Rohr taucht mit seinem Ende in die Höhlung des Magens und wird in der Richtung des Hautschnittes an den Magen gelehnt und mit zwei Falten, die aus Serosa und Muskularis bestehen, übernäht (Fig. 247). Man kann diesen Kanal durch Nähte beliebig verlängern. Witzel empfiehlt eine Länge von 4—8 cm. Schliesslich wird der Magen entsprechend dem oberen Ende des Witzel'schen Kanales mit einigen Nähten an die Haut geheftet, die übrige Wunde nach abwärts drainiert und durch Naht geschlossen.

Man kann die Operation zweizeitig oder in einem Akte ausführen. Im ersteren Falle wird die vorgezogene Magenpartie mit dem Peritoneum der Bauchdeckenwunde umsäumt und die Fistel 24 Stunden später gebildet. Will man einzeitig operieren, so ist es gleichgültig, ob man zunächst den Kanal bildet und am Schlusse den vorgezogenen Magen mit Serosanähten in der Wunde suspendiert, oder ob man vor Eröffnung des Magens die Bauchhöhle in der genannten Weise abschliesst.

Das Ausfliessen von Mageninhalt wird sich zweckmässig durch Anlegung von zwei Darmklemmen verhüten lassen, durch welche sich der Operationsbezirk am Magen völlig abgrenzen lässt.




Gastrostomie nach Hacker-Witzel.

Fig. 246.

Der Magen ist vorgezogen und in die Peritonealwunde eingenäht. Durch eine dem unteren Pol nahe kleine Inzision ist ein Rohr in die Kavität des Magens eingeschoben. Die rechts und links sichtbaren Muskeln sind die Hälften des längsgespaltenen *Musc. rectus abdominis*.

Die Methoden von Marwedel, wie die von Schnitzler sind Verbesserungen des Witzelschen Verfahrens. Marwedel legt an dem, in die Bauchwunde eingenähten Magen, einen 4, 5 cm langen Schnitt in der Richtung des zu bildenden

Kanals an; dieser dringt bloss durch Serosa und Muskulatur, lässt die Schleimhaut des Magens also unverletzt. Am unteren Ende des Schnittes wird die Schleimhaut durch eine kleine, quere Inzision eröffnet, durch diese ein Kautschukrohr eingeführt und mit einer Katgutnaht an die Schleimhaut geheftet. Ueber dem Rohre wird die ganze Magenwunde vereinigt und so ein dem Witzel'-



### Gastrostomie nach Hacker-Witzel.

Fig 247.

Bildung der röhrenförmigen Fistel.

Das Ende des eingeführten Kautschukrohres ist an den Magen angelegt und wird mit sero-muskulären Nähten übernäht.

schen Kanäle ähnlicher in der Submukosa gelegener Gang geschaffen.

Schnitzler etabliert den submukösen Fistelkanal in einfacherer Weise; Eröffnung des vorgezogenen Magens durch einen kleinen Schnitt; ein Rohr wird in den Magen eingeführt und 4—5 cm über der ersten Inzision ein kleiner Schnitt durch Serosa und Muskularis bis auf die Schleimhaut ge-

führt. Durch diesen Schlitz wird in der submukösen Schicht eine Kornzange bis an das Rohr geführt, dieses bei seinem äusseren Ende gefasst und zum oberen Schlitz herausgeleitet. Beide Lücken werden durch Lembert'sche Nähte geschlossen; die den Kanal enthaltende Partie des Magens mit Peritoneum parietale umsäumt und der Magen mit einigen Nähten an das obere Ende der Hautwunde fixiert.

Der Magenfistelkanal nach Kaders Methode verläuft nicht in schräger, sondern senkrechter Richtung durch die Magenwand. Ein Rohr wird durch eine kleine Oeffnung in den Magen geleitet und, während es senkrecht zur Wand gehalten wird, an seiner Basis mit Falten des Magens in Etagen übernäht.

Frank legt den Hautschnitt parallel dem Rippenbogen an und zieht nach Eröffnung des Bauchfells eine 3—4 cm hohe Kuppe des Magens vor, die an ihrer Spitze mit einer Fadenschlinge armiert, entsprechend ihrer Basis mit dem Peritoneum parietale der Wunde umsäumt wird. Am Rippenbogen wird nun zwei Querfinger oberhalb des ersten ein 1,5 cm langer Schnitt geführt und die Haut zwischen beiden von ihrer Unterlage abpräpariert, worauf der Zipfel des Magens unter der Hautbrücke durchgezogen, in der oberen Wunde fixiert und an der Kuppe eröffnet wird. Der Schnitt unter dem Rippenbogen kann komplett vernäht werden.

Die Fisteleröffnung liegt über dem Niveau des Magens und wird durch die, den vorgezogenen Magen deckende Hautbrücke komprimiert.

### **Gastro-enterostomie.**

Die Anlegung einer Kommunikation zwischen dem Magen und dem Dünndarm wird ausgeführt bei stenosierendem Py-

loruskarzinom, welches radikal nicht operabel ist, ferner bei profusen Magenblutungen, endlich bei narbigen Verengungen des Pfortners, um mit Umgehung der verengten Passage den Mageninhalt direkt in den Dünndarm zu leiten. Im ersteren Falle ist die Operation ein palliativer Eingriff, im letzteren kann sie dauernde Heilung bringen.

Die Anastomose wird zwischen dem Magen und einer Jejunumschlinge hergestellt; dabei kann man die Fistel an der vorderen oder an der hinteren Magenwand etablieren. Im ersteren Falle (Gastro-enterostomia anterior, Wölfler'sche Methode) wird die Dünndarmschlinge über das Querkolon an den Magen gebracht, deshalb auch Gastro-enterostomia antekolika genannt.

Hacker lässt den Dünndarm an der hinteren Magenwand einmünden (Gastro-enterostomia posterior). Die Methode sollte eine natürlichere Lage des Dünndarms nach der Fistelbildung bedingen und überdies die Möglichkeit einer Kompression des Querkolon von seiten des Dünndarms unmöglich machen.

Man kann jedoch die Uebelstände, die bei der Gastro-enterostomia anterior aus der unnatürlichen Lage des Dünndarms resultieren, verhüten, wenn man eine Schlinge zur Anastomose wählt, die von der Flexura duodeno-jejunalis entsprechend weit gelegen ist.

Sind beide Magenwände frei, so bleibt es der Vorliebe des Operateurs überlassen, ob er die Anastomose an der Vorder- oder an der Rückwand anlegen will. Ist die Vorderseite des Magens infiltriert, so wird man die Hacker'sche Operation, im umgekehrten Falle, wenn die hintere Wand mitergriffen oder bei fixiertem Magen nicht zugänglich ist, die Gastro-enterostomia anterior auszuführen genötigt sein.




### Gastro-enterostomia anterior.

Hautschnitt in der Linea alba zwischen Schwertfortsatz und Nabel; Eröffnung der Bauchhöhle. Man hat sich zunächst über die Beschaffenheit des Magens zu orientieren und an diesem wie am Dünndarm die Stellen der Anastomose zu bestimmen. Am Magen liegt sie an der Vorderwand, in der Mitte zwischen Pylorus und Fundus über der grossen Kurvatur. Die Stelle am Dünndarm liegt 40—50 cm peripher von der Flexura duodeno-jejunalis. Zieht man mit dem grossen Netze das Kolon transversum aus der Wunde und schlägt man dieses so nach aufwärts, dass auch sein Mesenterium ausgespannt ist, so wird man an der Wurzel dieses, entsprechend der linken Seite des zweiten Lendenwirbels, die dort fixierte Pars ascendens duodeni und die scharfe Biegung der Flexura duodeno-jejunalis wahrnehmen, so dass von da aus die betreffende Stelle am Jejunum sich mit Sicherheit bestimmen lässt.

Magen und die gewählte Dünndarmpartie bleiben vor der Wunde; die übrigen Därme werden reponiert. Darm und Magen nun instrumentell oder mit Fingerkompression abgeklemmt und aneinander gelagert.

Eine Reihe sero-muskulärer Nähte heftet den Darm mit seiner Konvexität linear in entsprechender Ausdehnung an die Vorderwand des Magens (Fig. 248). In je grösserer Ausdehnung man so die Schlinge an den Magen heftet, um so sicherer wird man Spornbildungen, welche die Funktion der Fistel behindern können, vermeiden.

In der Länge der anzulegenden Oeffnung wird 0,5—1 cm von der Naht entfernt am Magen wie am Darne ein Schnitt parallel der Serosanaht angelegt; will man zweietagig nähen, so dringt dieser alsbald bis in die Lichtung beider Organe, worauf




### Gastro-enterostomia anterior.

Fig. 248.

Uebersichtsbild der topographischen Verhältnisse bei der vorderen Gastro-enterostomie. Eine Jejunumschlinge ist über das Kolon transversum geschlungen und an die vordere Magenwand fixiert. Der abführende Teil der Schlinge entspricht in seiner Richtung der natürlichen Fortsetzung des Magens.

die einander zugekehrten Ränder der Oeffnungen durch dicht gesetzte Nähte, die die ganze Wanddicke umfassen, vereinigt werden. Soll die Naht drei Etagen haben, so dringt der Schnitt nur bis an die Mukosa, worauf die Sero-muskularis jederseits in gesonderter Schicht miteinander vereinigt wird, ehe die Lumina des Darmes und Magens



Gastro-enterostomia anterior.


Fig. 249.

Man sieht noch die Enden der fixierenden Serosanähte. Die beiden Darmstücke sind eröffnet. An der hinteren Begrenzung sind, alle Schichten umfassende Nähte angelegt.

offen sind. In gleicher Weise, doch in umgekehrter Reihenfolge, wird die Naht an der Vorderwand angelegt, zunächst die Mukosa, dann die Muskularis genäht, über welche eine dichte Lembertreihe zu liegen kommt, so dass allenthalben eine dreireihige Naht die Anastomose sichert (Fig. 250). Nicht unzweckmässig ist es, auf die angelegte

Naht Netz zu fixieren, um so die Gewähr eines sicheren Abschlusses zu haben. Die beiden Darmteile werden in die Peritonealhöhle versenkt und die Bauchdeckenwunde in Etagen geschlossen.

An Stelle der Naht kann bei Gastro-enterostomie zweckmässig auch Murphys Anastomosenknopf zur Anwendung kommen. Bei Etablierung der Fistel folgt man dabei den pag. 347 auseinandergesetzten Regeln.



Gastro-enterostomia anterior.


Fig. 250.

Situation nach vollendeter Operation.

### Gastro-enterostomia posterior.

Die erste Hälfte der Operation bis zur Blosslegung der Flexura duodeno-jejunalis analog wie bei der Gastro-enterostomia anterior. Ist das Querkolon in der geschilderten Weise nach auf-

wärts geschlagen, so wird ein Schnitt im Mesokolon, parallel der Richtung der Gefäße angelegt, durch welchen man an die hintere Wand




### Gastro-enterostomia posterior. I.

Fig. 251.

Das Kolon transversum, mit diesem der Magen, sind nach aufwärts geschlagen. Durch einen Längsschlitz im Mesokolon ist die hintere Magenwand sichtbar. Die nächst der Flexura duodeno-jejunalis gelegene Dünndarmschlinge ist zur Anastomosenbildung an den Magen genähert.

des erhobenen Magens gelangt. Der Magen wird durch die Lücke vorgezogen. Die Ränder der klaffenden Wunde im Mesokolon werden an den

Magen geheftet, so dass sich die oberste Jejunumschlinge (etwa 15 cm von der Flexur entfernt) nun mit Leichtigkeit an den blossgelegten Magen bringen lässt (Fig. 251, 252). Die Anastomose wird




## Gastro-enterostomia posterior. II.

Fig. 252.

Magen und Jejunum sind im Bereiche der anzulegenden Anastomose durch fortlaufende Serosanaht aneinander geheftet. I. Etage der Naht an der hinteren Peripherie.

in der oben geschilderten Weise angelegt. Nach vollendeter Vereinigung wird das Kolon transversum mit dem grossen Netz in seine normale Lage gebracht.




### Gastro-enterostomia posterior. III.

Fig. 253.

Im Bereiche der anzulegenden Anastomose sind Darm- und Magenwand bis auf die Schleimhaut gespalten. Seromuskuläre Naht. II. Etage an der hinteren Umrandung.

Bei der Anlegung der Fistel muss darauf Bedacht genommen werden, dass der Mageninhalt mit Leichtigkeit in den abführenden Teil

des Darmes gelange. Bei fehlerhaftem Abfließen soll jedenfalls die Stauung im zuführenden Teil



#### Gastro-enterostomia posterior. IV.

Fig. 254.

Naht der hinteren Umrandung vollendet. Darm und Magen sind offen. Bildung der innersten Nahtreihe an der vorderen Peripherie.

vermieden werden. Endlich muss man das Einströmen von Darminhalt in den Magen zu vermeiden wissen.



Schon Wölfler hat betont, dass der Darm derart an den Magen zu heften sei, dass der Mageninhalt durch die Peristaltik direkt in das abführende Rohr gelange. Lauenstein gibt der Fistel eine schräge Richtung von links oben nach rechts unten, so dass die abführende Schlinge in der Richtung der Peristaltik des Magens zu liegen kommt; die zuführende Schlinge wird eine Strecke weit links und oberhalb der Fistel am Magen angeheftet. Jedenfalls ist die breite Anheftung der Schlinge am Magen bedeutungsvoll, indem wir auf diese Weise die Knickung und Spornbildung am angenähten Jejunum am ehesten vermeiden können. Um bei fehlerhaftem Abfliessen den Uebelstand zu beseitigen, dass der Darminhalt sich in der zuführenden Schlinge anstaut, hat Lauenstein empfohlen, nach der Gastro-enterostomie eine Anastomose zwischen der zuführenden Schlinge und einer Schlinge des Jejunum zu etablieren. Braun stellt zu demselben Zwecke die Anastomose zwischen den beiden Schenkeln der an den Magen genähten Jejunumschlinge her.

Um das Regurgitieren aus dem Darm in den Magen zu verhindern, heftet Kocher die Darmschlinge derart an den Magen, dass die erstere senkrecht zur grossen Krümmung zu liegen kommt. Der Darm wird an seiner Konvexität quer eingeschnitten, der Magen wie gewöhnlich eröffnet. Die zuführende Schlinge liegt dem Magen an, die abführende hängt frei nach unten; der Mageninhalt muss sich direkt in den senkrecht nach unten gehenden Darm entleeren. Wölfler erreicht denselben Zweck, indem er die Dünndarmschlinge durchschneidet, den abführenden Schenkel in den Magen implantiert, den zuführenden Teil in die Wand des unteren Endes seitlich einmünden lässt.

### Tab. 34b. Resektion des Pylorus.

Der Pylorusanteil ist vom kardialen Teil des Magens abgetrennt und die beiden Segmente sind auseinandergeklappt. Von der Leber ist der Lobus Spigelii sichtbar, unter diesem die Verästelungen der Art. Coeliaca, die Art. gastroduodenalis, die Art. lienalis und die Art. hepatica. Quer in die Tiefe der Wunde liegt das Pankreas, an dessen oberem Rande die mächtige Vena lienalis. Der Pylorusteil des Magens wird durch fortlaufende Naht geschlossen, von welcher die erste alle Schichten durchdringende Etage angelegt wird.


Endlich sind mehrfache Versuche unternommen worden, durch Klappenbildung eine Art von Ventilverschluss der Magendarmfistel herzustellen (Wölfler, Kocher, Sonnenburg und andere).

### Resektion des Pylorus.

Die Resektion des Pylorus ist in zielbewusster Weise zuerst von Billroth (1881) ausgeführt worden. Angezeigt ist die Operation bei Karzinomen des Pylorus, wenn diese beweglich, nicht auf die Umgebung übergegriffen haben.

Der Hautschnitt wird in der Linea alba zwischen Nabel und Symphyse, oder nach Billroths ursprünglichem Vorgang, im Epigastrium, quer durch die Rekti abdominis geführt. Nach Eröffnung der Bauchhöhle erst kann die Entscheidung getroffen werden, ob die Resektion des Pylorus überhaupt möglich ist. Man tastet die Vorderseite, wenn nötig, durch einen im kleinen Netz angebrachten Schlitz die Rückseite des Magens ab, und stellt die Beweglichkeit der Geschwulst fest.

Der nächste Akt der Exstirpation ist die Isolierung des Pylorus. Zu diesem Zwecke müssen die Ansätze des grossen und kleinen Netzes am Magen, soweit dieser herausgeschnitten werden soll, durchtrennt werden. Zunächst wird





das Ligamentum gastro-colicum partienweise doppelt ligiert und zwischen den Ligaturen durchtrennt, in analoger Weise das Lig. hepato-gastricum. Während der Magen nach abwärts verzogen wird, unterbindet man die Art. coron. ventr. an der kleinen Krümmung.

Der so mobil gemachte Pylorusanteil des Magens wird dies- und jenseits vom Tumor im Gesunden abgeklemmt, worauf mit der Schere die Ausschneidung erfolgt. Zunächst versorgt man den kardialen Teil des Magens, am besten indem man den Schnitt exakt mittelst fortlaufender Naht vereinigt (Tab. 34 b). Nun wird am Pylorusanteil die Isolierung bis in den gesunden Teil des Duodenums fortgesetzt, dieser so weit mobilisiert, dass er ohne Spannung an den Magen gebracht werden kann, und im Gesunden nach Abklemmung durchschnitten. Billroth hat die Stümpfe am Magen und Duodenum durch zirkuläre Naht vereinigt. Zur Herstellung einer Kongruenz wurde die Magenwunde von oben her nur so weit vernäht, bis sie eine dem Querschnitt des Duodenums ähnliche Grösse hatte. Eine latero-terminale Naht hat Kocher angewendet. Sie hat den Vorteil, dass die Magenwunde rasch exakt verschlossen wird, und zwar mittelst einer zwei- oder dreietagigen Naht. Der mobile Duodenumstumpf wird durch Serosanaht an die Rückseite des Magens geheftet, und mit diesem nach den Regeln der Anastomosenbildung in Verbindung gebracht.

Nach ausgebreiteter Resektion des Pylorus hat Billroth nach der Ausschneidung des Magens beide Schnittflächen vereinigt, Magen und Duodenum also blind geschlossen und den kardialen Stumpf mit einer Jejunumschlinge, wie bei der Gastro-enterostomie in Kommunikation gebracht.

**Pylorusausschaltung.** Bei inoperablen Geschwülsten des Magens hat Eiselsberg die Gastro-enterostomie mit der Pylorusausschaltung kombiniert, um die Geschwürfläche bei Schmerzen oder bei Neigung zu heftigen Blutungen völlig ausser Kontakt mit dem Mageninhalt zu setzen. Zunächst wird der Magen zentral von der Geschwulst, nachdem an dieser Stelle die Ansätze des grossen und kleinen Netzes abgelöst sind, zwischen Darmklemmen in vertikaler Richtung durchschnitten, worauf nach Stillung der Blutung jede der Schnittflächen für sich durch eine zweireihige Naht geschlossen wird. An den kardialen Teil des Magens wird eine der oberen Jejunumschlingen durch seitliche Anastomosenbildung angeschlossen, so dass die Partie des Magens, in welchen die Speiseröhre und der Darm münden, völlig vom Pylorusteil isoliert ist.

### **Operationen am Gallensysteme.**

Bei Verletzungen der Leber muss diese zur Blutstillung bisweilen blossgelegt werden. Ist die Wunde penetrierend, so erweitert man die Bauchdeckenwunde, in anderem Falle (subkutane Verletzung) führt man den Schnitt median über dem Nabel oder längs des äusseren Rektusrandes. Die Blutung aus der Leberwunde wird am besten durch Tamponade gestillt.

Die Abszesse der Leber werden zur Inzision durch die einfache Laparotomie subpleural oder transpleural zugänglich gemacht. Die beiden letzteren Methoden sind dort angezeigt, wo von der Vorderseite her der Krankheitsherd auch nach Durchtrennung des Lig. suspensorium und Herabdrängen der Leber nicht erreichbar ist. Zur subpleuralen Blosslegung der Leber werden rechts von einem schrägen Schnitte aus die

Ansätze der 8., 9. und 10. Rippe am Rippenbogen durchtrennt und dieser nach abwärts geknickt. Im Grunde der Wunde durchtrennt man die Fasern des Transversus, eröffnet das Bauchfell und gelangt an die konvexe Fläche der Leber. Um transpleural an die Leber zu gelangen, wird durch Resektion der 8. und 9. Rippe zwischen Axillar- und Skapularlinie der Zugang geschaffen. Man kann, wenn die diaphragmale und kostale Pleura verwachsen sind, durch das Zwerchfell hindurch die Inzision der Leber vornehmen. Im anderen Falle operiert man zweckmässig in zwei Zeiten; man vernäht die Pleura kostalis mit dem Zwerchfell, durchschneidet dieses und das Bauchfell; ein entsprechend grosses Stück der Leberfläche wird mit Peritoneum umsäumt und der Abszess einige Tage später an dieser Stelle eröffnet.

Beim Echinokokkus der Leber wird durch Laparotomie die Kyste blossgelegt, an talergrosser Stelle mit Peritoneum umsäumt und sofort oder in zweiter Sitzung an der prominentesten Stelle eröffnet. Man räumt die Tochterblasen aus und drainiert die Höhle.

Um an die grossen Gallenwege zu gelangen, liegt der Kranke in Rückenlage; durch ein unterlegtes Kissen wird eine Hyperlordose der Wirbelsäule erzeugt, die die Zugänglichkeit zur Leberpforte verbessert. Kelling erzielt denselben Effekt dadurch, dass er die Beine des in Rückenlage befindlichen Kranken senkrecht über den Tischrand hängen lässt.

Der Hautschnitt verläuft in der Linea alba oder seitlich von dieser, am äusseren Rande des Rektus vom Rippenbogen bis zum Nabel. Czerny verwendet einen winkelförmigen Schnitt, dessen vertikaler Schenkel in der Linea alba liegt; unterhalb des Nabels wird dem ersten

ein horizontaler Schnitt angefügt, der nach rechts zieht.

In allen Fällen wird nach Eröffnung des Bauchfells der rechte Leberlappen aufwärts geschlagen, so dass die untere Fläche desselben mit der Gallenblase und der Leberpforte sichtbar wird. Zwischen der Porta hepatis und der kleinen Kurvatur des Magens ist eine Peritonealduplikatur ausgespannt (*Omentum minus*), in deren rechtem, freiem Ende die grossen Gallengänge, die *Vena portae* und die Leberarterie in der angegebenen Reihenfolge eingeschlossen sind.

**Cholezystotomie und Cholezystostomie.** Die Gallenblase wird durch den Schnitt eröffnet (*Cholezystotomie*), wenn es sich um die Entfernung von Gallensteinen, um Empyem oder Hydrops derselben handelt. Der Gallenblasenschnitt kann einzeitig oder nach Einnähung einer Partie der Gallenblase in die Wunde, in zwei Zeiten vorgenommen werden.

Im ersteren Falle kann man nach Entfernung der Steine die Wunde in der Gallenblase durch Naht vereinigen und die Bauchwunde schliessen (*ideale Cholezystotomie*, *Cholezystendyse*) oder man suspendiert die genähte Gallenblase im Niveau der Wunde.

Verzichtet man auf die primäre Naht, so kann man nach den bei Darmoperationen angegebenen Regeln eine Gallenblasenbauchdeckenfistel etablieren (*Cholezystostomie*).

Die Ausführung der *Cholezystotomie* betreffend, sei bloss bemerkt, dass nach Anlegung des Hautschnittes, Eröffnung des Bauchfells die Gallenblase möglichst ins Niveau der Wunde gebracht, mit Fäden angeseilt, in dieser Position erhalten wird. Nach Punktion der Gallenblase wird diese eingeschnitten und unter Lei-



tung des Fingers die Ausräumung der Steine mit Hilfe von Steinzangen, Steinlöffeln ausgeführt, wobei auch auf Steine im Ductus zysticus Rücksicht genommen werden soll.

Die Gallenblasenwunde wird ganz analog wie Darm in zwei Etagen vereinigt. Die erste Nahtreihe fasst die ganze Dicke der Gallenblase und adaptiert Wunde an Wunde. Die zweite Etage ist eine Lemberg'sche Serosanaht und soll die Naht durch das Aneinanderlegen breiterer Peritonealfalten sichern. Zur zweizeitigen Zystotomie, sowie zur Zystostomie wird eine Partie der vorgezogenen Fläche der Gallenblase mit dem Peritoneum der Bauchdeckenwunde umsäumt (wie bei der Gastrostomie) und die blossliegende Partie nach Tagen mit dem Paquelinbrenner eröffnet.

**Cholezystektomie.** Die Exstirpation der Gallenblase, Cholezystektomie, ist bei Neoplasmen des Organs, sowie bei Gallensteinen, die mit entzündlichen Erkrankungen der Gallenblasenwand einhergehen, angezeigt.

Der typische Vorgang bei Entfernung der Gallenblase besteht darin, dass die Serosa an der Gallenblasen-Lebergrenze, näher an ersterer, mit der Spitze des Messers eingeschnitten wird, worauf man die Gallenblase stumpf aus ihrem Bette hebt. Die Blutung aus der flächenhaften Wunde stillt man durch Tamponade und setzt die Lösung bis auf den Duktus zystikus fort. Dieser wird nahe dem Choledochus ligiert und abgeschnitten. Das Wundbett wird durch Gazestreifen drainiert. Soll nach der Cholezystektomie eine Drainage der Gallenwege etabliert werden, so entfällt die Ligatur, und ein Kautschukrohr wird durch den Zystikusstumpf in den Duktus hepaticus eingeführt und zur Wunde herausgeleitet.

**Choledochotomie.** Die Eröffnung des Ductus choledochus durch Schnitt (Chole-dochotomie) wird zur Entfernung eingekeilter Steine notwendig. Man lässt die Leber emporheben, geht mit dem Zeigefinger der linken Hand in das Foramen Winslowii ein und spannt so den gewöhnlich dickwandigen und erweiterten Choledochus an. Auf den so festgestellten Stein wird eingeschnitten und die Wunde im Choledochus durch Naht verreinigt oder nach aussen drainiert.

**Cholezystenterostomie.** Bei irreparabilem Verschluss des Ductus choledochus (eingekeilter Stein, obturierender Tumor, Kompression durch Lymphdrüsen) kann man der Galle durch Anlegung einer artifiziellen Kommunikation zwischen Gallenblase und Darm geeigneten Abfluss schaffen.

Man etabliert die Anastomose nach den für Enteroanastomose (pag. 349) angegebenen Regeln, wobei man sowohl die Naht, als ein kleines Modell des Murphy'schen Anastomosennknopfes zur Anwendung bringen kann.

Die Kommunikation wird angelegt zwischen Gallenblase und Jejunum (Cholezysto-jejunostomie) oder, wenn möglich, zwischen Gallenblase und Zwölffingerdarm (Cholezysto-duodenostomie). Auch eine künstliche Kommunikation des Darmes mit dem erweiterten Ductus choledochus zentral vom Hindernisse (Choledochoduodenostomie) ist empfohlen worden.

**Transduodenale Choledochotomie.** Bei Steinen, die in der Ampulla Vateri sitzen, oder bei Karzinomen an dieser Stelle ist die Eröffnung des Duodenums in vereinzelt Fällen vor-

genommen worden. Um an das Duodenum zu gelangen, ist es nötig, das Kolon transversum mit der Flexura coli hepatica nach abwärts zu schlagen. Vom blossliegenden Pylorus ausgehend, kann man bis an die Pars descendens duodeni gelangen. Dieses wird an seiner Vorderseite in seiner Längsachse in der Ausdehnung von 4—6 cm eingeschnitten. Wird die Wunde mit eingesetzten Haken aufgeklafft, so ist die Papille an der hinteren Wand sichtbar. Zur Entfernung eines Steines muss die Oeffnung erweitert werden. Die Wunde der vorderen Wand wird nach den Regeln für die Darmnaht in Etagen vernäht.

### **Exstirpation der Milz.**

Bei den Verletzungen des Organs, seltener bei Leukaemie und Lageveränderungen ausgeführt. Mediane Laparotomie, wenn die Milz sehr gross, Winkelschnitt, dessen horizontaler Schenkel vom Nabel nach links zieht. Nach Eröffnung des Bauchfells wird die Milz nach stumpfer Lösung eventueller Verwachsungen vorgezogen, der Stiel in eine Klemme gefasst und peripher von dieser durchschnitten. Um den Stiel wird eine Massenligatur geschlungen, am Querschnitt überdies noch die Art. und Vena lienalis isoliert unterbunden. Bei grossen Milzgeschwülsten wird man zweckmässig die Operation mit der Abklemmung und Durchschneidung des Stiels beginnen.

### **Omentopexie.**

Die nach Talma genannte Operation der Fixierung des Netzes an die Bauchwand wird bei Zirrhose der Leber ausgeführt, um durch die Bildung kollateraler Bahnen, Verbindungen der Netzvenen mit denen der Bauchwand, den Pfort-

aderkreislauf zu entlasten. Der Schnitt wird bei horizontaler Rückenlage median, 10—15 cm lang links am Nabel vorbeigeführt. Nach sorgfältiger Blutstillung in den Bauchdecken wird das Peritoneum eröffnet und die Aszitesflüssigkeit ablaufen gelassen. Das grosse Netz wird über die Därme gebreitet und im Bereiche des Schnittes fingerbreit vom Rande entfernt durch Nähte jederseits an das Peritoneum parietale geheftet. Darüber wird die Bauchdecke nach den Regeln in drei Etagen (Bauchfell, Muskulatur, Haut) vernäht.

## **Operationen am Mastdarm und Anus.**

### **Exstirpation des Mastdarms.**

Neubildungen, schwere Stenosierungen des Mastdarms geben die Veranlassung zur Exstirpation. Je nach dem Sitze und der Ausbreitung des zu entfernenden Teiles wird die Operation verschieden sein.

Umschriebene oder gestielte Geschwülste werden an der Basis umschnitten und abgetragen; Der Wunddefekt wird genäht. Um das Operationsterrain zugänglich zu machen, wird der Anus durch Seitenhebel oder Mastdarmspiegel zum Klaffen gebracht. Der höhere Sitz erfordert als Voroperation die lineare Durchtrennung des Sphinkter, die median, entsprechend der Raphe, vorne und hinten vorgenommen wird. Bei starker Distraction der Wundränder werden so die Teile über dem Sphinkter dem Messer zugänglich.

Umfasst die Neubildung einen grösseren Umfang des Mastdarms, so wird dieser entweder in toto jenseits des Kranken entfernt (Amputation) oder partiell ausgeschnitten, wobei der Sphinkter und die Analportion erhalten bleiben (Resektion).

Die Operationen am Mastdarm können auf perinealem, vaginalem, sakralem, endlich abdominellem Wege ausgeführt werden.

Die perinealen Operationen sind bei tiefem Sitze der Geschwulst angezeigt. Steinschnittlage. Der After wird durch eine Ringnaht verschlossen und oval umschnitten. Der Schnitt kann zur Erzielung grösserer Zugänglichkeit rückwärts über das Steissbein, vorne über die Raphe verlängert werden. Man löst den Mastdarm, wenn dessen Sphinkterportion passiert ist, vorne stumpf von der Harnröhre und der Prostata, rückwärts vom Kreuzbein. Sind die Schenkel des Levator rechts und links durchschnitten, so lässt sich der Mastdarm, wenn die Stränge, die ihn festhalten, Schritt für Schritt unterbunden und durchschnitten werden, genügend vorziehen. Ist der Mastdarm entsprechend frei, so wird die Wunde drainiert und um das vorgezogene Mastdarmrohr in den tieferen Anteilen vernäht. Jetzt erst wird die Amputation im Gesunden vorgenommen und der freie Rand des Darmes mit der Haut vereinigt. In analoger Weise kann die Operation bei der Frau vorgenommen werden. Vergrössert wird der Zugang, wenn man die mediane Spaltung der Scheide zu Hilfe nimmt.

Die Grenzen der Operabilität von Mastdarmgeschwülsten wurden erst entsprechend weiter, als man nach Kraskes Vorschlag den Mastdarm auf sakralem Wege, von der Kreuzbeinseite her, ausgiebig, auch in seinen höheren Anteilen blosszulegen vermochte. Wir sind in die Lage versetzt, auf diesem Wege den Mastdarm selbst bis in seinen intraperitonealen Teil genügend zu isolieren, und in allen Partien desselben Resektionen aus der Kontinuität, bei entsprechend übersichtlichem Operationsterrain auszuführen.

Man gelangt von der Kreuzbeinseite her nach Durchtrennung der Ligamenta tuberoso- und spino-sacra durch den breiten Spalt zwischen Kreuzbeinrand und den Inzisuren des Os ischii an den Mastdarm. Noch grösser wird die Zugänglichkeit, wenn man eine Partie des Kreuzbeinrandes abmeisselt.

### Ausführung der sakralen Blosslegung des Mastdarms (Hochenegg).

Linke Seitenlage; die Beine sind im Hüft- und Kniegelenk gebeugt. Der Operateur ist an der Rückenseite des Kranken postiert. Der Hautschnitt beginnt entsprechend der Mitte der linken Symphysis sacro-iliaca, zieht im Bogen, dessen Konvexität nach rechts gekehrt ist, über die Mittellinie und endet unter der Steissbeinspitze, oder umkreist, wenn auch die Analportion entfernt werden soll, elliptisch den After (Fig. 255).

Der Schnitt wird bis auf den Knochen vertieft; die Weichteile sollen, im Zusammenhange mit der Haut bleibend, vom Knochen abpräpariert werden, so dass die linke Kreuzbeinhälfte und das Steissbein in der Wunde vorliegen.

Nach der nun vorzunehmenden Eukleation des Steissbeins ist der Zugang zum Mastdarm bereits ein ziemlich freier, der an Ausbreitung noch gewinnt, wenn die sakralen Ansätze der Lig. tuberoso- und spino-sacra in der Wunde durchtrennt werden.

Das ausgebreitete Operationsterrain gestattet eine genaue Orientierung über die Ausdehnung und Grenzen der Geschwulst, auch an den höheren, durch die üblichen Methoden nicht zugänglichen Partien des Mastdarms.

Eine weitere Vergrößerung des Operations-  
terrains lässt sich erzielen durch die Abmeisse-  
lung des Kreuzbeins. Man nimmt das untere Ende




Fig. 255.  
Lagerung und Schnittführung zur sakralen Rektumexstirpation  
nach Hochenegg.

der linken Kreuzbeinhälfte in der Höhe des dritten  
Kreuzbeinloches fort oder trennt in dieser Höhe  
das Kreuzbein quer ab.

### Tab. 35. Blosslegung des Mastdarms auf sakrälem Wege.

Das Kreuzbein (S) ist quer abgemeisselt. Man übersieht die Ampulle (A) und oberen Anteile des Rektum. Das Bauchfell ist entsprechend seinem Ansatz am Rektum durchtrennt, so dass die angrenzenden intraperitoneal gelegenen Partien der Flexur (T) sichtbar gemacht sind.


Nach der Blosslegung des Mastdarms erfolgt der zweite Akt der Operation, die Isolierung des Tumors bis über seine Grenzen. Man löst den Mastdarmstumpf aus seiner Umgebung und unterbindet die sichtbaren Gefässe in der Wunde. Wird die hohe Amputation des Mastdarms ausgeführt, so wird der Stumpf des Darmes herabgeholt und im oberen Winkel der Wunde an die Haut geheftet (Anus praeternaturalis sacralis). Dieses Verfahren ist angezeigt, wenn die Analportion mitergriffen ist und im Zusammenhange mit der Geschwulst exstirpiert wurde.

Ist die Analportion gesund, sitzt der Tumor im Mittelstücke des Mastdarms, so wird das Rektum im Bereiche desselben nach beiden Richtungen bis über die Grenze des Erkrankten stumpf isoliert, abgebunden und durch Resektion entfernt.

Die beiden Stümpfe des Darmes werden entweder primär im ganzen Umfange vereinigt oder bloss partiell vernäht, so dass es zur Bildung eines provisorischen Anus artificialis kommt. Dieser stellt eine wandständige Fistel dar und kann entweder spontan zur Schliessung kommen oder nach einiger Zeit plastisch geschlossen werden. Zur Anlegung der Naht müssen die beiden Stümpfe ohne jede Spannung aneinander gebracht werden.

Eine andere Methode (Hochenegg) besteht darin, dass der zentrale Stumpf durch die







ihrer Schleimhaut entblösste oder auswärts gestülpte Analportion hindurchgeführt und in dieser invaginierten Lage am After durch Nähte fixiert wird.

Bei der Isolierung hochsitzender Tumoren wird es gewöhnlich nötig, das Peritoneum der Excavatio vesico rectalis zu eröffnen (Tab. 35). Der zentrale Stumpf des Mastdarms wird zur Anlegung des Anus artificialis oder der Darmnaht in die Wunde verzogen und die vordere Lefze der Peritonealwunde in entsprechender Höhe an die Serosa des Darmes geheftet, so dass die Bauchhöhle gegen die Wunde abgeschlossen erscheint.

Nach Anlegung der zirkulären Darmnaht wird ein starkes Drain durch den Anus in den Mastdarm bis über die Nahtlinie geführt.

Die Kreuzbeinresektion wurde von verschiedenen Autoren (Heineke, Gussenbauer u. a.) osteoplastisch ausgeführt. Von einem hinteren medianen Schnitte aus wird das Kreuzbein (Heineke) vom linken Rande schräg nach aufwärts in der Höhe des vierten Sakralloches durchtrennt. Gussenbauer durchsägt das Kreuzbein oben in querer Richtung und der Länge nach; die beiden Weichteilknochenlappen werden aufgeklappt und nach Vollendung der Operation wieder vereinigt.

Die abdominelle Operation, die mit der perinealen kombiniert wird, ist folgende: Beckenhochlagerung. Schnitt in der Medianlinie infraumbilikal. An der Amputationsstelle wird die Flexur zwischen zwei Ligaturen durchtrennt und der zentrale Stumpf als Anus praeternaturalis durch einen Schlitz der Bauchwand gezogen und hier fixiert. Das zentrale Ende wird unter sukzessiver Abbindung des Mesenteriums nach unten verfolgt und stumpf vom Promontorium nach

abwärts aus seiner Umgebung gelöst. Ist man bei dieser Lösung bis an den Beckenboden gelangt, so wird der Stumpf ins Becken versenkt und die Beckenwunde tunlichst mit Bauchfell übernäht. Der Kranke wird nun in Steinschnittlage gebracht und der Anus nach den für die perineale Amputation gegebenen Regeln ausgelöst und in Zusammenhang mit der Flexur durch die Wunde entfernt.

### **Operation der Mastdarmfistel.**

Die Mastdarmfistel wird zur Heilung gebracht, wenn durch Spaltung des Kanals, das röhrenförmige Geschwür in eine offene Wunde umgewandelt erscheint. Zur Operation der kompletten Fistel wird eine dünne Knopfsonde durch die äussere Fistelöffnung eingeführt und, während der Zeigefinger der linken Hand die innere Mündung, die an der Schleimhaut oft als Substanzverlust palpabel ist, tuschiert, durch diese in die Lichtung des Mastdarms geleitet.

Neben der Knopfsonde dringt eine Hohlsonde durch die Fistel mit Leichtigkeit in den Mastdarm und wird mit ihrem Ende zum Anus herausgeleitet.

Die Weichteile, welche die Fistel decken, liegen auf diese Weise der Sonde auf und werden mit dem Messer durchtrennt (Fig. 256).

Durch eingesetzte Wundhaken kann, nach der ausgeführten Spaltung, im Grunde der Wunde die ganze Auskleidung des Fistelganges sichtbar gemacht werden. In der Regel überlässt man die Wunde der Heilung per granulationem, doch kann nach Exstirpation des ganzen Fistelganges die Wunde durch die Naht völlig verschlossen werden.

Inkomplette Fisteln müssen zur Spaltung in komplette umgewandelt werden.

Bei inkompletter äusserer Fistel wird die Hohlsonde durch diese eingeführt und an der tiefsten Stelle der Fistel durch die Mastdarmwand gestossen.



Fig. 256.

Spaltung der Mastdarmfistel.

Die Spaltung der komplett gemachten Fistel erfolgt nach den früher angegebenen Regeln.

Durch die inkomplette innere Fistel, deren Mündung in der Mastdarmschleimhaut gelegen ist, wird die Sonde vom Mastdarm aus gegen

die Haut geführt; fühlt man den Sondenknopf unter der Haut, so wird auf diesen eingeschnitten und die komplett gemachten Fisteln nach den Regeln der Kunst gespalten.

Bei ausgedehnter Fistelbildung handelt es sich darum, den oft vielfach verzweigten Fistelgängen zu folgen und diese ausgiebig zu spalten.

### **Operation der Haemorrhoiden.**

Die Erweiterungen der äusseren Haemorrhoidalvenen bedürfen nicht der operativen Be-



Fig. 257.

**Abtragung von Haemorrhoiden durch elastische Ligatur.**

handlung... Die Operation ist nur in jenen Fällen, von Ektasien der inneren Mastdarmvenen mit




Fig. 258.

Kauterisation von Haemorrhoiden.

konsekutiven Veränderungen der Schleimhaut angezeigt, bei denen es zur Bildung eines Prolapsus

mucosae ani gekommen ist, der entweder nur bei gesteigerter Wirkung der Bauchpresse, oder habituell als solcher sich bemerkbar macht.

Die prolabierenden Schleimhautwülste werden entweder mit dem Ferrum candens zerstört, durch die elastische Ligatur zur Verödung gebracht, oder blutig exzidiert.

**Kauterisation.** Steinschnitt- oder Seitenlage; durch digitale Erweiterung des Anus lässt man die Knoten vortreten, fasst sie in Partien mit einer sperrbaren Zange und legt um die Basis des vorgezogenen Knotens die Langenbeck'sche Blattzange an. Der der breiten Elfenbeinplatte der Zange aufliegende Knoten wird nun mit dem Paquelinbrenner total verkohlt, und hierauf die Zange vorsichtig entfernt. In derselben Weise werden die Knoten in der ganzen Zirkumferenz des Afters zerstört (Fig. 258).

**Elastische Ligatur.** Seitenlage. Mit einer sperrbaren Polypenzange wird der vorgedrängte Schleimhautknoten entsprechend seiner Basis gefasst und vorgezogen. Die elastische Schnur wird hinter der Zange um den Hals des Knotens geschürzt, zusammengezogen und durch eine Seidenligatur fixiert (Fig. 257).

In dieser Weise wird der ganze Kranz von Falten in 3—4 Partien gefasst und abgebunden. Im Verlaufe einer Woche fallen die nekrosierten Knoten ab.

Die Exzision kann isoliert an jedem einzelnen Knoten vorgenommen werden; im anderen Falle wird die Haut am Anus zirkulär umschnitten, ebenso die Mastdarmschleimhaut oberhalb der Knoten; der Schleimhautzylinder mit den erweiterten Venen wird vom Sphinkter abpräpariert und der Rand der Schleimhaut mit der Haut des Anus durch die Naht vereinigt.



### **Operation der Atresia ani.**

Der Schnitt wird in der Raphe perinei, von der Steissbeinspitze bis an die Skrotalwurzel (hintere Kommissur) geführt.

Der Operateur geht schrittweise, stets in der Mitte bleibend, in die Tiefe vor. In der Regel stösst man alsbald auf den bläulich gefärbten Blindsack des Mastdarms. Derselbe wird in der Richtung des Hautschnittes eingeschnitten. Ist das Mekonium abgelaufen, so wird der Darm mit Nähten, die die ganze Dicke der Wand fassen, im ganzen Umfange an die Haut angeheftet.

Bei hoch oben endigendem Blindsack des Rektums müsste man versuchen, auf sakralem Wege denselben zu erreichen.

Bei Atresia ani vesicalis, vaginalis sucht man mit Hilfe desselben Schnittes das untere Ende des Darmes freizupräparieren. Die abnorme Kommunikation wird durchtrennt und der Mastdarm durch Nähte in der angegebenen Weise in der Wunde fixiert. Vorher muss der durch die Abtrennung des Mastdarms gesetzte Defekt der Scheide, der Blase ebenfalls durch die Naht verschlossen werden.

### **Operationen an den Harnorganen.**

#### **Katheterismus.**

Vom Orificium externum urethrae bis an die Blasenmündung besteht die männliche Harnröhre aus drei anatomisch und funktionell verschiedenen Teilen, der Pars penis, der P. membranacea und der P. prostatica. Die erstere ist vom Schwellkörper der Harnröhre umgeben, der

an seinem vorderen und hinteren Ende zwei Anschwellungen (Glans penis und Bulbus urethrae) trägt. Die P. membranacea, um welche ein Sphinkter von quergestreifter Muskulatur angeordnet ist, durchbohrt die unter dem Schambogen ausgespannte Muskelplatte des M. transversus perinei prof., so dass ihr zentraler Anteil.




Fig. 259.



Fig. 260.



Fig. 261.



Fig. 262.



Fig. 263.

- Fig. 259. Katheder coudé.  
 Fig. 260. Konisch-geknöpfter Katheter.  
 Fig. 261. Konisch-spitzer Katheter.  
 Fig. 262. Zylindrischer Katheter.  
 Fig. 263. Geknöpfte Sonde zur Exploration der Harnröhre und Blase.

sowie die P. prostat. urethrae den intrapelin gelegenen Anteil der Harnröhre darstellen.

Die P. membranacea kann als der fixeste Teil der Harnröhre bezeichnet werden; vor dem häutigen Teile ist die bewegliche P. pendula, hinter ihm die, allerdings in sehr engen Grenzen mobile Pars prostatica gelegen.

Der Anteil der Harnröhre vom Orificium ext. bis an den Sphinkter der P. membranacea wird als vordere, der von dieser Stelle zentralwärts gelegene Anteil als hintere Harnröhre bezeichnet, eine Einteilung, der namentlich klinische Wichtigkeit zukommt.

Der ganze fixe Teil der Harnröhre von der Blasenmündung bis an die Penisknickung bildet einen grossen, nach hinten konvexen Bogen.

Der Grund des Bogens entspricht der Durchtrittsstelle der P. membranacea durch das Diaphragma urogenitale.

264. Massive Sonde aus Stahl (Steinsonde) zur Blasenexploration.




Fig. 265. Metallkatheter.

Wir verstehen unter Katheterismus die kunstgerechte instrumentelle Entleerung des Blasen-Inhaltes auf dem Wege der Harnröhre.

Zur Verwendung kommen röhrenförmige Instrumente, die entweder aus weichem Material oder aus Metall bereitet und verschieden geformt sind. Die Wahl der Instrumente richtet sich nach dem speziellen Falle. Der Arzt, der den Katheterismus vorzunehmen hat, muss sich aus den Symptomen und aus den Ergebnissen der äusseren, der rektalen und der Untersuchung mittelst des Explorateurs (Fig. 263) eine Vorstellung vom Zustande der Harnröhre schaffen und diesem entsprechend die Wahl des geeigneten Instrumentes treffen. Die weichen Instrumente (aus vulkani-

siertem Kautschuk oder aus imprägnierten Seidengeflechten) werden in verschiedener Dicke angefertigt und sind entweder gerade oder zeigen an ihrem Ende eine leichte Knickung. Die ersteren sind dem vesikalen Ende entsprechend zylindrisch konisch oder geknöpft (Fig. 259—262).

Die an ihrem Ende mit einer Knickung versehenen Katheter (*Katheter coudé*) sind trotz




Fig. 266.

Methode der Einführung eines halbsteifen Katheters.

ihrer Weichheit geeignet, vermöge ihrer Form, gewisse (meist in der veränderten Beschaffenheit der Prostata gelegene) Hindernisse zu überwinden.


Die starren Instrumente aus Metall sind der Konfiguration der fixen Teile der Harnröhre entsprechend geformt. An ein gerades Wurzelstück schliesst sich im Bogen — der Krümmung der hinteren Urethra entsprechend — der Schnabel des Katheters an.

Bei Einführung eines weichen, schmiegsamen Instrumentes akkommodiert sich dasselbe der Form und dem Verlaufe der Harnröhre, und gleitet in die Blase.

Das starre Instrument ist nach der Harnröhre geformt, die Kongruenz kann nie eine vollkommene sein. Die zarte Führung des Instrumentes muss es zustande bringen, dass die notwendige Zerrung der fixen Teile der Harnröhre auf ein Minimum beschränkt werde.

### **Einführung weicher Katheter durch die Harnröhre in die Blase.**

Der Kranke liegt mit etwas erhöhtem Steisse



**Fig. 267.**

**Einführung eines starren Instrumentes in die Blase, der Katheterschnabel steckt im bulbösen Teile.**

auf dem Rücken. Der Operateur an der linken Seite des Kranken.

Man erfasst den Penis mit der linken Hand und erhebt denselben derart, dass die Pars pendula urethrae gestreckt erscheint. Der Katheter wird in die Urethra geleitet und unter sanftem Drucke vorgeschoben.




Fig 268.

Einführung eines starren Instrumentes in die Blase. Durch Senkung des Katheterschaftes ist der Schnabel in die Blase eingedrungen.

Der Katheter coudé wird derart geführt, dass sein Schnabel gegen die obere Wand der Harnröhre gerichtet ist.

Bei Passierung der Pars membranacea wird ein geringer Widerstand bemerkbar, der sich durch leichten Druck überwinden lässt; von da

an gleitet der Schnabel des Katheters ohne weitere Hindernisse in die Blase. Bei Hypertrophie der Prostata und Verlängerung des prostaticischen Teiles der Harnröhre müssen die Katheter entsprechend tiefer, oft bis ans Heft eingeführt werden, ehe Harn abläuft.

Hat das Ausfliessen des Harnes aufgehört, so kann man durch ein geringes Vorziehen des weichen Katheters den in der Blase angesammelten Rest von Harn ausfliessen sehen.

### **Einführung von starren Instrumenten in die Blase.**

Das Einführen starrer Instrumente ist ein ungleich schwierigerer Eingriff, und es bedarf einer gewissen Uebung, wenn er sachgemäss und schonend ausgeführt werden soll.

Im allgemeinen gilt die Regel, den Schnabel des Instrumentes längs der oberen Harnröhrenwand gleiten zu lassen. Bis an die Pars membranacea geht die Einführung — eine normale Harnröhre vorausgesetzt — stets glatt von statten, hier beim Uebergang der beweglichen Teile der Harnröhre in die fixe P. membr. stösst der Katheterschnabel auf ein Hindernis (Fig. 267); man muss es zu vermeiden wissen, sich hier mit dem Schnabel des Katheters in die Schleimhaut zu verfangen; der Schnabel des Katheters darf nicht aus der Medianebene weichen, und tastend sucht man mit demselben die P. membranacea zu entrieren, was selbstverständlich ohne jede Gewaltwirkung vor sich gehen muss. Am Nachlasse des Widerstandes merkt man, dass das Instrument in die P. membranacea eintritt und das Diaphragma urogenitale passiert.

Von diesem Punkte an findet der Katheter — bei normaler Harnröhre — kein weiteres Hindernis, und durch eine Senkung des Katheter-

griffes dringt der Schnabel ungehindert in die Blase (Fig. 268).

Zum Katheterismus dieser Art ist der Kranke mit etwas erhöhtem Becken horizontal auf den Rücken gelagert.

Der Operateur ist an der linken Seite des Kranken postiert; er erfasst den Penis mit drei Fingern der linken Hand; das Orificium wird durch entsprechende Haltung mit Daumen und Zeigefinger zum Klaffen gebracht.




Fig. 269. Ausgangsstellung bei der Bauchtour.

Der Katheter resp. die starre Sonde werden an ihrem distalen Ende mit den ersten drei Fingern der rechten Hand, die mit ihrer Fläche nach oben gerichtet ist, erfasst; die Hand ruht mit dem kleinen Finger der Mittellinie des Stammes auf (Fig. 269).

Der Operateur lässt den Schnabel des Instrumentes in die Urethra eindringen und zieht



den Penis, indem er ihn etwas anspannt, über die Krümmung des Katheters, der gleichzeitig, immer in der Medianlinie bleibend, bis zur Senkrechten erhoben wird.

Mit einem Ruck gelangt der Schnabel des Instrumentes in die Fovea bulbi, und es handelt sich darum, mit der Spitze die Pars membranacea



Fig. 270.

Der Katheter ist bis zur Senkrechten erhoben. Man sucht mit dem Schnabel in die P. membranacea einzudringen.

zu entrieren und das Diaphragma zu passieren. In allen Fällen fühlt man an dieser Stelle ein Hindernis, welches nur ganz sachte, wenn man das Gefühl hat, am richtigen Wege zu sein, durch leichten Druck überwunden wird, während die den Katheter führende Hand das Instrument,

stets median bleibend, aus der Senkrechten allmählich in der Richtung gegen die Beine in die Horizontale leitet (Fig. 270, 271).

Wenn das Instrument gleichzeitig etwas vorgeschoben wird, so dringt der Schnabel des Katheters in die Blase.




Fig 271.

Der Katheter ist in die P. membranacea eingedrungen, hat das Diaphragma urogen. passiert. Durch Senken des Griffes dringt der Schnabel in die Blase ein.

Aus dem Katheter fließt in diesem Augenblicke Harn aus. Die starre Sonde gestattet, sobald sie die Prostata passiert hat und in die Blase gedrungen ist, die Ausführung freier Exkursionen mit dem Schnabel. Die beschriebene Methode der Einführung des Katheters (*Tour sur le ventre*) stößt bei sehr fettleibigen Individuen, bei starkem Meteorismus, Aszites auf

Schwierigkeiten. Unter diesen Umständen erscheint es zweckmässig, dem Katheter eine Ausgangsstellung zu geben, in welcher er rechtwinkelig zur Körperachse an das Orifizium des senkrecht erhobenen Penis angesetzt wird. In dieser Haltung wird der Katheter vorgeschoben, gleichzeitig im Bogen gegen die Medianlinie geführt und in die Senkrechte erhoben, bis der



Fig. 272.

Ausgangsstellung bei der halben Meistertour.

Schnabel im Bulbus festsitzt (halbe Meistertour) (Fig. 272).

Bei der „ganzen Meistertour“ sitzt der Operateur vor dem in Steinschnittlage befindlichen Kranken. Der Katheter, der mit seinem Vesikalende gegen den Kranken sieht, wird derart an das Orificium urethrae angesetzt, dass er mit seiner Konvexität nach oben gerichtet ist.

Der senkrecht erhobene Penis wird über die Krümmung des Katheters gezogen und das Instrument in einem Bogen von  $180^{\circ}$  nach rechts bis in die Mittellinie geführt. Während der Ausführung dieses „Meisterwurfes“ dringt der Schnabel des Instrumentes in der Harnröhre bis in den Bulbus vor. Nun wird der Griff des Katheters erhoben und in der Medianebene nach vorne zu gesenkt, bis der Schnabel die hintere Harnröhre passiert hat und in die Blase eingedrungen ist.

Bei normaler Harnröhre überwindet ein Instrument von grösserem Gewichte — eine starre Sonde stärkeren Kalibers, der Lithotriptor — die jenseits des Bulbus gelegenen Hindernisse sehr leicht und gleitet, infolge der Eigenschwere sich senkend, ohne jede Führung in die Blase. Die führende Hand braucht da nur zu verhindern, dass das Instrument aus der Medianlinie weiche.

Bei Verengerungen dagegen ist oft ein Druck in der Richtung der Harnröhre nötig, um das Instrument in dem starren Narbengewebe vorwärts zu bringen.

Ist die Harnröhre in ihren tieferen Partien verengt, oder die Prostata vergrössert, so wird es oft nötig, den Zeigefinger der linken Hand zu Hilfe zu nehmen, um vom Rektum her das Instrument zu dirigieren.

Bei Hypertrophie der Prostata muss wegen Verlängerung des prostatistischen Teiles der Harnröhre und wegen Höherrückens der Blasenmündung der Katheter resp. die Sonde tiefer eingeführt und mehr gesenkt werden, damit der Schnabel bis in die Blase gelange.

Die Katheter für die weibliche Harnröhre entsprechen der Kürze und dem mehr gestreckten Verlaufe dieser, und sind gerade oder am Ende leicht gekrümmt.

Zur Einführung lässt man die Labien auseinanderhalten und führt das Instrument, indem man den Griff beim Vorschieben leicht senkt, in die Blase.

Nur in der Gravidität oder bei Geschwülsten der Genitalorgane kann die weibliche Harnröhre eine Verlängerung und Verzerrung erleiden. Diese Hindernisse sind bei Anwendung halbsteifer Katheter, wie sie beim Manne verwendet werden, stets leicht zu überwinden.

### **Verweilkatheter.**

Ein Katheter kann unter Umständen für Tage, selbst Wochen in der Harnröhre belassen werden. Um für die Dauer funktionieren zu können, muss derselbe in seiner Lage entsprechend fixiert sein.

Die Einlegung eines Verweilkatheters hat den Erfolg, dass der Harn permanent ablaufen kann; der Blasenmuskel wird ausser Funktion gesetzt, ferner kommt die Wand der Urethra ausser jeden Kontakt mit Harn.

Wir verwenden demgemäss den Verweilkatheter, wenn wir die Blase ruhigstellen, wenn wir den Harn permanent ableiten und endlich die Harnröhre ausschalten wollen.

Der mässige, aber konstante Druck des Verweilkatheters erweicht Narben der Harnröhre, übt bei zirkulären Strikturen eine dilatierende Wirkung aus und ist aus diesem Grunde bei kallösen und Narbenstrikturen der Harnröhre mit Vorteil zu verwenden.

Schliesslich ist der Verweilkatheter empfehlenswert, wenn der häufig zu wiederholende Katheterismus entweder mit Schwierigkeiten verbunden oder von unangenehmen Erscheinungen (Blutung, Harnfieber) gefolgt ist.

Zu Verweilkathetern verwenden wir in der Regel die weichen Katheter aus vulkanisiertem Kautschuk.

Der Katheter wird so tief eingeführt, dass der Harn ohne Unterbrechung aus demselben




Fig. 273. Befestigung des Verweilkatheters.

A, B, C, Form der Heftpflasterstreifen.

I, II, III. Art der Anlegung derselben an das Glied.

abläuft. Eine Insektennadel wird in dieser Stellung knapp vor dem Orifizium quer durch den Katheter geführt und die Spitze der Nadel abgekneipt. Heftpflasterstreifen werden in der Fig. 273 angegebenen Weise zugeschnitten.

Knapp auf die Glans wird der viereckige, gespaltene Streifen derart aufgeklebt, dass die Nadel diesem aufruht (Fig. 273 I).

Der in der Mitte gespaltene längere Streifen wird mit seinem Schlitz über den Katheter gezogen, kommt über die Nadel zu liegen und wird an den Seiten des Penis festgeklebt (Fig. 273 II).

Das System wird durch die zirkuläre Einwicklung des Gliedes von der Glans zur Basis, die mit dem Streifen (Fig. 273 C) vorgenommen wird, fixiert.

Man kann jeden Fixierungsapparat entbehren, wenn man die am vesikalen Ende mit einer Auftreibung versehenen Katheter von Pezzer (Fig. 274) einführt. Um in die Blase gebracht zu werden, wird der Katheter über einen Drahtmandrin ausgespannt (Fig. 275).

### **Punctio vesicae.**

Die Entleerung der Blase durch den suprasymphysären Stich wird vorgenommen als palliativer Eingriff und zum Zwecke der Anlegung einer Blasenbauchdeckenfistel. Die früher geübten Methoden des Blasenstiches durch das Perineum und durch den Mastdarm sind gegenwärtig nicht mehr gebräuchlich.

Palliativ wird die Blase punktiert bei kompletter Harnverhaltung als Folge einer impermeablen Harnröhrenstriktur, um einen günstigeren Zeitpunkt für die Sondierung der Harnröhre oder für die Radikaloperation der Verengung abzuwarten; zum Zwecke der Etablierung einer Blasenfistel:

1. bei Prostatikern mit kompletter oder inkompletter Harnverhaltung, wenn der Katheterismus mit Schwierigkeiten verbunden oder von Blutungen gefolgt ist; 2. bei Verlegung der

Blasenmündung durch einen Tumor, der operativ nicht zu beseitigen ist; 3. zur Drainage der Blase bei schwerer eitriger Zystitis.

Handelt es sich bloss um die Entleerung der Blase, so wird die Punktion mit einem dünnen sogen. Explorativ-Troikart vorgenommen. Derartige Punktionen stellen an sich einen unbedeutenden Eingriff dar und können, wenn nötig, öfter wiederholt werden.

Der Kranke liegt mit erhöhtem Steisse auf dem Rücken. Da die Punktion stets bei Ver-




Fig. 274. Katheter von Pezzer.




Fig. 275.

Derselbe, zur Einführung über einen Mandrin ausgespannt.

haltung des Harnes, also bei maximal gefüllter Blase vorgenommen wird, ist diese als Tumor, der die Symphyse überragt, palpabel.

Der Operateur steht zur Rechten des Kranken, markiert mit der Spitze des linken Zeigefingers den Punkt in der Mittellinie, knapp oberhalb der Symphyse, wo der Einstich erfolgen soll. Der Troikart wird senkrecht durch die Bauchdecken eingestossen. Am Schwinden des Widerstandes merkt man, dass die Spitze des Instrumentes in die Blase gedrungen ist. Man umfasst



mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand die Kanüle und entfernt mit der Rechten den Troikartstachel.

Ist der Harn abgelaufen, so entfernt man die Kanüle, während man mit der Fingerbeere des Daumens das Ende derselben verschlossen hält, damit kein Tropfen Harn in den Wundkanal komme.

Die Stichwunde heilt in allen Fällen anstandslos.

Soll im Anschlusse an die Punktion eine Blasenbauchdeckenfistel etabliert werden, so ist die Operation mit dem halbkreisförmig




Fig. 276.

Troikart zur Blasenpunktion nach Frère Côme.

gekrümmten Troikart von Frère Côme (Fig. 276) auszuführen.

Position des Kranken und Operators wie im vorigen Falle.

Der Zeigefinger der linken Hand markiert die Einstichstelle knapp oberhalb der Symphyse, genau in der Mittellinie (Fig. 277).

Das Instrument wird senkrecht aufgesetzt und mit kräftigem Rucke durch die Bauchdecke geführt. Fühlt man am Nachlasse des Widerstandes,

dass die Bauchdecke passiert ist, so wird beim Vorführen des Troikarts der Griff gehoben und auf diese Weise die Spitze des Instruments gegen den Fundus der Blase dirigiert.




Fig. 277.

Blasenpunktion. Position zur Ausführung des Einstiches.

Der Stachel wird entfernt (Fig. 278) und das Einsatzrohr durch die Kanüle eingeschoben.

Die Kanüle bleibt unverrückt etwa eine Woche lang liegen, nach welcher Zeit ein Nelatonkatheter durch die Fistel eingeführt und in der Wunde fixiert wird.

### Urethromia externa.

Wir bezeichnen als Urethrotomia externa die Eröffnung der Harnröhre durch Schnitt von der Hautdecke her.

Der äussere Harnröhrenschnitt wird vorge-




Fig. 278.

Blasenpunktion. Entfernung des Troikartstachels.

nommen: 1. bei Steinen und Fremdkörpern der Harnröhre, deren Entfernung auf dem Wege der Harnröhrenlichtung nicht gelingt; 2. bei Verletzungen der Harnröhre; 3. bei Strikturen der Harnröhre, die entweder impermeabel oder der Behandlung durch Dilata-

tion aus anderen Gründen nicht zugänglich sind;  
 4. zur Etablierung einer Harnröhrenfistel;  
 5. als einleitender Akt des medianen Steinschnittes.

Die Schleimhaut der Harnröhre ist im Bereiche der *Pars pendula penis* nach Durchtrennung der Haut, der derben *Fascia penis* und des Schwellkörpers leicht mit dem Messer zu erreichen.

Der *Bulbus urethrae* ist vom Mittelfleische aus, durch einen in der *Raphe perinealis* angelegten Schnitt, nach Durchtrennung der *Tunica dartos*, der *Fascia perinei superficialis* und des *M. bulbo-cavernosus* zugänglich. Die Schicht des Schwellkörpers ist an dieser Seite entsprechend mächtiger, sodass die Harnröhre erst in grösserer Tiefe eröffnet wird.

Zentralwärts vom *Bulbus* entfernt sich die Harnröhre immer mehr vom Hautniveau des Mittelfleisches und zieht im Bogen nach oben und hinten zur Blasenmündung.

Der Mastdarm liegt mit seiner vorderen Wand der Hinterfläche der Prostata innig an und ist an seiner perinealen Krümmung durch die interferierenden Fasern des *M. sphincter ani* und des *M. bulbocavernosus* indirekt an den *Bulbus urethrae* fixiert.

Will man an die *Pars membranacea* oder an den prostatistischen Teil gelangen, so muss die erwähnte muskuläre und fibröse Verbindung zwischen Anus und Harnröhrenzwiebel quer durchtrennt werden, worauf nach stumpfer Ablösung des Mastdarms, der sakralwärts verzogen wird, die zentralen Teile der Harnröhre, der *Pars membranacea*, die Prostata sichtbar und chirurgischen Eingriffen zugänglich werden.

Die Ausführung der Urethrotomie erleidet gewisse Modifikationen je nach der Indikation für den Eingriff.

Der Kranke liegt auf dem Rücken, die Beine sind im Knie und Hüftgelenke gebeugt (Steinschnittlage). Der Operateur sitzt vor dem Kranken.

Die Eröffnung der Harnröhre wird in allen Fällen in der Medianlinie, entsprechend der Raphe vorgenommen.

### **Urethrotomie bei eingeführter Leitsonde.**

Durch die Harnröhre wird eine an ihrer Konvexität gefurchte Metallsonde (Itinerarium) bis jenseits der verengten Stelle, die gespalten werden soll, eingeführt.

Das Itinerarium wird von einem Assistenten genau entsprechend der Medianebene fixiert gehalten. Soll der Einschnitt am Mittelfleisch erfolgen, so wird das Skrotum emporgehoben.

Der Operateur tastet die als resistenterere Stelle in der Harnröhre markierte, eventuell von einem Kallus umgebene Striktur und führt über derselben in der Mittellinie den Schnitt. Eine Verengerung in der Grenze zwischen Bulbus und P. membranacea urethrae angenommen, verläuft der Schnitt von der Skrotalwurzel bis nahe an den Anus; man gelangt, schichtweise präparierend, in der Medianlinie bis an die kallöse, verengte Stelle der Harnröhre, die in der Richtung des Hautschnittes geschlitzt wird, bis die Rinne des Itinerariums im Bereiche des Schnittes freigelegt ist.

Der Kallus wird ausgiebig bis in die Harnröhre von normaler Lichtung gespalten.

Die Einlegung eines Verweilkatheters beschliesst die Operation.

**Die Urethrotomie ohne Leitsonde** ist ein ungleich schwierigerer Eingriff als die eben beschriebene Methode.

Steinschnittlage.

Die Leitsonde lässt sich bei Impermeabilität der Striktur nur bis an deren vordere Mündung einführen.

Der Hautschnitt wird, wie im vorigen Falle, entsprechend der Raphe perinei, in der Medianebene geführt.

Der peripher von der Verengung gelegene Teil der Harnröhre wird eröffnet und die Harnröhrenwunde durch eingesetzte kleine Wundhäkchen klaffend erhalten.

Es handelt sich nun darum, die Lichtung der Harnröhrenverengung zu erblicken und mit einer dünnen Knopfsonde zu entrieren.

Gelingt dies, so wird das Narbengewebe median, an der Unterseite bis auf die Sonde gespalten, und der Schnitt bis jenseits der Verengung in die Harnröhre geführt.

In der Regel stösst die Auffindung der Harnröhrenlichtung am distalen Ende der Striktur auf Schwierigkeiten; das Gewebe ist schwielig verändert, die Blutung aus den Schwellkörpern, aus dem Bulbus oft bedeutend, so dass es begreiflich ist, dass in dem kleinen Operationsterrain die enge Lichtung der Harnröhre sich der Betrachtung entzieht.

Ein planloses Einschneiden des Kallus ist nicht angezeigt. Durch manuelle Expression der Blase kann es unter Umständen gelingen, das Austreten einiger Tropfen Harn in die Wunde wahrzunehmen und auf diese Weise eine Orientierung über die Lage der Strikturmündung zu gewinnen.

Ist es auf diese Weise gelungen, unter Leitung des Auges in die Mündung der Striktur eine Knopfsonde einzuführen, so wird die Spaltung

des verengten Teiles der Harnröhre keine weiteren Schwierigkeiten bereiten.

Nach Spaltung der Striktur wird sich unter Nachhilfe von der Wunde her stets ein Katheter stärkeren Kalibers durch die ganze Harnröhre bis in die Blase einführen lassen.

Für den Fall, dass es nicht gelingen sollte, die Striktur von der Wunde aus zu spalten, erübrigt uns die retrograde Sondierung der Verengung, **Katheterismus posterior** genannt.

Die retrograde Sondierung kann vorgenommen werden:

1. Auf urethralem Wege, nach Blosslegung und Inzision des jenseits der Striktur gelegenen Harnröhrenanteils;

2. auf vesikalem Wege, von der Blase her, nach Eröffnung dieser, vermittelt des suprasymphysären Schnittes.

Im erstgenannten Verfahren werden die tieferen Anteile der Harnröhre (P. membranacea) durch Ablösung des untersten Mastdarmendes blossgelegt. Zu diesem Zwecke wird der perineale Längsschnitt entweder bis an den After verlängert, oder die Ablösung des Mastdarms mit Hilfe eines präcrektalen Bogenschnittes (pag. 448) vorgenommen.

Nach Durchtrennung der Haut wird die Verbindung zwischen dem M. sphincter ani und bulbo-cavernosus quer durchschnitten, und hierauf die vordere Mastdarmwand stumpf vom häutigen Teile abgelöst. Lässt man den Bulbus urethrae nach oben, den Mastdarm nach unten verziehen, so gelingt die Freipräparierung der P. membranacea im oberen Winkel der Wunde.

Die P. membranacea, als walzenförmiges Gebilde leicht palpabel, wird in ihrer Längsrichtung etwa 1 cm lang eingeschnitten, von welchem

Schlitz aus die verengte Stelle retrograd sondiert und gespalten werden kann.

Die retrograde Sondierung der Striktur kann auch von der Blase her, nach Eröffnung derselben durch den hohen Schnitt vorgenommen werden.

Beckenhochlagerung, typische Eröffnung der Blase oberhalb der Symphyse (pag. 432). Der Blasenspalz wird durch eingesetzte Haken klaffend erhalten, ein englischer Katheter dünnen Kalibers unter Leitung des Fingers durch den Blasenhalz in die Harnröhre eingeführt und bis an das Hindernis vorgeschoben.

Steinschnittlage; die perineale Wunde wird durch eingesetzte Haken eröffnet und die Striktur durch Vorschieben des Katheters von der Blase her passiert oder bloss entriert.

Im ersteren Falle wird die Striktur bis auf den Katheter gespalten, im zweiten Falle der jenseits der Striktur gelegene Anteil der Harnröhre eröffnet und die Striktur sukzessive mit der Schere retrograd gespalten. Das letztere gelingt in der Regel ohne Mühe.

Es erscheint vorteilhaft, bei impermeabler Verengung in den tieferen Teilen der Harnröhre die Urethrotomie externa in folgender Weise vorzunehmen: Praerektaler Bogenschnitt, an dessen Mitte ein Längsschnitt in der Raphe perinei angefügt wird. Blosslegung der Pars membranacea durch Ablösung des Mastdarms. Die Harnröhre wird zunächst jenseits der Verengung eröffnet, und von da aus retrograd die Striktur, deren vorderes Ende durch eine eingeführte Sonde markiert ist, gespalten. Ein dicker Katheter wird zunächst in die Blase geführt, mit Hilfe einer durch das Orificium ext. urethrae bis in die Wunde geführten Bougie wird das äussere Ende des Katheters retrograd von der Wunde aus in die vordere Harnröhre geleitet.



Die Operation der impermeablen Striktur der tieferen Harnröhre ist so wesentlich vereinfacht und in einen typischen Eingriff umgewandelt.

Die **Urethrotomie bei traumatischer** kompletter oder inkompletter **Ruptur der Harnröhre** ist dann am Platze, wenn der Katheterismus grosse Schwierigkeiten darbietet, oder wenn Urininfiltration droht.

Die Operation wird derart vorgenommen, dass der Schnitt am Mittelfleische, entsprechend der Raphe perinci, über der grössten Vorwölbung der stets vorhandenen perinealen Anschwellung geführt wird.

Nach Durchtrennung der Haut und oberflächlichen Faszie gelangt man in die mit Blutgerinnseln erfüllte Wundhöhle.

Die Wunde wird in allen Teilen sorgfältig durchforscht, der periphere Stumpf ist stets leicht auffindbar, das zentrale Ende der Harnröhre häufig retrahiert, oft genug aber frei in der Wunde sichtbar.

Wegen Quetschung der Harnröhrenenden wird die primäre Naht nur selten Anwendung finden.

Ein weicher Katheter wird durch das Orificium bis in die Wunde, durch den zentralen Stumpf in die Blase geführt und befestigt. Tamponade der Wundhöhle.


Der einfachste Fall von Urethrotomie ist derjenige, in welchem ein Stein oder Fremdkörper der Harnröhre durch Schnitt von aussen her entbunden werden soll.

Der Einschnitt erfolgt an der Unterseite der Harnröhre direkt auf den palpablen Fremdkörper. Die Schleimhaut wird linear eröffnet, der Stein extrahiert und die Wunde der Harnröhre durch die Naht verschlossen. In einer zweiten Etage

erfolgt die Vereinigung der Faszie und Haut.  
Verweilkatheter.

### **Urethrotomia interna.**

Die innere Urethrotomie, die Einkerbung resp.



**Fig. 279.**

### **Urethrotomia interna.**

Die Leitsonde ist eingeführt; in der Rinne derselben wird das  
Messer mit der rechten Hand vorgeschoben.

Spaltung einer Striktur von der Lichtung der  
Harnröhre aus ist angezeigt:

1. bei schrumpfenden Strikturen;
2. bei Verengerungen mit konsekutiven Erkrankungen der Harnwege, wenn die Dilatation jedesmal von Fieber, Exazerbation einer bestehenden Zystitis etc. gefolgt ist;

3. bei kompletter Harnverhaltung, überhaupt in allen Fällen von Striktur, wo es sich um die rasche Wiederherstellung einer weiten Harnröhrenlichtung handelt.

#### Ausführung der inneren Urethrotomie.

1. Einführung der filiformen Bougie, an deren Ende die starre, mit einer Rinne für das Messer versehene Sonde angeschraubt wird. (Fig. 280a).

2. Die kanellierte Sonde wird nach den Regeln für den Katheterismus mit starren Instrumenten durch die Striktur bis in die Blase eingeführt. (Maisonnewes Catheterisme à la suite).

4. In den Kanal der Leitsonde wird die Klinge des Urethrotoms (Fig. 280b) eingeführt und bis an die Striktur vorgeschoben (Fig. 279); durch Druck auf das Ende der Klinge schneidet diese die Striktur, der oberen Wand der Harnröhre entsprechend, durch.

4. Ist die Klinge entfernt, so wird die Leitsonde so weit aus der





Fig. 280. Maisonnewesches Urethrotom.

a. Leitsonde, mit der filiformen Bougie armiert; das Messer (b) ist in der Rinne der Leitsonde vorgeschoben.



**Fig. 281. Urethrotomia interna.**

**Einführung des Katheters über dem Konduktor nach erfolgter  
Spaltung der Verengung.**

Harnröhre gezogen, dass sie abgeschraubt werden kann; an ihrer Stelle wird der filiformen Bougie ein gerader Konduktor angesetzt, über den ein Katheter eingeschoben wird (Fig. 281); ist dieser in die Blase eingedrungen, so entfernt man den Konduktor und die filiforme Bougie. Der Katheter wird fixiert und bleibt liegen.

### **Der laterale Steinschnitt (Sectio lateralis).**

Der Kranke befindet sich in Steinschnittlage. Der Operateur sitzt vor dem Kranken.

Ein konvex gefurchtes Itinerarium wird durch die Harnröhre eingeführt und von einem Assistenten vertikal erhoben, mit nach links gerichteter Rinne unverrückt festgehalten.

Der Schnitt zieht von der Mitte der Raphe perinei zum Mittelpunkt einer Linie, die den Anus mit dem linken Sitzhöcker verbindet. Man präpariert direkt in die Tiefe und orientiert sich beim Vorgehen stets über die Lage der Rinne des Itinerariums; sind die tieferen Schichten des Mittelfleisches (Fascia perinei superf. und prof., Musc. transversus perinei superfic.) passiert und die Harnröhre seitlich eröffnet (der Bulbus bleibt geschont), so liegt in der Wunde die blanke Rinne des Leitinstrumentes frei vor.

Der Operateur ergreift das Itinerarium mit der Linken, führt ein geknöpftes Messer mit nach abwärts gerichteter Schneide in die Wunde derart ein, dass es mit dem Rücken dem Itinerar direkt anliegt. Während der Griff des Itinerariums gegen den Operierenden zu gesenkt wird, spaltet der Operateur mit dem Knopfmesser (Lithotom), welches er in der Richtung der Harnröhre vorschiebt, die Pars membranacea bis in den prostaticischen Teil. In diesem Augenblick strömt der Inhalt der Blase neben dem Itinerarium in die Wunde.

Der Wundkanal wird instrumentell oder mit dem Finger, den man in die Blase eindringen lässt, erweitert, und die Extraktion der Konkremeute mit Steinzange oder Steinlöffel vorgenommen.

Zur Nachbehandlung Verweilkatheter. Tamponade der Wunde.

### **Der mediane Steinschnitt. (Sectio mediana.)**

Die Anordnung zur Operation wie im vorigen Falle; das Itinerarium wird genau median mit nach vorne gerichteter Rinne fixiert gehalten.

Der Hautschnitt verläuft in der Raphe perinei, beginnt knapp hinter dem Skrotalansatz, und wird etwa 5—6 cm lang gegen den After geführt. Man schneidet senkrecht in die Tiefe und sucht mit Vermeidung des Bulbus den häutigen Teil der Harnröhre zu treffen. Die Harnröhre wird median eröffnet und der Schnitt wie im vorigen Falle mit dem Knopfmesser bis in den prostatichen Teil verlängert. Entfernung des Steines in typischer Weise.

Der Lateral- und Medianschnitt, ehemals die souveränen Methoden des Steinschnittes, haben heute eine äusserst beschränkte Anwendung und sind durch den hohen Blasenschnitt fast vollständig verdrängt.

Der Medianschnitt, die jüngere der beiden Methoden, wurde gewählt, um die beim Lateralschnitt wiederholt beobachteten Durchtrennungen des Ductus ejaculatorii zu vermeiden. Die Methoden haben das üble, dass die Entwicklung grösserer Konkremeute durch den engen Wundkanal mit Schwierigkeiten verknüpft ist, dass die Wunde bei den Extraktions- und Dehnungsversuchen gezerzt wird und einreisst, so dass die Bedingungen für die Heilung nicht günstig sind. Endlich beobachtet man nicht selten nach ausgeführtem Median- oder

Lateralschnitt, auch wenn die Heilung glatt vor sich gegangen war, eine typische Form wahrer Inkontinenz, das permanente Harnträufeln.

### **Urethrostomie.**

Bei unheilbaren Strikturen schaltet Poncet die verengte Harnröhre durch die perineale Urethrostomie vollkommen aus, indem er die jenseits der Verengung durchtrennte Harnröhre am Mittelfleische ausmünden lässt.

Die Striktur wird mit dem typischen Schnitt in der Raphe perinei blossgelegt, worauf die Harnröhre jenseits der Verengung quer abgetrennt und in den unteren Winkel der Hautwunde eingenäht wird. P. spaltet den zentralen Stumpf, ehe er ihn in die Wunde einnäht, in geringer Ausdehnung an der Unterseite.

Der periphere Harnröhrenstumpf wird vernäht und in die Wunde versenkt, worauf die Hautwunde bis an die Fistelmündung durch Naht verschlossen wird.

### **Litholapaxie.**

Die instrumentelle, endovesikalausgeführte Zermalmung von Blasensteinen, an welche wir unmittelbar die Ausräumung der Steinfragmente anschliessen, wird als Litholapaxie bezeichnet. Die Zertrümmerung ist die Operation der Wahl bei den Steinen der Blase; sie hat die freie Passierbarkeit der Harnröhre und die freie Beweglichkeit der Steine in der Blase zur Voraussetzung.

Das Instrument zur Steinertrümmerung ist aus Stahl gefertigt, katheterförmig und besteht aus zwei ineinander gepassten Branschen, von denen die eine dem Schnabel entsprechend gezähnt ist (Fig. 282, 286).




Fig. 282.  
Instrument  
zur Zer-  
trümmerung  
des Steines.

Das Instrument fasst den Stein zwischen die Branschen, die festgestellt werden können; durch Schraubenwirkung wird der erfasste Stein zwischen den Branschen zermalm.

Zur Erzielung guter Resultate mit der Operation der Litholapaxie bedarf es einer sorgsamten Auswahl der Fälle, sowie der Meisterschaft in der Führung der Instrumente.

**Ausführung:** Rückenlage mit erhöhtem Steiss. Die Blase mässig mit sterilisierter Borsäurelösung gefüllt.

Der Lithotrib wird nach den Regeln für den Katheterismus eingeführt (Fig. 283).

Der Operateur steht an der rechten Seite des Kranken.

Man sucht mit dem Schnabel des geschlossenen Instrumentes auf den Stein zu stossen, öffnet die Branschen und fasst den Stein. Durch eine Schiebervorrichtung am Griffe des Instrumentes werden die Branschen des Instrumentes festgestellt und der Stein durch Schraubenwirkung zerdrückt (Fig. 284).

Nun werden die einzelnen Fragmente des zersprengten Steines gesondert erfasst und zerdrückt; endlich sucht man den vorhandenen Schutt noch durch Zermalmung in Staub zu verwandeln.

Einführung des starren Evakuationskatheters und Ausspülung der Blase, wobei bereits Sand abläuft. Bei mässig voller Blase wird dem Evakuationskatheter die Pumpe (Fig. 287) angesetzt. Ein sanfter Druck auf den



Ballon der Pumpe spült die Trümmer aus der Blase, die in den Rezipienten fallen (Fig. 285). Man wiederholt die Manöver der Spülung so lange, als Schutt in der Blase vorhanden ist. Hört und fühlt man beim Spiel der Pumpe noch




Fig. 283. Litholapaxie I.

Einführung des Instrumentes zur Zertrümmerung.

das Anschlagen grösserer Fragmente, so müssen diese abermals zertrümmert werden.

Bei entsprechender Uebung kann man den Zeitpunkt genau bestimmen, bei dem die Pumpe leer geht, die Blase tatsächlich keine Fragmente mehr enthält. Das Kystoskop gestattet überdies, die erzielte vollkommene Evakuierung der Stein-

trümmer durch den Augenschein zu bestätigen.  
An Sicherheit des Erfolges steht die Litholapaxie



**Fig. 284. Litholapaxie II.**

Der Stein ist gefasst, die Schraube mit dem Daumen der linken Hand festgestellt. Durch Drehung am Griffe erfolgt die Zertrümmerung.

den blutigen Methoden der Steinoperationen nicht nach.



Fig. 285. Litholapaxie III.  
Auspumpen der Steinrümmer.

### **Operationen an der Harnblase.**

Die Harnblase, im kleinen Becken knapp hinter der vorderen Wand desselben gelagert, ist durch die Prostata und durch die Ligamenta pubo-vesicalia an den Schambogen geheftet. Ausserdem wird die Blase durch das viszerale Blatt der Beckenfaszie (F. endopelvina), durch die Ligta. vesico-umbilicalia und durch das Bauchfell innerhalb gewisser Grenzen in ihrer Lage festgehalten.

Das Bauchfell zieht von der vorderen Bauchwand, von den Seitenwänden des Beckens an die Blase, deren Scheitel, hintere und seitliche Wand es überzieht.

In leerem Zustande ist die Blase hinter der Symphyse verborgen; bei stärkerer Füllung rückt der obere Teil über den Beckenrand empor, so dass die vordere, mit Bauchfell nicht überzogene Wand der Blase unmittelbar an die Bauchwand zu liegen kommt.

Ohne das Bauchfell zu verletzen, kann man demnach die Blase bei maximaler Füllung oberhalb der Symphyse eröffnen.




Fig. 286. Schnabel des Lithotrib in natürlicher Grösse.  
Englisches Gebiss.

### Sectio alta.

Eröffnung der Blase an ihrer vorderen Wand, oberhalb der Symphyse.

Die Operation ist angezeigt: bei Steinen und Fremdkörpern der Blase, bei Tumoren der Blase, bei vesikaler Haematurie, bei Rupturen der Blase, zur Entfernung der hypertrophischen Prostata, zum Zwecke von Fistelanlegungen, bei schweren Formen der Zystitis, als Voroperation zur Ausführung des Katheterismus posterior.

Je nach der Indikation für die Vornahme des hohen Blasenschnittes erleidet die Ausführung der Operation gewisse Modifikationen. Wir unterscheiden drei Typen der Ausführung:

1. die einfache Eröffnung der Blase zur Entfernung von Steinen und Fremdkörpern;

2. die Eröffnung der Blase zum Zwecke der Ausführung endovesikaler Eingriffe. (Exstirpation von Tumoren etc.)

3. die Eröffnung der Blase zum Zwecke der Etablierung einer Fistel.

In allen Fällen wird die Blase durch eingespritzte Flüssigkeit ausgedehnt, so dass sie die Symphyse überragt.

Ist eine Füllung der Blase nicht möglich, so wird die vordere Blasenwand durch ein eingeführtes, konkav gefurchtes Itinerarium in die Wunde gedrängt und eingeschnitten.




Fig. 287. Bigelow'sche Pumpe. a Schnabel des Evakuationskatheters.

## I. Hoher Steinschnitt.

Die Epizystotomie ist angezeigt bei Steinen von besonderer Grösse, ferner bei Steinen in Di-

vertikeln, im tiefen Fundus hinter der emporragenden Prostata, Ureterblasensteinen und angewachsenen Steinen, endlich bei Kombination von Stein und Neubildungen der Blase.

Der Patient befindet sich in Rückenlage. Das Becken ist durch ein unterlegtes Kissen etwas erhöht.

Der Operateur ist an der rechten Seite des Kranken postiert. Es wird, nachdem die Bauch-




Fig. 288. Hoher Blasenschnitt.

Die vordere Blasenwand ist blossgelegt; nahe dem Scheitel die Umschlagstelle des Bauchfells.

decke gereinigt und rasiert ist, ein Katheter eingeführt, und die Blase so lange gewaschen, bis das Spülwasser klar abläuft. Man lässt nun in die Blase durch einen Irrigator sterile Flüssigkeit einfließen oder spritzt eine solche Menge derselben ein, dass die Blase als Resistenz über der Symphyse tastbar wird. Der Katheter wird entfernt und der Penis mit einem Streifen Gaze umschnürt.

Der Schnitt wird in der Linea alba, knapp oberhalb der Symphyse 5—7 cm lang geführt. Man passiert, direkt in die Tiefe vordringend, den Pannikulus, spaltet die vordere Rektusscheide resp. die fibröse Linea alba. Die Musculi recti werden abgezogen, und es liegt der sogenannte Retzi'sche Raum vor, in welchem die Blase als derbe Masse palpabel ist.




Fig. 289.

Blosslegung der Blase mit einem queren Schnitt.

Die Musculi recti sind durchtrennt; man sieht die durch Muskelfasern und Venen kenntliche Harnblase. Darüber die Umschlagstelle des Bauchfells.

Das praevesikale Fett wird stumpf mit zwei Pinzetten von der Blase abgestreift, bis die vordere Wand derselben, durch die differente Farbe, durch die an ihrer Oberfläche verlaufenden Muskelbündel und Venen kenntlich, freiliegt (Fig. 288).

Gerade unterhalb der quer verlaufenden Umschlagstelle des Bauchfells wird ein spitzer einfacher Haken durch die Blasenwand gestossen und diese der Medianebene entsprechend mit

dem spitzen Messer in der Richtung gegen die Symphyse gespalten. Zwei spatelförmige Haken erhalten die Blasenwunde klaffend.

Der Operateur geht mit dem Zeigefinger der linken Hand in die Blase ein, berührt den Stein oder Fremdkörper und lässt an der Beugeseite des Fingers den Schnabel der Steinzange bis an den Stein gleiten; er öffnet die Zange, fasst den Stein und hebt ihn aus der Wunde.

Die Blasenwunde kann primär durch die Naht verschlossen werden.

Verschiedene komplizierte Nahtmethoden der Blase sind heute verlassen. Wir schliessen die Blasenwunde durch eine oder zwei Reihen von Katgutknopfnähten, welche die ganze Dicke der Blasenwand mit Ausschluss der Schleimhaut fassen.

Die Fixierung der genähten Blase an die Bauchwand (Zystopexie) ist nicht unzweckmässig. Wird auf die Blasennaht verzichtet, so bleibt die Blasenwunde offen. Der Harn wird durch die Heberdrainage (Dittels Knierohr, Guyons Tubesymphon u. a.) permanent abgeleitet, und die Blase auf diese Weise vollkommen ruhiggestellt.

## II. Hoher Blasenschnitt zur Ausführung intravesikaler Eingriffe.

Dient die Eröffnung der Blase als Voroperation für intravesikale Eingriffe, so operiert man zweckmässig bei maximaler Beckenhochlagerung. Die Vorbereitungen zur Operation und Eröffnung der Blase wie im vorigen Falle.

An Stelle des früher beschriebenen longitudinalen Schnittes kann, wenn ein besonders breiter Zugang zur Blase geschaffen werden soll, der quere Hautschnitt und die quere Eröffnung der



Blase in Anwendung kommen. In diesem Falle werden die Musculi recti in der Wunde quer durchtrennt (Fig. 289).

Doch gibt, z. B. für die Exstirpation von Tumoren aus der Blase, auch der gewöhnliche longitudinale Schnitt hinreichend Raum.

Nach Eröffnung der Blase soll der Einblick in das Kavum derselben ermöglicht werden. Zu diesem Zwecke wird die Blasenwunde durch zwei breite Spatel, ähnlich den vaginalen Seitenhebeln, auseinandergehalten. In den oberen Winkel der Blasenwunde wird ein breiter Simon'scher Spatel eingesetzt. Erleuchtet man noch das Innere der Blase durch ein eingeführtes Glühlämpchen, so ist eine Orientierung gut möglich, und der Operateur vermag Manipulationen im Innern der Blase (Exzision von Tumoren, Blutstillung, Naht von Defekten der Schleimhaut, Exkochleationen etc.) zu vollführen (Tab. 36).

Wenn nach ausgeführter Exstirpation vesikaler Tumoren die Blutung exakt gestillt ist, kann die Blase durch Naht geschlossen werden. Nach Exkochleation maligner Tumoren und Operationen an der Prostata ist die Drainage der Blase das empfehlenswertere Verfahren.

Bei Anlegung eines queren Hautschnittes und querer Eröffnung der Blase, nach Durchtrennung der Musculi recti, ergibt sich eine breite Zugänglichkeit des Blaseninneren.

Von verschiedenen Operateuren wurden Vorschläge gemacht, durch Operationen am Skelette die Blase in grösserem Umfange blosslegen zu können.

Helferich reseziert zu diesem Zwecke ein dreieckiges Stück aus der Symphyse, Bra-mann empfahl die temporäre partielle Resektion der Symphyse, Niehans die seitliche Resektion des Beckens.

**Tab. 36. Hoher Blasenschnitt in Beckenhochlagerung.**

Durch eingesetzte Spatel ist die Wunde eröffnet und das Innere der Blase sichtbar gemacht. Die Blasenwand ist mit der Haut provisorisch durch Naht vereinigt.

Man übersieht die Harnröhrenmündung, das Trigonum und die Mündungen der Ureteren.

Die Wand des Blasenscheitels ist in Form eines Wulstes über dem breiten Spatel sichtbar.

### III. Blasenschnitt zum Zwecke der Fistelanlegung. Zystostomie.


Zur Ausführung der Zystostomie wird nach Poncet ein kurzer Längsschnitt oberhalb der Symphyse angelegt und die Blase in typischer Weise eröffnet. Die beiden Lefzen der Blasenwunde werden in das Niveau der Haut gezogen und hier jederseits an den Hautrand mit einigen Nähten fixiert. Im oberen Anteil der Wunde vereinigt man die Hautwunde. Die Blasenschleimhaut wird in den unteren Teil der Wunde eingenäht.

Die Etablierung einer Fistel kann auch ohne Vornähung der Blasenschleimhaut, durch Anwendung der einfachen Heberdrainage erzielt werden. Das Knierohr wird im weiteren Verlaufe durch einen weichen Katheter ersetzt, der durch die Wunde in die Blase eingeführt und befestigt wird

### **Operation der Blasenektomie.**

Es ist nach verschiedenen Grundsätzen versucht worden, die Ektopie der Blase, die stets mit Symphysenspaltung und Epispadie vergesellschaftet ist, operativ zu behandeln.

Bei den Lappenplastiken wurden gestielte Hautlappen derart in den am Rande





angefrischten Defekt gefügt, dass die Epidermisflächen der Blase zugewendet war. In zweiter Schicht kommen die Lappen Wunde auf Wunde über die ersteren zu liegen. Das Material für die Lappen wurde den Leisten, dem Bauche oder dem Skrotum entnommen. Der Operation haftet der grosse Mangel an, dass selbst in gelungenen Fällen die Haut zur Auskleidung der Blase sich als unzweckmässig erwies. Die Blase funktionierte nicht als solche, es bestand Harnträufeln.

Trendelenburg suchte die natürlichen Verhältnisse wieder herzustellen. In einer Voroperation Durchtrennung beider Synchondrosen zwischen Darm- und Kreuzbein. Erst wenn nach monatelanger Lagerung in einem Apparate das Spaltbecken korrigiert war, wurde der Defekt angefrischt und median vereinigt.

Czerny löst die Blase von ihrer Unterlage, vereinigt sie durch Naht zu einem Hohlraum und deckt den Defekt durch zwei seitliche Brückenlappen.

Bei den Derivationsmethoden wird die blossliegende Blase durch Exstirpation ausgeschaltet und der Harnstrom durch Verlagerung der Ureteren an andere Stellen geleitet. Die vollkommenste dieser Methoden ist die Maydls, heute anerkanntermassen die Operation der Wahl bei Ektopie der Blase. Maydl umschneidet die Blase, löst sie von ihrer Unterlage, trennt sie von der Harnröhre, bis sie vollständig mobil, nur an beiden Harnleitern, die mit Sonden gesichert sind, hängt. Die Blasenwand wird bis auf denjenigen Teil, in den die Harnleiter münden, abgeschnitten. Eine Schlinge der Flexur wird vorgezogen und an ihrer Konvexität longitudinal eröffnet; in diesen Schlitz wird die Blase derart eingefügt, dass in einer Etage die Schleimhaut

der Blase mit der des Darmes, in einer zweiten die Blasenmuskularis mit Muskulo-serosa des Darmes vereinigt wird. Der Darm wird versenkt und die Bauchwand bis auf eine Drainlücke geschlossen. Die Operation gibt Kontinenz, der Harn wird in Intervallen per rectum entleert. In der Erhaltung der Sphinkterapparate der Ureteren ist ein wirksamer Schutz gegen die Infektion der Nieren gelegen.

Sonnenburg exstirpiert die Blase und lässt die Harnleiter in die Penisrinne münden.

### **Operationen an der Niere.**

Es kann sich bei den Operationen an der Niere handeln:

1. um die Eröffnung der Niere durch den Schnitt — Nephrotomie;
2. um die Entfernung des ganzen erkrankten Organes — Nephrektomie;
3. um die Fixierung der beweglichen Niere — Nephropexie;
4. um die Ausschneidung von Teilen der Niere — Nierenresektion.

### **Nephrotomie und Nephrektomie.**

Die Nephrotomie ist angezeigt: 1. bei Nierenabszess und einfachen Pyonephrosen, 2. bei Steinen des Nierenbeckens, wenn noch funktionsfähiges Parenchym vorhanden ist, 3. bei renaler Haematurie.

Die Nephrektomie ist angezeigt: 1. bei schweren Pyonephrosen, wenn die Niere in ein System von Eiterhöhlen umgewandelt ist (Kalkulose, Tuberkulose der Niere), 2. bei Verletzungen der Niere (Rupturen, Zertrümmer-

ungen des Organs), 3. bei Tumoren der Niere, 4. bei unheilbaren Nieren- oder Harnleiterfisteln, 5. bei Hydronephrosen.

Der Kranke ist zur Blosslegung der Niere




Fig. 290.  
Schnittführung und Lagerung zur Blosslegung der r. Niere.

auf die gesunde Seite über ein walzenförmiges Kissen gelagert (Fig. 290).

Stets wird der Zugang von der Lumbalgegend geschaffen. Simon operierte mit einem senk-

### Tab. 37. Nephrotomie.


Rechte hydronephrotische Niere mittelst des Lumbalschnittes blossgelegt und vor die Wunde gezogen. Man sieht die grossen Gefässe (A.) über die vordere Wand des erweiterten Nierenbeckens (P.) zum Hilus ziehen. Nach abwärts ist der Uebergang zum Ureter sichtbar. Die Niere ist von ihrem freien Rande her gespalten und das Nierenbecken auf diese Weise eröffnet. Im Hintergrunde der Wunde ist das Bauchfell (Pp.) sichtbar.

rechten Lumbalschnitt, von der 11. Rippe, entsprechend dem Aussenrande der M. sacrospinalis, bis zur Mitte zwischen 12. Rippe und Darmbeinkamm. Czerny, Kocher wählen den queren Lumbalschnitt unterhalb des Rippenbogens nach vorne bis zur Axillarlinie. Am meisten verwendet sind die schrägen Lumbalschnitte von Bergmann, König. Der erstere verläuft vom Ende der 12. Rippe schräg nach vorne und unten zur Grenze zwischen äusserem und mittlerem Drittel des Poupart'schen Bandes. Königs lumbaler Winkelschnitt beginnt im Winkel zwischen 12. Rippe und dem Wulste des Erector trunci, zieht senkrecht gegen die Krista ilei von da im Bogen gegen den Nabel, bis an den äusseren Rektusrand.

Man durchtrennt die Haut, das Fett, die Fascia lumbo-dorsalis, die Fasern des Latissimus dorsi, um nach Spaltung des tiefen Blattes der Faszie auch den Quadratus lumborum, im vorderen Teile der Wunde die dreifache Schicht der Bauchwandmuskeln zu spalten. Nachdem auch die Fascia transversa passiert ist, liegt die Fettkapsel der Niere in genügender Ausdehnung vor.

Die Fettkapsel wird gespalten und die Niere stumpf mit den Fingern aus ihrem Bette gelöst, bis das Organ mit Ausnahme des Hilus allenthalben frei, durch Zug in das Niveau der Wunde gebracht werden kann.







Die Niere wird zur Exploration des Nierenbeckens, zur Entfernung von Steinen aus dem Nierenbecken etc. von dem konvexen Rande her eröffnet (Tab. 37). Man führt, während der Hilus temporär abgeklemmt ist, an der Konvexität einen Schnitt durch das Nierenparenchym bis in das Nierenbecken, gross genug, um den Zeigefinger passieren zu lassen, und tastet mit dem eingeführten Finger das Nierenbecken ab. Wenn notwendig, kann dieser Schnitt nach den Polen erweitert werden, in dem höchsten Grade, bis die Niere in zwei Hälften aufgeklappt vorliegt (Sektionsschnitt).

Ist der Eingriff derart beschaffen, dass die Heilung p. p. vor sich gehen kann, so wird die Nierenwunde durch tiefe und oberflächliche Katgutknopfnähte geschlossen, die Niere versenkt und die Haut bis auf eine Drainöffnung ebenfalls vernäht.

Eine provisorische Naht der Nierenwunde wird zum Zwecke der Blutstillung auch dann vorzunehmen sein, wenn im unmittelbaren Anschluss an den Explorativschnitt die Entfernung der ganzen Niere projektiert ist.

Zur Exstirpation der Niere bedarf es nach Freilegung derselben der sorgfältigen Ligatur der grossen Gefässe am Nierenhilus. Wenn möglich, wird die Niere vorgezogen und am Hilus die Arterie und Vene isoliert. Ist dies nicht möglich, so umfasst der Operateur mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand den Hilus und legt unter Leitung der rechten Hand um den ganzen Stiel eine Klemmzange an. Der Stiel wird vor der Zange mit der Schere abgetrennt und jenseits der Klemmzange mit einer Massenligatur umschnürt. Am Querschnitte werden die grossen Gefässe überdies isoliert gefasst und unterbunden.




Die grosse Wundhöhle wird nach exakter

Blutstillung drainiert und die Wunde durch Etagennaht (Muskel, Faszie, Haut) geschlossen.

Zur operativen Fixierung der beweglichen Niere (Nephropexie, Nephrorraphie) wird diese in der üblichen Weise blossgelegt.

Die Nähte (10—12) zur Fixierung werden tief durch das Parenchym der Niere geführt und im oberen Winkel des Hautschnittes jederseits durch den Wundrand gelegt und geknüpft. Auf diese Weise wird die Niere entsprechend situiert und befestigt. Schonender erscheint nach Ruggi die Suspension der Niere; dabei werden die Nähte nicht durch das Parenchym geführt, sondern zwei Zügel aus der abgestreiften Kapsel gebildet, mit welchen das Organ an die 12. Rippe suspendiert wird.

Die geschilderte Methode der retroperitonealen Blosslegung der Niere gewährt in der Regel einen genügend breiten Zugang. Bei grossen, in der Umgebung adhaerenten Tumoren der Niere oder bei fettleibigen Individuen kann sich die Notwendigkeit herausstellen, zur Erzielung grösserer Zugänglichkeit, der Mitte des Lumbalschnittes einen gegen den Nabel ziehenden Querschnitt anzufügen.

Bardenhauer empfiehlt die sog. Türflügelschnitte. Dem senkrechten Längsschnitte, der vom Rippenbogen bis auf die Mitte der Crista ilei zieht, werden am oberen und unteren Ende Querschnitte angefügt, die längs der Rippe und der Crista ilei verlaufen. B. unterscheidet den vorderen , hinteren  und doppelseitigen  Türflügelschnitt.

Der genannten retroperitonealen, steht die transperitoneale Methode der Blosslegung der Niere gegenüber. Die Bauchhöhle

wird bei dieser typisch in der Linea alba eröffnet, das Peritoneum über der Niere gespalten und die Niere aus ihrem Bette ausgeschält. Die retroperitoneale Methode hat gegenüber dieser den Vorteil, dass sie im Anschluss an einen explorativen Eingriff sowohl die Etablierung einer Nierenfistel, die Drainage eines Abszesses der Niere unter günstigen Verhältnissen, wie die totale Entfernung des ganzen Organs gestattet.

### **Operationen an den Harnleitern.**

Der Harnleiter verläuft jederseits von der Niere im subserösen Raume dicht hinter dem Bauchfell zum Fundus der Blase. In seinem oberen Anteile lagert er auf dem M. psoas, kreuzt bei seinem Eintritt in das Becken die Teilungsstelle der Vasa iliaca comm. und tritt im kleinen Becken in der Richtung nach vorne und medialwärts an den Blasengrund heran.

Am häufigsten geben Verletzungen des Harnleiters bei Operationen den Anlass für Eingriffe dieser Art. Seltener sind Steineinklemmung im Harnleiter, Verlegung des unteren Harnleiterendes durch ein Neoplasma, Knickung des Ureters bei Hydro-nephrose die Veranlassung von Eingriffen.

Von Operationen wurden ausgeführt: die lineare Eröffnung des Ureter zur Entbindung eines Steines mit nachfolgender Naht des Schnittes (Ureterolithotomie), bei Stein ferner die Verschiebung desselben längs des Ureters bis in das Nierenbecken und endlich die digitale Zerreibung weicher Steine ohne Eröffnung des Ureters.

Bei Verletzungen des Ureters kann zur Heilung von Ureterfisteln die Wiederherstellung der Lichtung durch die Naht der Stümpfe oder die

Einpflanzung des zentralen Ureterstumpfes in eines der benachbarten Organe vorgenommen werden. Es wurde in diesem Sinne der Ureter eingepflanzt in den Darm (Uretero-enterostomie), in den Ureter der anderen Seite (Uretero-ureterostomie), und an neuer Stelle in die Blase (Uretero-neo-zystostomie).

Auch zur Heilung der Blasenektomie wurde die Einpflanzung der Ureteren in den Darm vorgenommen.

Die zirkuläre Vereinigung der quer durchtrennten oder abgeschrägten Harnleiterstümpfe hat den Nachteil, dass sie bei dem kleinen Querschnitt der Lichtung durch Schrumpfung der Narbe leicht eine Verengerung des Harnleiters setzt.

Aus diesem Grunde ist die Invaginationsnacht (van Hook) der zirkulären Vereinigung vorzuziehen. Das freie Ende des peripheren Stumpfes wird durch Ligatur verschlossen.  $\frac{1}{4}$  cm unter der Ligatur wird am (peripheren) Stumpfe ein Längsschlitz durch die Wanddicke angelegt.

Der zentrale Stumpf wird mit einem Katgutfaden angeseilt, der mit einer Nadel armierte Faden durch den Längsschnitt geführt und die Nadel durch die entgegengesetzte Wand des Stumpfes geführt. Durch leichten Zug am Faden wird der zentrale Harnleiterstumpf durch den Schlitz in den peripheren Teil gestülpt und durch das Knüpfen des Fadens in dieser Stelle fixiert. Einige wenige an der Aussenseite angelegte Nähte sichern den Kontakt der beiden Stümpfe (Fig. 291).

Bei den Harnleiterimplantationen wird nach B ü d i n g e r und W i t z e l die Bildung eines wandständigen Kanals, in dem der Ureter enthalten ist, die natürliche Art der Einnündung des Ureters am besten imitieren.

Der abgetrennte Harnleiter wird in derselben Weise, wie bei Witzels Gastrostomie das Kautschukrohr, in der Wand des zur Implantation erwählten Organs eingepflanzt und durch Naht fixiert.




Fig. 291. Invaginationsnaht der Harnleiterstümpfe.

Für die Blosslegung der oberen Anteile des Harnleiters wird der Lumbalschnitt wie zur Nephrektomie zweckmässig in Anwendung kommen.

Den pelvinen Anteil des Harnleiters kann man besser transperitoneal zugänglich machen. Unter Beckenhochlagerung wird die

Bauchhöhle mit einem von der Symphyse zum Nabel reichenden Schnitte eröffnet. Man sieht den Harnleiter, wo er die grossen Gefässe kreuzt, durch die Serosa schimmern, und kann nach Spaltung des Bauchfells der Beckenwand denselben freibekommen und tief ins Becken verfolgen.

Der unterste Ureteranteil, eine Praedilektionsstelle für eingekeilte Steine, kann beim Weibe vom Scheidengewölbe aus, beim Manne auf sakralem Wege (pag. 385), oder mit Hilfe eines praerektalen Lappenschnittes blossgelegt werden.

## **Operationen an den Geschlechtsorganen.**

### **Prostatotomie.**

Die Eröffnung der Prostata durch Schnitt ist angezeigt bei Abszessen der Prostata, bei gewissen chronischen Entzündungen und bei Tuberkulose der Prostata.

Wird am Mittelfleische die Peniswurzel und der Musc. transversus perinei superficialis blossgelegt und die Verbindung zwischen dem Musc. sphincter ani und M. bulbo-cavernosus quer durchtrennt, so kann die vordere Wand des Mastdarms stumpf von der Prostata abgelöst, sakralwärts verlagert werden. Zwischen dem Lig. triangulare urethrae und dem sakralwärtsverzogenen Mastdarm liegt in ganzer Ausdehnung die hintere leicht gewölbte Fläche der Prostata frei vor.

Die Ausführung der Prostatotomie bei Abszess der Prostata gestaltet sich folgend:

Steinschnittlage. In die Harnröhre wird ein englischer Katheter stärkeren Kalibers eingeführt.

Der Operateur sitzt vor dem Kranken und führt das Messer mit der Rechten, während er den Zeigefinger der linken Hand im Rektum



eingeführt hält, damit beim Vorgehen in die Tiefe eine Verletzung der vorderen Wand des Mastdarms vermieden werde (Fig. 292). Flachbogenförmiger, 4—5 cm in der Sehne messender Praerektaalschnitt. Nach Durchtrennung der Haut und des Unterhautfettgewebes wird das Septum perineale, die Verbindung zwischen M. sphincter ani und M. bulbo-cavernosus in querer Richtung scharf durchtrennt, worauf man, stumpf präparierend, zwischen Mastdarm und Harnröhre nach oben gegen die Prostata vordringt. Ist der untere Pol derselben, resp. ein Teil ihrer Hinterwand in der Wunde freigelegt, so wird in die fluktuierende Stelle der Prostata eine Hohlsonde oder Kornzange mit geschlossenen Branschen eingestossen, worauf der Eiter durch die Wunde abfließt. Die Oeffnung wird entsprechend erweitert und die Abszesshöhle austamponiert.

Besteht eine Kommunikation der Abszesshöhle mit der Harnröhre, so ist zur Nachbehandlung die Einlegung eines Verweilkatheters erforderlich.

### **Die Exstirpation der Samenbläschen.**

Zur Exstirpation der Samenbläschen erscheint der im vorigen Kapitel erwähnte perineale Weg als der zweckmässigste.

Lagerung des Kranken und Stellung des Operateurs wie im vorigen Falle.

Ein grösserer perinealer Lappenschnitt, dessen hintere Enden jederseits bis an die Tubera ischii reichen, und dessen vordere Begrenzung praerektal verläuft, wird angelegt.

Es wird zunächst in der früher angegebenen Weise die Prostata freigelegt. Bei weiterer stumpfer Ablösung des Mastdarmes erscheinen anschliessend an die Basis der Prostata die unteren Anteile der Samenbläschen. Durch fortgesetztes Ablösen des Mastdarmes von der Blase werden

**Tab. 38. Blosslegung der Prostata, der Samenbläschen etc. mittelst eines praerektalen Lappenschnittes nach O. Zuckerkandl.**

Nach oben zu ist die Wunde begrenzt vom Bulbus urethrae (B) mit dem M. bulbo-cavernosus, und von den Schwellkörpern des Gliedes mit dem M. ischio-cavernosus (lc). Zwischen Bulbus und Prostata ist ein Teil der Pars membranacea urethrae (Pm) sichtbar.

Die Ablösung des Mastdarms ist in maximalem Grade ausgeführt. Man übersieht die Prostata (P), die Samenbläschen (V. s.), die extraperitoneal gelegene hintere Blasenwand (B), endlich in der Tiefe der Wunde die Umschlagstelle des Bauchfells (Bf) von der Blase auf den Mastdarm (R).


die Samenbläschen und die Endstücke der Vasa deferentia völlig frei; desgleichen der vom Bauchfell freie Fundusanteil der Blase. Endlich kann die Umschlagstelle der Douglas'schen Falte in der Wunde sichtbar gemacht werden (Tab. 38).

Die veränderten Samenbläschen werden aus ihrer Umgebung ausgeschält, vom Blasenfundus abpräpariert und entfernt. Gleichzeitig können Herde in der Prostata exkochleiert werden.

### **Prostatektomie.**

Die Entfernung der hypertrophischen Prostata ist auch in vorgeschrittenen Graden des Prostatismus geeignet, Heilung zu erzielen. Die Operation ist angezeigt bei chronisch kompletten Harnretentionen der Prostatiker, bei der inkompletten Retention, wenn die Passage durch die Harnröhre sehr erschwert ist, oder wenn die Prostatahypertrophie mit rezidivierendem Harnstein vergesellschaftet ist. Die hypertrophische Drüse lässt sich intrakapsulär auf schonende Weise auslösen.

Die Operation wird in Steinschnittlage, bei erhöhtem Becken ausgeführt. Ein starkkalibriger





Seidenkatheter liegt in der Harnröhre. Die Blosslegung der Prostata wird in der oben erörterten Weise mit Hilfe eines perinealen praerektalen





Fig. 292.  
Prostatotomie. Führung des Praerektalschnittes.


Bogenschnittes vorgenommen. Liegt die Prostata ausreichend bloss, so wird in die Wunde ein breiter Simon'scher Scheidenspatel eingeführt, der den Mastdarm sakralwärts drängt. Es wird



**Fig. 293. Perineale Prostatektomie. 1.**  
Die Prostata liegt bloss. Ihre Kapsel ist abgehoben.

nun die Kapsel über der Prostata median gespalten und von der Drüse mittelst Kropfsonde abgehoben (Fig. 293). Es wird nun die Harnröhre im prostatischen Antele eröffnet und die Drüse zunächst an einer Seite von der Harnröhre abge-

löst. Nun fasst man die Substanz des blossgelegten Seitenlappens mit einer Muzeux'schen Zange und zieht diesen aus der Nische vor (Fig. 294), dabei werden fixierende Stränge durchtrennt. Innig ist



**Fig. 294. Perineale Prostatektomie II.**  
Lösung der rechten Prostatahälfte aus ihrer Nische.

die Verbindung der Prostata am Diaphragma urogenitale. Bei fortschreitender Auslösung wird die Drüse durch immer höher eingesetzte Zangen sukzessive vorgezogen, bis auch die vesikalen Anteile im Gesichtsfeld erscheinen; von diesen wird

die Blasenschleimhaut stumpf abgehoben, bis endlich der ganze Lappen in Form eines knolligen Tumors sich entfernen lässt. In analoger Weise geht man an der zweiten Seite vor. Nach vollendeter Exzision formiert die Wunde je eine tiefe




Fig. 295. Perineal Prostatektomie III.  
Wunde nach Enukleation beider Prostatahälften.

Nische rechts und links von der Harnröhre (Fig. 295).

Zur Wundversorgung wird ein Verweilkatheter eingelegt, die Wunde tamponiert und partiell vernäht.



Die hypertrophische Prostata lässt sich intrakapsulär stets in zwei Hälften enukleieren. Gewöhnlich stellen diese höckerige, knollige Geschwülste dar (Fig. 296).



Fig. 296.

Durch Enukleation, in zwei Hälften entfernte hypertrophische Prostata. Natürliche Grösse.

### **Resektion und Exstirpation des Vas deferens.**

Die Resektionen aus der Kontinuität des Vas deferens werden zur Behandlung der Prostatahypertrophie geübt.

Das Vas deferens ist als spulrunder, derber Strang durch die Hautdecke tastbar und lässt sich als solcher von den übrigen Gebilden des Samenstranges isolieren.

Der 3—4 cm lange Hautschnitt zur Isolierung des Vas deferens kann ebenso gut vor der äusseren Leistenöffnung als entsprechend dem Halse des Skrotum angelegt werden. Man drängt die

Gebilde des Samenstranges zur Wunde heraus, tastet nach dem Vas deferens und isoliert dieses. Ein 2—4 cm langes Stück wird zwischen zwei Ligaturen mit der Schere ausgeschnitten.

Die Entfernung des Vas deferens im Zusammenhange mit dem Hoden wird dann nötig, wenn bei Tuberkulose des Nebenhodens auch das Vas deferens erkrankt befunden wird. In diesem Falle wird der Schnitt zur Blosslegung des Hodens, der der Länge nach über das Skrotum verläuft, nach oben und aussen über den Leistenkanal verlängert.

Im Bereiche des Schnittes wird die Haut und das obere Dach des Leistenkanals gespalten, so dass das Vas deferens, in seinem Verlauf durch den Leistenkanal, blossgelegt erscheint, und der operativen Entfernung zugänglich gemacht ist.

Der pelvine Teil des Vas deferens wäre auf diese Weise nur unter ausgedehnter Abhebung des Bauchfells, — also einer unverhältnismässig grossen Verletzung zugänglich. Derselbe ist auf perinealem Wege oder sakral erreichbar.

Bü n g n e r empfahl an Stelle der Exstirpation die Ausführung der Divulsion des Vas deferens. Dasselbe wird isoliert und durch einen allmählich sich steigernden Zug in grösserer Länge entwickelt. Es gelingt bei sorgfältiger Isolierung, vier Fünftel des Samenganges zu entfernen.

### **Exstirpation des Hodens.**

Geschwülste, Gummen und tuberkulöse Zerstörungen geben die Indikation zur Exstirpation des Hodens.

Der Hautschnitt verläuft stets in der Längsrichtung, über die grösste Konvexität der Geschwulst. Zur Anlegung des Hautschnittes um-

fasst der Operateur das Skrotum derart mit seiner linken Hand, dass die Haut über demselben angespannt erscheint (Fig. 297).

Ist die Haut an umschriebener Stelle in den Krankheitsprozess mit einbezogen, (Uebergreifen




Fig. 297.

Schnittführung zur Blosslegung des Hodens.

des Neugebildes auf die Haut, Fistelbildung bei Tuberkulose), so wird die kranke Partie zwischen die Schnitte gefasst und im Zusammenhange mit dem Hoden entfernt. Die Schnitte werden durch die Haut, Dartos, bis auf die Tunica vaginalis

Fig. 298. Exstirpation des Hodens.



geführt, und der Hoden mit seinen Hüllen stumpf aus seinem Bette gehoben, so dass er nur noch durch den Samenstrang im Zusammenhang mit dem Körper bleibt.

Durch Zug am Samenstrang werden die Gebilde desselben klarer zu Tage treten. Die Bestandteile des Samenstranges werden in zwei bis drei Partien en masse unterbunden. Der Samenstrang wird vor den Ligaturen quer abgetrennt (Fig 298). Die Ligaturen sind kurz abzuschneiden. Der Stumpf des Samenstranges schnellt in die Tiefe der Wunde zurück, die Hautwunde wird durch Nähte geschlossen.

### **Orchidopexie.**

Die operative Verlagerung des in der Bauchhöhle oder im Leistenkanale retenierten Hodens wird im allgemeinen derart ausgeführt, dass der Hoden durch einen über das Skrotum zur Leiste ziehenden Schnitt blossgelegt wird. Zur Mobilisierung müssen die sich anspannenden Gefässe vom Samenstrang gelöst, zentralwärts weit abgehoben werden, ehe es gelingt, den Hoden entsprechend weit herunter zu ziehen. Durch Matratzennähte (Riedel) wird der Hoden im Grunde des Skrotum fixiert.

Hahn legt den Hoden mit einem inguinalen Hautschnitt bloss; von der Wunde aus wird nach der betreffenden Skrotalhälfte stumpf ein Kanal gebohrt, der an seiner tiefsten Stelle durch einen kurzen Hautschnitt eröffnet wird. Der mobil gemachte Hoden wird durch den Kanal und durch die Hautlücke gezogen und hier am Zurückschlüpfen durch Verkleinerung der Hautwunde gehindert. Etwa eine Woche später wird der Hode nach Entfernung der Hautnähte in das Skrotum gehoben und durch Nähte hier dauernd fixiert.

### **Operation der Varikokele.**

Hartnäckige Beschwerden indizieren bei Varikokele ein operatives Einschreiten.

Gegenwärtig wird fast ausschliesslich die Exzision der dilatierten Venen des Samenstranges geübt. Unter digitaler Kompression oder elastischer Umschnürung des Penis und der Skrotalwurzel wird durch die Skrotalhaut ein Längsschnitt geführt; man vertieft den Schnitt und legt die Venenkonvolute frei. Die einzelnen Stränge werden isoliert, vorerst zentral, dann an der Peripherie ligiert und zwischen den Ligaturen ausgeschnitten. Einige Venen werden unberührt im Samenstrang zurückgelassen; die Hautwunde komplett vernäht.

Eine Modifikation des Verfahrens legt den Plexus nicht am Hodensacke, sondern über der äusseren Leistenöffnung bloss.

Zur Erzielung einer grösseren Stütze sind bei Varikokele Skrotalresektionen ausgeführt worden. Aus derselben Indikation empfiehlt Köhler, nach Resektion der Venen den longitudinalen Schnitt am Hodensack quer zu vernähen.

### **Hydrokelenoperation.**

Die Hydrokele wird palliativ durch die einfache Punktion, radikal durch Eröffnung mit dem Schnitt behandelt.

Die *Punctio hydroceles* wird nach den für Punktionen im allgemeinen geltenden Regeln vorzunehmen sein. Nur muss der Operateur über die Lage des Hodens unterrichtet, beim Einstich eine Verletzung dieses Organs zu vermeiden suchen.

Das Skrotum wird mit der supinierten linken Hand gefasst, und straff gespannt festgehalten. Der Einstich mit dem Trokart erfolgt in der Richtung nach oben an der vorderen Wand, nahe dem Fundus scroti, an einer Stelle, wo keine Vene durch die Haut schimmert.

Im Beginne strömt die Flüssigkeit in vollem Strahle aus. Später muss man durch eine veränderte Stellung der Kanüle und knetende Bewegungen am Skrotum den Ablauf der Flüssigkeit zu befördern trachten.

Die der Punktion angeschlossene Einspritzung von 5—10 g Lugol'scher Lösung durch die Trokartkanüle ist eine beliebte Methode der Radikaloperation der Hydrokele; doch ist das Verfahren ausserordentlich schmerzhaft und steht, was die Sicherheit des Erfolges anlangt, dem Radikalschnitte nach.

### Radikalschnitt nach Volkmann.

Das Skrotum wird mit der linken Hand gespannt gehalten und ein Schnitt in der Längsrichtung über die grösste Konvexität der Geschwulst bis nahe an den Fundus geführt.

Der Schnitt wird vorsichtig präparierend bis an die Scheidenhaut geführt und durchtrennt diese in der Richtung und Ausdehnung des Hautschnittes. Ist die Flüssigkeit abgelassen, so wird die Scheidenhaut durch eine Reihe von Nähten mit der Haut vereinigt. In den Hohlraum wird ein Gazestreifen eingeschoben.

Die Heilung nimmt hier oft beträchtliche Zeit in Anspruch.

### Radikaloperation nach Bergmann.

In kürzester Zeit zum Ziele führt Bergmanns Methode der Radikaloperation, da hier durch die Wundverhältnisse eine Heilung p. primam intentionem erfolgen kann.

Hautschnitt wie im vorhergehenden Falle. Ehe der Hydrokelensack eröffnet wird, sucht man ihn in grösserer Ausdehnung von der bedeckenden Haut zu befreien. Ist dies in genügendem Masse

geschehen, so wird der Sack wie bei Volkmann eröffnet.

Ist die Flüssigkeit abgelaufen, so erfasst der Operateur den Wundrand der Scheidenhaut und löst diese bis nahe an die Umschlagstelle an den Hoden jederseits ab; ist diese Ablösung allenthalben ausgeführt, so wird das freigemachte parietale Blatt der Scheidenhaut exzidiert.

Die Haut wird über den Hoden, der in die Wunde versenkt wird, durch Naht exakt vereinigt.

Weniger eingreifend ist das Verfahren von Winkelmann, eine Modifikation der eben erwähnten Methode. Der Hydrokelensack wird durch eine 3—4 cm lange Inzision eröffnet. Nach Ablauf der Flüssigkeit drängt man den Hoden durch den in der Tunica angelegten Schlitz nach aussen, verkleinert diesen durch eine Naht so weit, dass ein Wiederdurchtritt des Hodens nicht mehr möglich ist. Ueber dem umgekrempelten Serosasack und dem Hoden wird die Hautwunde vereinigt. Die nach aussen gekehrte Serosa der Tunica vaginalis propria sieht gegen das Unterhautzellgewebe und kann mit diesem verwachsen.

### **Operation der Phimose.**

Wir bezeichnen als Phimosenoperation chirurgische Eingriffe verschiedener Art, durch welche eine angeborene oder erworbene Enge des Praeputiums behoben wird.

Es wird bei der Operation entweder eine lineare Spaltung des Präputiums vom Orificium bis an die Eichel (Inzision) vorgenommen, oder es kommt das ganze Präputium zur Abtragung (Zirkumzision). Zur Ausführung der Inzision, die in der Mittellinie am Dorsum (Dorsalinzision) vorgenommen wird, führt der Operateur durch das Orificium praeputii zwischen



Vorhaut und Eichel eine Hohlsonde mit nach oben gerichteter Rinne ein. Ueber der Hohlsonde wird mit einem Scherenschlage das Präputium (äussere und innere Lamelle) bis nahe an die Corona glandis gespalten.

Nach erfolgter Spaltung muss sich die Vorhaut anstandslos über die Glans penis zurückschieben lassen.

### Zirkumzision.




Fig. 299.

Die Vorhaut ist zur Abtragung abgeklemt.



Fig. 300.

Die Vorhaut ist zirkulär abgetragen und an der Dorsal-seite gespalten. Man sieht am Querschnitte die beiden Lamellen des Präputiums.




Fig. 301.

Innere und äussere Lamelle der Vorhaut sind durch Naht miteinander vereinigt.

Im Bereiche der Wunde wird die Schleimhaut des Präputiums mit der Haut durch eine Reihe von Knopfnähten oder durch die fortlaufende Naht vereinigt.

Die Zirkumzision kann in verschiedener Weise vorgenommen werden. Die Präputialhaut wird vor der Glans penis quer abgeklemmt, und vor der Klemme mit der Schere abgetragen (Fig. 299). Durch Hinzufügung einer Dorsalinzision lässt sich die Oeffnung im Vorhautsack beliebig vergrössern (Fig. 300). Die Wundränder der Haut und der inneren Lamelle des Präputiums sind (Fig. 301) miteinander zu vernähen.

### Operation des verkürzten Phrenulums.



Fig. 302.




Fig. 303.

#### Operation des verkürzten Phrenulums.

Fig. 302. Quere Spaltung des Bändchens.

Fig. 303. Vereinigung senkrecht auf die Richtung des Spaltes.

Die angeborene Kürze des Phrenulums, bei normaler Weite der Vorhaut, hat zahlreiche Beschwerden zur Folge (Schmerzen beim Koitus, häufiges Einreissen, Haemorrhagien).

Die einfache quere Trennung des Bändchens ist wegen der Blutung, die diesem Eingriff folgt,

nicht empfehlenswert. Die Durchtrennung mit dem Paquelin schützt zwar vor der Blutung, doch nimmt die Heilung der Wunde längere Zeit in Anspruch.

Funktionell gute Resultate bei der Möglichkeit der Erzielung einer *prima intentio* gibt die folgende kleine plastische Operation.

Das Bändchen wird mit einem Scherenschlage quer so tief gespalten, dass die Vorhaut maximal, ohne Spaltung zu erzeugen, retrahiert werden kann. Nun wird die kleine Wunde senkrecht auf die erste Schnittrichtung mit einigen Knopfnähten vereinigt (Fig. 302, 303).

### **Amputation des Penis.**

Die häufigste Veranlassung für die Amputation des Penis sind Karzinome. In seltenen Fällen haben Gangrän, phagedaenischer Schanker, Harnröhren-Verengung (Dittel) die Abtragung des Penis notwendig gemacht.

Das Glied kann in der Pars pendula in beliebiger Höhe zirkulär abgesetzt werden. Unter Umständen müssen die tieferen Anteile des Penis, die Wurzeln der Schwellkörper, operativ beseitigt werden.

In allen Fällen ist nach erfolgter Absetzung des Gliedes die Harnröhre in der Wunde entsprechend situiert zu befestigen. Die Amputation penis wird in der Pars pendula unter digitaler Kompression des Gliedes mit einem queren Zirkelschnitt vorgenommen. Die Haut wird nach zirkulärer Durchtrennung retrahiert, worauf der Operateur die Schwellkörper mit dem Amputationsmesser vom Dorsum penis gegen die Harnröhre schneidend, quer durchtrennt. Ist er an der Harnröhre angelangt, so sucht er diese peripherwärts

auf kurze Strecke freizupräparieren, um sie etwa 2 cm vor der Schnittfläche des Schwellkörpers des Gliedes quer zu durchtrennen (Fig. 304).




Fig. 304.

#### Amputation des Penis.

Der Penis ist elastisch abgeschnürt. Die Haut ist zirkulär durchtrennt. Die Schwellkörper durchschnitten. Der Penisstumpf hängt noch an der Urethra, die auf kurze Strecke peripherwärts freipräpariert wird.

Die Harnröhre wird an ihrer unteren Seite mit einem Scherenschlage eingekerbt, über die Wunde gebreitet und mit ihrem freien Rande durch eine Reihe von Nähten an den Hautrand geheftet (Fig. 305).

Zur Amputation des Penis im Zusammenhange mit seinen perinealen Anteilen wird das Skrotum sagittal gespalten.




Fig. 305.

#### Amputation des Penis.

Die Absetzung ist vollendet; über die Schnittfläche der Schwellkörper ist die an der Unterseite gespaltene Harnröhre ausgespannt und ihrem Rande entsprechend mit der Haut vereinigt.

In der klaffenden Wunde gelingt es ohne Mühe, die Wurzeln der Schwellkörper mit ihren Anheftungen am Schambeine blosszulegen.

Die Harnröhre wird im Gesunden quer durchtrennt, an ihrer Unterseite geschlitzt und in den hinteren Wundwinkel eingenäht (perineale Urethrostomie).

Die Schwellkörper des Penis werden abgelöst und im Zusammenhange mit den peripheren Teilen der Harnröhre nach oben geschlagen. Ist die Ablösung bis in die Pars pendula geführt, so wird nach zirkulärer Umschneidung der Haut, der Penis entsprechend dem Skrotalansatze quer abgetrennt und entfernt. Die Skrotalwunde wird bis zur neu angelegten Harnröhrenmündung durch Naht verschlossen.

### **Operation der Harnröhrenfisteln.**

Solange der Fistelgang nicht überhäutet ist, kann man durch Tuschierung des Ganges bei gleichzeitiger Erweiterung der Harnröhre eine spontane Heilung erhoffen.

Ist der Gang überhäutet, die Schleimhaut der Harnröhre mit der Haut verwachsen, so bedarf es der blutigen Anfrischung und Naht, wenn die Fistel zur Heilung gebracht werden soll.

Man frischt bei kleinen Fisteln elliptisch an und vereinigt den Defekt durch quer angelegte tiefergreifende und oberflächliche Nähte (Fig. 306). Bei ovalärer Anfrischung empfiehlt sich, durch seitliche, nahe dem oberen und unteren Ende des Ovals jederseits angebrachte Schnitte, die Bildung seitlicher Läppchen, die von ihrer Unterlage abgelöst, nach Anlegung von versenkten Nähten, über dem Defekte zur Vereinigung gebracht werden (Fig. 307).

Ein brauchbares Verfahren ist es ferner, nach Anfrischung des Fistelrandes, im Bereiche des Defektes durch flache Schnitte die Haut von der Schleimhaut blutig so weit zu trennen, dass die Ränder der letzteren ohne Spannung aneinander gebracht werden können. Durch Katgutnähte wird die Schleimhaut über dem Defekt vereinigt; hierauf die Wunde der äusseren Haut geschlossen.




Fig. 306. Harnröhrenfistel.  
Elliptische Anfrischung. Naht.




Fig. 307. Harnröhrenfistel.  
Anfrischung mit Bildung seitlicher Lappchen. Naht.

Bei ausgedehnten Defekten der Harnröhre wird man einen dem Penis entnommenen Hautlappen derart auf den angefrischten Defekt bringen, dass er mit seiner Hautseite der Urethrallichtung zugekehrt ist. In einer zweiten Lage kommt die Wunde der Haut zur Vereinigung, oder es wird ein zweiter Lappen Wunde auf Wunde über den ersten gebreitet.

### Operation der Hypospadie.

Für die Behandlung der Eichelhypospadie ist die Beck'sche Methode originell erdonnen. Die Harnröhre wird mit ihrem Schwellkörper auf eine entsprechende Strecke freipräpariert. Der zweite Akt ist die Bildung eines Wundkanals in der unperforierten Eichel, den man an der Spitze, dem normalen Orificium urethrae entsprechend, münden lässt. Die freipräparierte, dehnbare Harnröhre wird durch den Eichelkanal




Fig. 308. Operation der Eichelhypospadie nach Beck.

gezogen und mit ihrem Ende an der Spitze der Eichel eingenäht (Fig. 308).

Ein anderes Verfahren besteht darin, dass neben der Eichelrinne beiderseits tiefe Längsschnitte angelegt werden, worauf die äusseren Wundränder über ein eingelegtes Rohr verschlossen werden, so dass die Rinne zu einem Kanal geschlossen wird.

Die Hypospadias penis und perinealis erfordert eingreifendere plastische Verfahren.



Nach Duplay geht man derart vor, dass in erster Sitzung durch einen Querschnitt zwischen Eichel und der Harnröhrenmündung die Möglichkeit gewonnen wird, das Glied gerade zu richten. Die quere Wunde wird in longitudinaler Richtung vereinigt.

Nach Vernarbung dieser Wunde wird an die Bildung der Harnröhre geschritten. 6—7 mm von der Mittellinie, wird jederseits an der Unterseite des Gliedes, ein Längsschnitt von der Glans bis an die Harnröhrenmündung geführt, die innere Lefze dieser Wunde beiderseits so weit abgelöst, dass die Lappen mit der Epidermisseite nach innen über ein Rohr in der Medianlinie vereinigt werden können. Die äusseren Lefzen der Längswunden werden ebenfalls entsprechend abpräpariert und über der bereits gebildeten Harnröhre median vernäht. Ist auf diese Weise ein mit Epidermis ausgekleideter Kanal an der Unterseite des Gliedes gebildet, so erübrigt noch der Verschluss der Harnröhrenmündung, die breit angefrischt und vernäht wird.

Vorher war schon ein Kanal in der Eichel gebildet und mit dem neugebildeten Harnröhrenkanal durch Anfrischung und Naht in Zusammenhang gebracht worden. Die Eichelharnröhre wird am besten derart angelegt, dass an der Unterseite der Glans, rechts und links von dem zu bildenden Kanal, etwas konvergierend, je ein Schnitt tief ins Gewebe geführt wird. Der mittlere Teil wird niedergedrückt, worauf über diesem, nach Einlegung eines Rohres, die beiden seitlichen Anteile median zur Vereinigung kommen.

Wie bei den einfachen Fisteloperationen am Penis, wird auch hier durch die Entleerung des Harnes, durch Erektionen des Gliedes, die die genähten Wunden sprengen, der Erfolg oft illusorisch gemacht. Es bedarf häufiger Korrekturen

und wiederholter Operationen, ehe das erzielte Resultat den Intentionen entspricht. Oft wird die Geduld des Arztes, wie des Kranken auf eine harte Probe gestellt. Die Harnentleerung wirkt schädlich, ob man den Kranken urinieren lässt oder einen Verweilkatheter einlegt. Bei grösseren plastischen Operationen am Gliede wird aus diesem Grunde die temporäre Anlegung einer Harnblasen-Bauchdeckenfistel empfehlenswert sein.

### Operationen an den Hernien.

Die blutigen Eingriffe an Hernien werden zu dem Zwecke unternommen, um entweder eine vorhandene Einklemmung zu lösen oder eine freie resp. angewachsene Hernie operativ zu beseitigen (Radikaloperation).


Die erstere Operation (Herniotomie) besteht darin, dass die Hüllen der Hernie gespalten werden, dass der Bruchsack eröffnet und der ein-klemmende Ring gelüftet wird.

Das weitere Verhalten bei der Herniotomie (Reposition des Darmes, Anlegung eines Anus praeternaturalis, Darmresektion) ist von den im einzelnen Falle vorhandenen Verhältnissen abhängig.

Der Hautschnitt wird über der Längsachse der Bruchgeschwulst angelegt; bei Leistenhernien derart, dass der Leistenkanal, sowie beide Leistenöffnungen in seinen Bereich fallen. Bei Schenkelhernien erläuft der vertikale Schnitt über die grösste Konvexität der Bruchgeschwulst.

Man gelangt bei vorsichtigem, schichtweisem Präparieren, nachdem man das Unterhautzellgewebe und die als Fascia propria herniae bezeichnete Schicht passiert hat, auf den Bruchsack. Dieser ist matt, an einzelnen Stellen mit Fettklumpchen besetzt und oft so zart, dass er das Bruchwasser durchschimmern lässt.

Bei Leistenbrüchen wird es nötig sein, in den oberen Partien der Bruchgeschwulst, die vordere Wand des Leistenkanales (Aponeurose des M. obliquus ext., Fasern des M. obl. int. und trans-



**Fig. 309. Leistenhernie.**

**Der Bruchsack ist eröffnet. Der einklemmende Ring an seiner Aussenseite blossgelegt.**

versus), ehe man an die eigentlichen Hüllen der Bruchgeschwulst gelangt, zu spalten. Der Bruchsack wird in der Richtung des Hautschnittes eröffnet, und man nimmt, nachdem das Bruchwasser abgelassen, die Lösung der Einklemmung vor.

Bei Leistenhernien wird durch Spaltung der vorderen Wand des Leistenkanals in ganzer Länge, der einklemmende Ring stets blosszulegen sein (Fig. 309). Derselbe wird vorsichtig von aussen nach innen durchtrennt, bis jede Spannung geschwunden ist.

Bei Schenkelhernien erfolgt das Debridement ausserhalb des Bruchsackes mit dem geknüpften Messer, unter Leitung des Fingers stets in der Richtung nach einwärts. Der scharfe Rand des Lig. Gimbernati wird eingekerbt und auf diese Weise die Einklemmung behoben.

Nach erfolgtem Debridement wird die Darmschlinge vorgezogen, so dass sowohl die Strangulationsmarke, als der zentralwärts angrenzende Bezirk des Darmes in der Wunde sichtbar werden. Ist die Serosa glatt und glänzend, so wird die Schlinge in die Bauchhöhle zurückgeschoben.

Zur Reposition wird die Darmschlinge leicht komprimiert, so dass etwaiger Darminhalt aus derselben entweiche; durch schiebende Bewegungen mit den Fingern wird die Schlinge allmählich durch die Bruchpforte in die Bauchhöhle zurückgebracht. Während der Reposition wird der Bruchsack gespannt gehalten. Um sich zu überzeugen, dass der Darm tatsächlich in die Bauchhöhle geschoben wurde, empfiehlt es sich, nach vollendeter Reposition mit einem Finger durch die Bruchpforte in die Bauchhöhle einzugehen und daselbst die innere Mündung des Bruchkanals zu umkreisen. So werden fehlerhafte Reposition oder Scheinreduktion sich immer vermeiden lassen.

Vorgelagertes Netz wird entweder reponiert, oder, wenn es verdickt ist, partienweise ligiert und abgetragen. Ist der Bruchinhalt mit der Innenfläche des Bruchsackes verlötet (angewach-

sener Bruch), so muss der Reposition eine Lösung der Adhaesionen vorhergehen.

Ist an der Strangulationsmarke die Serosa matt, so wird die Schlinge nach erfolgtem Debridement in der Wunde belassen. Je nach dem Ausgang kann die Schlinge nach Tagen reponiert werden, oder es kommt zur Etablierung eines *Anus praeternaturalis*.

Erweist sich die Schlinge bei Ausführung der Herniotomie als gangränös, so wird ein wider-natürlicher After etabliert, wobei die Schlinge durch Nähte fixiert wird.

Eir anderes Verfahren bei Gangrän des Darmes ist die primäre Resektion und Anlegung der Darmnaht.

Ist bereits ein Kotabszess vorhanden, so wird derselbe breit gespalten und die vorliegende Darmschlinge durch Nähte vor dem Zurückschlüpfen in die Bauchhöhle gesichert.

Der letzte Akt der Operation, die Wundversorgung, bezweckt einen exakten Abschluss der Bruchpforte und stellt Verhältnisse her, welche die abermalige Bildung einer Hernie tunlichst verhindern sollen.

### **Radikaloperation der Hernien.**

Die Radikaloperation der Brüche kann im Anschlusse an die Herniotomie ausgeführt werden und ist überdies angezeigt bei angewachsenen Brüchen oder freien Hernien, die Beschwerden verursachen und mit Hilfe von Bruchbändern nicht reponiert erhalten werden können.

### **Radikaloperation des Leistenbruches.**

Die Radikaloperation hat hier die Aufgabe, die Bruchpforte zu verschliessen und dem Leistenkanale, der, ja auch nach der Operation dem

Tab. 39. Operation des Leistenbruches nach  
Bassini. I.

Durch einen inguinalen Schrägschnitt ist die äussere Leistenmündung, die Aponeurose des Obliqu. ext. und die Bruchgeschwulst blossgelegt.

Samenstränge als Bahn zu dienen hat, eine derartige Festigkeit zu geben, dass derselbe der Bauchpresse wirksamen Widerstand entgegenzusetzen vermag.

Der Leistenkanal umfasst die Strecke zwischen innerem und äusserem Leistenring und durchsetzt die Bauchwand in schiefer, medianwärts absteigender Richtung.


Die innere Mündung des Kanals, der innere Leistenring, stellt den Eingang der bis ins Skrotum sich erstreckenden Ausbuchtung der Fascia transversa dar.

Der äussere Leistenring ist durch eine Lücke in der Aponeurose des Musc. obliquus ext. dargestellt, die sich knapp oberhalb des Poupart'schen Bandes nach aussen vom Tuberculum pubicum befindet.

Die vordere Wand des Leistenkanals ist durch die Aponeurose des äusseren schiefen Bauchmuskels und durch Züge des M. obliquus int. und transversus dargestellt.

Die hintere Wand ist vornehmlich durch die Fascia transversa gebildet und erfährt in der Höhe der äusseren Leistenmündung durch Bündel des Obliquus int. und Transversus eine Verstärkung.

Ausführung der Radikaloperation (Bassini). Hautschnitt entsprechend der Richtung des Leistenkanals, von der Gegend des inneren Leistenringes, den äusseren Leistenring nach unten zu überschreitend. Nach Spaltung der Haut und des Unterhautzellgewebes wird die Aponeu-







rose des Obliquus externus in der Richtung des Hautschnittes bis in die äussere Leistenöffnung gespalten (Tab. 39). Werden die Faszienplatten des äusseren schiefen Muskels vom Schnitte aus nach beiden Seiten stumpf von ihrer Unterlage abgehoben, so erscheint die tiefere Muskelschicht nebst den zentraleren Anteilen der Bruchgeschwulst.

Man löst nun, stumpf präparierend, Vas deferens, Arterie und Venen des Samenstranges vom Bruchsacke und isoliert diesen bis jenseits der Bruchpforte.

Es folgt die Eröffnung des Bruchsackes entsprechend dem Fundus und Reposition des Bruchinhaltes in die Bauchhöhle.

Während der Bruchsack vorgezogen und entsprechend dem Halse um  $180^{\circ}$  torquiert wird, schlingt der Operateur einen Faden um den Bruchsackhals und schliesst ihn möglichst zentral. Der Bruchsack wird peripher von dieser Ligatur mit einem Scherenschlage quer abgetrennt.

Es handelt sich nun um die Wiederherstellung eines neuen Leistenkanals mit möglichst resistenten Wandungen. Ist der Samenstrang medialwärts disloziert, und werden die beiden Lefzen der gespaltenen Aponeurose des M. obliquus ext. nach oben und unten verzogen, so erscheint in der Wunde einerseits die Rinne des Poupart'schen Bandes, andererseits der laterale Rektusrand nebst der Muskelplatte des Obliquus int. Diese Muskelschicht wird stumpf vom subserösen Gewebe, sowie von der Aponeurosis obliqui ext. abgelöst, so dass sie hinreichend beweglich an das Poupart'sche Band gebracht werden kann; sie wird an den hinteren Rand des Poupart'schen Bandes durch Nähte fixiert (Tab. 40).

Die Nähte am Schambeine umfassen auch den lateralen Rand des Rektus; auf diese Weise

Tab. 40. Operation des Leistenbruches nach  
Bassini. II.

Durch Distraction der gespaltenen Aponeurose des Obliqu. ext. ist die tiefere Muskelschicht und das praeperitoneale Fett blossgelegt. Der Bruchsack ist entsprechend der inneren Leistenöffnung umschnürt und hier abgetrennt, so dass bloss sein Stumpf sichtbar ist. Der Samenstrang ist medialwärts verzogen. Zur neuen Bildung der hinteren Wand des Leistenkanals sind Nähte angelegt, durch welche die Muskelplatte des Obliqu. int. an das Poupart'sche Band geheftet wird.

Tab. 41. Operation des Leistenbruches nach  
Bassini. III.

Die Aponeurose des Obliquus ext. ist über den Samenstrang durch Knopfnähte bis auf die äussere Leistenöffnung vereinigt.


ist eine hintere muskuläre Wand von genügender Resistenz gebildet, in welche die neugeschaffene enge innere Leistenöffnung zu liegen kommt.

Der Samenstrang wird auf diese Muskelplatte gelagert und darüber die Aponeurose des Obl. ext. durch Naht bis auf den unteren Winkel, die neue äussere Leistenöffnung, verschlossen. Vereinigung der Haut mittelst Naht (Tab. 41).


Der neugebildete Leistenkanal ist nach vollendeter Heilung derartig widerstandskräftig, dass die operierten Kranken eines Bruchbandes ent-raten können.

Bei Kocher's Radikaloperation des Leistenbruches (Verlagerungsmethode) wird der Hautschnitt wie bei Bassini vorgenommen, doch wird die Aponeurose des Obl. ext. nicht gespalten, sondern lateral von der inneren Leistenöffnung geschlizt. Durch diese Oeffnung wird eine Kornzange eingeführt und durch den Leistenkanal zur äusseren Leistenöffnung herausgeleitet. Die Spitze des isolierten Bruchsackes wird erfasst und durch die kleine Oeffnung lateralwärts herausgezogen.

*Tab. 40.*









Der Bruchsack wird angezogen, so dass er vom inneren Leistenring scharf nach hinten abgeknickt erscheint. Der innerhalb der Bauchwand liegende Teil des Bruchsackes wird umstochen und kräftig umschnürt. Die Basis des zusammengefalteten Bruchsackes wird auf die Aussenfläche der Aponeurosis obliqui ext. durch tiefgreifende Nähte geheftet, der Rest wird abgetragen.

### **Radikaloperation des Schenkelbruches.**

#### **Schenkelkanal.**

Die Strecke zwischen innerem und äusserem Schenkelring, die gewissen Formen von Hernien als Bahn dient, wird als Schenkelkanal bezeichnet. Unter normalen Verhältnissen ist dieser Kanal als solcher nicht vorhanden.

Die innere Mündung des Kanales (Annulus cruralis int.) ist entsprechend dem medialen Winkel der Lacuna vasorum zwischen dem Poupart'schen Bande und dem horizontalen Schambeinaste gelegen; nach innen zu wird der Raum vom freien Rande des Gimbernat'schen Bandes (fächerförmiger Ansatz des Poupart'schen Bandes am Tuberculum pubicum) nach aussen von den grossen Gefässen resp. der Vena cruralis begrenzt.

Die äussere Oeffnung des Schenkelkanals entspricht jener locker gewebten Stelle der Fascia lata (Foramen ovale), welche die Vena saphena passiert, um in die grosse Schenkelvene einzumünden.

Die schnige Umrandung dieser Lücke ist mit ihrer Konkavität medialwärts gerichtet und wird als Processus falciformis bezeichnet.

Schenkelbrüche gelangen, wenn sie die Pforte

der inneren Mündung (*Annulus cruralis int.*) passiert haben, in einen Raum, dessen Boden von der *Fascia pectinea* gebildet wird, der nach innen vom *Lig. Gimbernati*, nach aussen von den Schenkelgefässen begrenzt wird und in dem für eine kurze Strecke die obere Fortsetzung des *Proc. falciformis* eine widerstandsfähige Decke bildet. Ist der freie Rand dieses passiert, so kann die Hernie die wenig resistente *Lamina cribrosa* vor sich herstülpen und gelangt auf diese Weise durch die Lücke des *Foramen ovale* nach aussen.

Die Hüllen der Schenkelhernie sind demnach spärlicher und substanzärmer als die des Leistenbruches. Der Bruchsack kann unter Umständen bei fettarmen Personen knapp unterhalb des subkutanen Zellgewebes gelegen sein. Aus diesem Grunde ist bei Anlegung des Hautschnittes, namentlich beim weiteren Präparieren in die Tiefe Vorsicht am Platze.

Im allgemeinen stellt sich der Vorgang der Radikaloperation von Schenkelhernien derart dar, dass nach Blosslegung der Bruchgeschwulst und Reposition des Inhalts der Bruchsack am Halse ligiert und vor der Ligatur abgetrennt wird. Die Bruchpforte wird zur Verhütung von Rezidiven durch Naht verschlossen. Die Schnitte zur Blosslegung der Bruchgeschwulst werden meist longitudinal über der grössten Konvexität des Tumors angelegt.

Fabricius räumt aus dem Schenkelkanale Fett und Lymphdrüsen aus und näht das gespannte Poupart'sche Band möglichst rückwärts an den horizontalen Schambeinast.

Bassini heftet, am *Tuberculum pubicum* beginnend, das Poupart'sche Band an die *Fascia pectinea*; weiters kommt der Rand der *Plica falci-*



formis mit der Fascia pectinea zur Vereinigung. Bei der obersten Naht beginnend, werden die Fäden geknüpft. Die Nahtlinie hat die Form eines schief geneigten C.

Weit übersichtlicher lassen sich die Verhältnisse bei der inguinalen Blosslegung des Schenkelringes darstellen. In einer Mitteilung aus dem Jahre 1882 hat E. Zuckerkandl zuerst diese Methode beschrieben. Durch einen Schnitt über dem Poupart'schen Bande, der die Bauchwand durchtrennt, wird der Schenkelring blossgelegt. Der Schnitt ist 8—9 cm lang und zum Poupart'schen Bande parallel, ähnlich dem zur Unterbindung der Art. iliaca ext.; die Bauchdecken werden bis auf das subperitoneale Gewebe durchtrennt, worauf nach Abhebung des Bauchfells der innere Schenkelring blossliegt.

Ruggi hat, auf denselben Prinzipien fusend, ein Verfahren der Radikaloperation für die Schenkelhernie ersonnen.

Hautschnitt vom Tuberculum pubicum bis über die Mitte des Poupart'schen Bandes der Richtung dieses entsprechend. Werden die Wundränder auseinandergezogen, so lässt sich die Bruchgeschwulst blosslegen. Der Bruchsack wird isoliert und der Bruchinhalt in die Bauchhöhle reponiert.

Nun wird die Aponeurose des M. obliquus ext. ca. 0,5 cm über dem Poupart'schen Bande in der Richtung des Hautschnittes gespalten und der Leistenstrang resp. das runde Mutterband mit dem Musc. obliquus int. und transversus nach aufwärts verzogen. In der so gebildeten Wunde wird im praeperitonealen Zellgewebe, oberhalb des Poupart'schen Bandes, die zum Schenkelbruch ziehende Bauchfellausstülpung aufgesucht, der Bruchsackhals mit einer stumpfen Zange gefasst und aus dem Schenkelkanal zur

Wunde herausgezogen. Es folgt die Ligatur des Bruchsackhalses, die in einer Höhe sich vornehmen lässt, dass keine Andeutung eines Bauchfelltrichters verbleibt.

Der Verschluss der inneren Oeffnung des Leistenkanals geschieht nun in der Weise, dass das Poupart'sche Band mit dem Ligamentum pubicum sowohl von der Innen- als von der Aussenseite her durch Nähte vereinigt wird.

Ist der Bruchinhalt leicht reponibel, so kann man auf die Blosslegung und Eröffnung der Bruchgeschwulst im Foramen ovale verzichten und von vorneherein den Schnitt durch den Obliquus externus anlegen, um von der Innenseite des Schenkelkanals aus die Bruchgeschwulst zu fassen und aus ihrem Bette herausziehen. Sodann wird der Bruchsack in der oben angegebenen Weise ligiert und abgetragen. Der Verschluss der Bruchpforte beschliesst die Operation.

Die Methoden krankten an der Schwierigkeit, das Poupart'sche Band exakt an das Schambein zu fixieren; Roux hat durch einen bügelartigen Nagel das Poupart'sche Band an den Knochen fixiert. Herzen führt durch das Schambein einige Kanäle und bringt auf diese Weise das Poupart'sche Band in innigen Kontakt mit dem Knochen. Auf diese Weise soll ein Verschluss des Schenkelkanals resultieren, während alle erwähnten Methoden bloss die Mündungen desselben verschliessen.

### **Nabelbruch, Radikaloperation. Operation der eingeklemmten Omphalocele.**

Das übliche Verfahren bestand bis vor kurzem darin, die Bruchpforte nach Eröffnung der Bruchgeschwulst und Reposition der Därme durch die Naht zu verschliessen.

Eine grössere Sicherheit gegen den Wiedereintritt des Bruches, eine genauere Uebersichtlichkeit während der Operation gestattet die Ausschneidung des Nabelringes, die Omphalektomie (Condamin, Bruns).

Die Nabelgegend wird durch zwei elliptische Schnitte umkreist; jeder der Schnitte, welche bis an den medialen Rand des M. rectus reichen, eröffnet die Bauchhöhle seitlich der Bruchpforte, so dass die ganze Bruchgeschwulst samt Bruchsackhals ausgeschaltet erscheint. Wird überdies vom Wundrand her durch die Bruchpforte ein Teil des Sackes gespalten, so liegt der ganze Bruchinhalt frei zu Tage. Auf diese Weise resultiert eine ausgezeichnete Uebersichtlichkeit der Verhältnisse, indem die Eingeweide sowohl vor ihrem Eintritte in den Bruch, als innerhalb dieses sichtbar gemacht sind. Etwaige Adhaesionen werden gelöst; eine vorhandene Einklemmung kann in offener Wunde behoben werden. Nach Reposition der Intestina wird die Wunde der Bauchdecken in drei Etagen (1. Serosa, 2. Musculi recti, Rektusscheide, 3. Haut) durch Knopfnähte exakt vereinigt.

---



# Schlagwortregister.

A.	Seite
Abdomen, Hautschnitte am . . . . .	340
Abszess, der Prostata, Spaltung . . . . .	448
— perizoekaler . . . . .	361
Achillotenotomie . . . . .	211
Achselhöhle, Ausräumung der . . . . .	330
— Relief der . . . . .	54
Achtertourt, bei Amputationen . . . . .	114
Aderlass . . . . .	61
After, Anlegung des künstlichen . . . . .	355
Amputationen der Gliedmassen . . . . .	77
— Absetzung des Knochens . . . . .	91
— Ausführung . . . . .	79
— Indikationen . . . . .	77
— Lagerung des Kranken . . . . .	5
— Methoden . . . . .	79
— Präventive Blutstillung . . . . .	30
— Stellung des Operateurs . . . . .	78
— Wundversorgung . . . . .	92
Amputation . . . . .	
— der Mamma. . . . .	330
— der Metakarpen . . . . .	148
— der Metatarsen . . . . .	97
— des Oberarmes . . . . .	164
— des Oberschenkels . . . . .	130
— — mittelst Lappen . . . . .	138
— — mittelst osteoplastischer Verfahren . . . . .	139
— — mittelst Zirkelschnitt . . . . .	137
— des Penis . . . . .	465
— des Processus vermiformis . . . . .	358
— des Unterschenkels . . . . .	111
— — mit dem Zirkelschnitte . . . . .	114
— — mittelst Lappen . . . . .	116
— — nach Bier-Eiselsberg . . . . .	120
— — nach Bruns . . . . .	122
— — nach Heine . . . . .	117
— — nach Pirogoff . . . . .	125

	Seite
Amputation des Unterschenkels nach Syme . . . . .	123
— des Vorderarmes . . . . .	159
— der Zehen . . . . .	97
— der Zunge . . . . .	264
Anastomosenbildung am Darne . . . . .	349
— mittelst Naht . . . . .	350
— mittelst Murphyknopf . . . . .	351
Angiotripsie . . . . .	33
Anordnung der Muskulatur . . . . .	
— an der oberen Extremität . . . . .	59
— an der unteren Extremität . . . . .	65
Antrum Highmori, Trepanation des . . . . .	232
— mastoideum, Eröffnung . . . . .	226
Anus praeternaturalis inguinalis . . . . .	355
Appendizitis Operation . . . . .	358
Arteria anonyma, Unterbindung der . . . . .	308
— axillaris . . . . .	54
— brachialis . . . . .	56
— carotis . . . . .	309
— carotis communis . . . . .	309
— — externa . . . . .	311
— cubitalis . . . . .	58
— dorsalis pedis . . . . .	76
— femoralis . . . . .	67
— — unter dem Poupart'schen Bande . . . . .	67
— — oberhalb der Mitte des Oberschenkels . . . . .	68
— — im Hunter'schen Kanal . . . . .	69
— iliaca . . . . .	337
— iliaca externa . . . . .	338
— — interna . . . . .	338
— lingualis . . . . .	312
— mammaria interna . . . . .	329
— meningeae med., Trepanationsstellen . . . . .	224
— poplitea . . . . .	70
— radialis-ulnaris . . . . .	63
— subclavia . . . . .	313
— — oberhalb } des Schlüsselbeins . . . . .	315
— — unterhalb } . . . . .	316
— thyreoidea superior . . . . .	273
— — inferior . . . . .	317
— tibialis antica . . . . .	72
— — postica . . . . .	72
— ulnaris . . . . .	63
— vertebralis . . . . .	318
Arterien, Unterbindung in der Kontinuität . . . . .	47
Arthrektomia . . . . .	173
Arthrotomia . . . . .	173

	Seite
Aspirator von Bigelow . . . . .	433
Atmokaussis . . . . .	25
Atresia ani, Operation der . . . . .	397
Ausräumung der Achselhöhle . . . . .	330
Autoplastik . . . . .	216

## B.

Bauchdecke, Naht der Wunden der . . . . .	341
Bauchhöhle, Eröffnung der B. von d. Bauchdecken aus	339
Beckenhochlagerung . . . . .	1
Bistouri . . . . .	6
Blasenbauchwandfistel, Anlegung der . . . . .	438
Blasenektomie, Operation . . . . .	438
Blasennaht . . . . .	438
Blasenschnitt, hoher . . . . .	432
— medianer . . . . .	426
Blasensteinzertrümmerung . . . . .	427
Blasenspalte, Operation der . . . . .	438
Blasenstich . . . . .	411
Blattzange von Langenbeck . . . . .	396
Blutleere, Esmarch'sche . . . . .	31
Blutstillung . . . . .	29
Bluttransfusion . . . . .	22
Brüche, Operation der eingeklemmten . . . . .	472
— Radikaloperation der . . . . .	475
Brusthöhle, Eröffnung der . . . . .	
— mittelst Schnitt . . . . .	324
— mittelst Stich . . . . .	332

## C.

Cheiloplastik . . . . .	
— nach Dieffenbach . . . . .	255
— nach Langenbeck . . . . .	256
— nach Morgan . . . . .	259
Cholezystektomie . . . . .	380
Cholezystenterostomie . . . . .	381
Cholezystostomie . . . . .	379
Cholezystotomie . . . . .	379
Choledochotomie . . . . .	381
— transduodenale . . . . .	382
Choparts'che Exartikulation des Fusses . . . . .	106
Clavicula, lineare Durchtrennung der . . . . .	334

## D.

Dammsteinschnitt . . . . .	426
Darmausschaltung . . . . .	358

	Seite
Darmfistel . . . . .	353
Darmknopf, Murphys . . . . .	345
Darmnadeln . . . . .	343
Darmnaht . . . . .	343
Darmresektion . . . . .	356
— zirkuläre . . . . .	343
— bei seitlicher Anastomosenbildung . . . . .	347
Dekortikation der Lunge . . . . .	327
Digitalkompression d. Arterien . . . . .	31
Drainage der Blase nach hohem Blasenschnitt . . . . .	436
Drahtsäge . . . . .	28
— Verwendung zur Trepanation . . . . .	220

## E.

Eichelhypospadie . . . . .	470
Ekraseur . . . . .	26
Ektopie der Blase . . . . .	438
Elastistische Ligatur . . . . .	26
Elektromotor zum Betriebe der Kreissäge . . . . .	28
Empyem, Operation des . . . . .	324
Enteroanastomose . . . . .	349
Enterektomie . . . . .	356
Enterorrhapie . . . . .	343
Enterostomie . . . . .	353
Ereignisse, üble bei der Tracheotomie . . . . .	296
Esmarch'sche Blutleere . . . . .	31
Esthlander'sche Operation . . . . .	327
Etagennaht der Bauchdecke . . . . .	343
Exartikulationen, allgemeines über . . . . .	94
— Methoden der . . . . .	94
Exarticulatio cubiti . . . . .	161
— coxae . . . . .	145
— digitorum . . . . .	148
— genus . . . . .	135
— hallucis . . . . .	99
— humeri . . . . .	166
— intertarsea (Chopart) . . . . .	100
— manus . . . . .	156
— pedis (Syme) . . . . .	123
— pollicis . . . . .	150
— sub talo . . . . .	108
— tarso-metatarsea (Lisfranc) . . . . .	101
Exstirpation der Brustdrüse . . . . .	331
— der Gallenblase . . . . .	383
— der Hämorrhoiden . . . . .	396
— des Hodens . . . . .	455
— des Kehlkopfes . . . . .	289



	Seite
Exstirpation des Kropfes . . . . .	318
— der Niere . . . . .	440
— Venen bei Varikokele . . . . .	208
— der Zunge . . . . .	246
Exstirpationsverfahren zur Auslösung im Hüftgelenke . . . . .	146
— zur Auslösung des Schultergürtels . . . . .	170
Extrabukkale Blosslegung des N. buccinatorius . . . . .	280

## F.

Faden, knüpfen des F. bei Anlegung von Ligaturen . . . . .	53
Finger, Exartikulation des kleinen F. im Metakarpophalangealgelenke . . . . .	150
— Amputation eines F. im Metacarpus . . . . .	156
Fingerkontraktur, Dupuytren'sche . . . . .	203
Finger, schnellender . . . . .	204
Fistula ani, Spaltung der . . . . .	392
Fossa canina. Eröffnung der Kieferhöhle von der . . . . .	232
Fussgelenk, Resektion des . . . . .	196
— nach Kocher . . . . .	198
— nach König . . . . .	197
— nach Langenbeck . . . . .	196
— nach Wladimiroff-Mikulicz . . . . .	199

## G.

Ganglion Gasseri, Freilegung des . . . . .	185
Gallensystem, Operationen am . . . . .	377
Gastroenterostomia . . . . .	367
— anterior . . . . .	369
— posterior . . . . .	372
Gastrostomie . . . . .	362
Gaumenresektion nach Gussenbauer . . . . .	240
Gaumenspalte, Operation der . . . . .	274
Gefässscheide, Blosslegung der . . . . .	50
Gehirn, Projektion auf die Oberfläche des Schädels . . . . .	222
Gehörgang, Abmeisselung des äusseren . . . . .	227
Gelenkresektionen, Ausführung der . . . . .	172
— Indikationen für die . . . . .	174
Geschlechtsorgane, Operationen der . . . . .	443
Gestielte Nadeln . . . . .	38

## H.

Hämorrhoiden . . . . .	394
— Elastische Ligatur der . . . . .	396

	Seite
Hämorrhoiden, — Exstision der . . . . .	396
— Kauterisation der . . . . .	396
Hängender Kopf, bei Operationen . . . . .	3
Handgelenk, Exartikulation im . . . . .	156
— Resektion . . . . .	186
Hammer, Entfernung des . . . . .	229
Harnblase, Drainage der . . . . .	436
— Eröffnung suprasymphäre . . . . .	432
— Exzision von Geschwülsten der . . . . .	436
— Naht der . . . . .	436
— Punktion der . . . . .	411
Harnblase, Spaltung, angeborene der . . . . .	438
Harnröhre, Anatomie der . . . . .	397
Harnröhrenfisteln . . . . .	468
Harnröhrenruptur, Urethrotomie bei . . . . .	421
Harnröhrenschnitt, äusserer . . . . .	415
— innerer . . . . .	422
Hasenschartenoperationen . . . . .	270
Hautschnitte zu den Unterbindungen . . . . .	49
Heberdrainage, nach Steinschnitt . . . . .	436
Hernien, Operation der eingeklemmten . . . . .	472
— Radikaloperation der . . . . .	475
Hernia cruralis . . . . .	479
— inguinalis . . . . .	475
— umbilicalis . . . . .	482
Herzbeutel, Punktion . . . . .	328
— Inzision . . . . .	328
Herznaht . . . . .	328
Heteroplastik . . . . .	216
Hirnwindungen, Projektion auf die Schädeloberfläche . . . . .	222
Hoden, Exstirpation . . . . .	456
Hohlsonde, Präparieren auf der . . . . .	13
Hüftgelenk, Exartikulation im . . . . .	145
— Resektion . . . . .	188
Hüftluxation, Operation der angeborenen . . . . .	205
Hydrocele, Punktion der . . . . .	460
— Radikaloperation der . . . . .	461
— — nach Bergmann . . . . .	461
— — nach Volkmann . . . . .	461
— — nach Winkelmann . . . . .	462
Hypospadie, Operation der . . . . .	470

## I.

Ileus, Darmfistel bei . . . . .	353
Implantation von Celluloidplatten in Schädeldefekte . . . . .	216
Indikationen für Amputation . . . . .	77
— für Resektionen . . . . .	174

	Seite
Indikationen für Unterbindungen . . . . .	47
Infusion, subkutane . . . . .	22
Injektion, subkutane . . . . .	22
— parenchymatöse . . . . .	22
Interphalangealgelenke, Enukleation . . . . .	148
— Resektion . . . . .	187
Intrabukkale Blosslegung des Nervus mandibularis . . . . .	281
— — — mentalis . . . . .	283
Intrakranielle Operation am Trigeminus . . . . .	285
Intubation . . . . .	299
Itinerarium, Urethrotomie über dem . . . . .	417

## J.

Jejunostomie . . . . .	354
Jochbein, temporäre Resektion . . . . .	283

## K.

Kanüle für Tracheotomie . . . . .	298
Kastration . . . . .	456
Katheter, Formen der . . . . .	399
Katheterismus . . . . .	397
— mit starren Instrumenten . . . . .	403
— mit weichen Instrumenten . . . . .	401
— posterior . . . . .	419
Kehlkopf, Exstirpation des . . . . .	289
— Spaltung des . . . . .	286
Keilexzision der Unterlippe . . . . .	254
Kettensäge . . . . .	27
Kleinhirn, Blosslegung . . . . .	230
Klumpfuß, Operation . . . . .	209
Kniegelenk, Exartikulation des . . . . .	135
— Punktion und Inzision . . . . .	200
— Resektion des . . . . .	191
Knierohr zur Blasendrainage . . . . .	436
Knochen, Durchtrennung . . . . .	26
— Naht . . . . .	46
Knopf, Murphys . . . . .	351
Knopfnah . . . . .	41
Knoten, chirurgischer . . . . .	53
Kolopexie . . . . .	362
Kolostomie . . . . .	355
Kompression, provisorische Blutstillung durch . . . . .	30
Kopfnicker, Tenotomie des . . . . .	321
Kotabszess, Inzision bei . . . . .	475
Kranio-zerebrale Topographie . . . . .	222
Kreuzbeinresektion bei Rektumexstirpation . . . . .	389

	Seite
Kreuzbeinresektion, osteoplastische . . . . .	391
Krikothyreotomie . . . . .	288
Krönlein'sche Trepanationsstellen der Art. meningea med. . . . .	224
Kropfoperationen . . . . .	318
Kürschnernaht . . . . .	41

### L.

Lagerung des Kranken . . . . .	1
Laparotomie . . . . .	339
Läppchen, Malgaigne'sche . . . . .	272
Lappen bei Amputationen . . . . .	85
Laryngotomie . . . . .	206
Larynxexstirpation . . . . .	289
Lateralschnitt . . . . .	425
Leistenbruch, Radikaloperation des . . . . .	476
Leistenkanal . . . . .	476
Lentikulare . . . . .	217
Ligatur der Gefäße in der Kontinuität . . . . .	47
Ligatur, elastische . . . . .	26
Lisfranc'sche Operation . . . . .	101
Litholapaxie . . . . .	427
Lufttröhre, Eröffnung der . . . . .	291
Luftwege, Operationen der . . . . .	286
Lumbalpunktion . . . . .	334
Lumbalschnitt . . . . .	442
Lunge, Blosslegung der . . . . .	322
Luxationsmethode der Fussgelenkresektion . . . . .	198

### M.

Macewen, Operation des Genu valgum . . . . .	207
Magen, Operationen am . . . . .	392
Magenfistel . . . . .	362
Magenresektion . . . . .	378
Malgaigne'sche Exartikulation . . . . .	108
Mammaamputation . . . . .	330
Mandeln, Abkappung der . . . . .	251
Manschettenbildung bei Amputationen . . . . .	81
Mastdarm, Amputation . . . . .	386
— Resektion . . . . .	386
Mastdarmfistel . . . . .	392
Mastdarmoperationen, sakrale . . . . .	388
Matratzennaht . . . . .	41
Meistertour, ganze . . . . .	407
— halbe . . . . .	407
Meloplastik . . . . .	265
Messerführung . . . . .	6

	Seite
Metakarpus, Amputation des . . . . .	156
— Exzision eines . . . . .	188
Metallklammernaht . . . . .	40
Metatarsusknochen, Amputation der . . . . .	98
Milz, Exstirpation der . . . . .	382
Mittelohrräume, Blosslegung der . . . . .	227
Modell, für Rhinoplastik . . . . .	262
Mundspiegel von O'Dweyer . . . . .	300

## N.

Nabelbruch, Operation des . . . . .	482
Nadel, chirurgische . . . . .	37
— gestielte . . . . .	38
Nadelhalter . . . . .	38
Nagel, eingewachsener . . . . .	211
Naht, blutige . . . . .	37
— Knopf- . . . . .	41
— fortlaufende . . . . .	41
— primäre . . . . .	36
— sekundäre . . . . .	37
— versenkte . . . . .	41
— paratendinöse . . . . .	43
— paraneurotische . . . . .	44
— perineurotische . . . . .	45
— der Knochen . . . . .	45
— der Nerven . . . . .	44
— der Sehnen . . . . .	42
Nahtmaterial . . . . .	38
Nasenplastik . . . . .	266
Nerven, Operationen an den . . . . .	276
Nervus buccinatorius . . . . .	280
— frontalis . . . . .	276
— infraorbitalis . . . . .	277
— lingualis . . . . .	281
— mandibularis . . . . .	281
— mentalis . . . . .	283
— supramaxillaris . . . . .	277
Neurotomie . . . . .	276
Neurektomie . . . . .	276
Neurexairesis . . . . .	276
Niere, Operationen an der . . . . .	440

## O.

Oberarm, Amputation des . . . . .	169
— Anordnung der Muskulatur . . . . .	59
Oberkiefer, Resektion . . . . .	234
— — temporäre . . . . .	238

	Seite
Oberkiefer, Resektion, partielle . . . . .	240
Oberschenkel, Amputation . . . . .	130
— Anordnung der Muskulatur . . . . .	65
Oesophagotomie . . . . .	305
Omentopexie . . . . .	383
Osteoklase . . . . .	29
Osteoplastische Amputation . . . . .	
— am Unterschenkel . . . . .	120
— am Oberschenkel . . . . .	139
— Resektion am Oberkiefer . . . . .	238
— — am Schädel . . . . .	218
— — — mittelst Drahtsäge . . . . .	220
Osteostomia femoris . . . . .	200
— cruris . . . . .	210
Ovalairschnitt . . . . .	90

## P.

Paraffininjektion v. Gersuny . . . . .	266
Penis, Amputation des . . . . .	465
— Exstirpation . . . . .	467
Pectoralis, Abtragung des Musc. . . . .	331
Perforateur . . . . .	216
Perineale Blosslegung der Prostata . . . . .	450
— der Samenblasen . . . . .	449
Perinealer Steinschnitt . . . . .	423
Perineotomie . . . . .	449
Pharyngotomia infrahyoidea . . . . .	303
— lateralis . . . . .	305
Phimose, Operation der . . . . .	462
Phlebotomie . . . . .	61
Pirogoff'sche Amputation . . . . .	125
Plastische Operationen . . . . .	253
Plastik an den Lippen . . . . .	256
— an der Nase . . . . .	260
— an den Nerven . . . . .	276
— an den Sehnen . . . . .	44
Plattfuss, Operation beim . . . . .	210
Pneumotomie . . . . .	327
Präparieren im Gewebe . . . . .	11
— auf der Hohlsonde . . . . .	13
— stumpfes . . . . .	14
Praerektalschnitt . . . . .	449
Prolapsus ani, Operation des . . . . .	394
Prostatektomia perinealis . . . . .	450
Prostatotomia . . . . .	448

	Seite
Punktion . . . . .	20
— des Bauches . . . . .	335
Pylorusresektion . . . . .	375

## R.

Radikaloperation des Leistenbruchs . . . . .	476
— des Nabelbruchs . . . . .	482
— des Schenkelbruchs . . . . .	480
— des Wasserbruchs . . . . .	461
Ranula, Operation der . . . . .	250
Rapheschnitt . . . . .	387
Rektum, Amputation des . . . . .	386
— sakrale Operationen am . . . . .	387
Resektion des Darmes . . . . .	356
— des Ellbogengelenkes . . . . .	180
— der Fingergelenke . . . . .	187
— des Fussgelenkes . . . . .	196
— — nach Wladimiroff-Mikulicz . . . . .	149
— des Ganglion Gasseri . . . . .	285
— der Gelenke, Indikationen . . . . .	174
— — Methoden . . . . .	172
— des Handgelenkes . . . . .	186
— des Hüftgelenkes . . . . .	188
— des Jochbeins, temporäre . . . . .	283
— des Kniegelenkes . . . . .	191
— des Kreuzbeins . . . . .	389
— — temporäre . . . . .	391
— des Kropfes . . . . .	
— des Mastdarms . . . . .	390
— der Nerven . . . . .	276
— des Oberkiefers . . . . .	234
— des Pylorus . . . . .	378
— der Rippen . . . . .	326
— des Schädels, osteoplastische . . . . .	218
— des Schultergelenkes . . . . .	175
— der Skapula . . . . .	202
— der Symphyse . . . . .	437
— des Thorax . . . . .	326
— des Trigenus . . . . .	276
— des Unterkiefers . . . . .	240
— der Varikokele . . . . .	459
— des Vas deferens . . . . .	455
— des Wurmfortsatz . . . . .	358
— der Zunge . . . . .	247
Retrobukale Blosslegung des N. inframaxillaris . . . . .	284
Retrograde Spaltung von Harnröhrenstrikturen . . . . .	419

	Seite
Rhinoplastik, partielle . . . . .	266
— totale . . . . .	260
— aus der Armhaut . . . . .	266
— aus der Stirnhaut . . . . .	260
— aus der Wange . . . . .	263

## S.

Sakrale Methode . . . . .	388
Samenblasen, Blosslegung der . . . . .	449
Sattelnase, Operation der . . . . .	265
Schädelbasis, Blosslegung durch Gaumenresektion . . . . .	240
— Trigemiusresektion an der . . . . .	285
Schädeldach, Resektion am . . . . .	218
Schädeldefekt, Deckung . . . . .	215
Schenkelbruch, Operation des . . . . .	479
Schenkelkanal . . . . .	479
Schere, Schneiden mit der . . . . .	17
Schilddrüse, Operationen an der . . . . .	318
Schildknorpel, Spaltung des . . . . .	286
Schläfenlappen, Blosslegung . . . . .	230
Schlingenschnürr . . . . .	25
Schlüssel des Chopart'schen Gelenkes . . . . .	107
Schlüsselbein, temporäre Durchtrennung . . . . .	334
Schultergelenk, Exartikulation . . . . .	166
— Resektion . . . . .	175
Schultergürtel, Auslösung des Armes mit . . . . .	170
Sectio alta . . . . .	432
— lateralis . . . . .	425
— mediana . . . . .	426
Sehennahrt . . . . .	42
Sehnenscheidenhygrome . . . . .	202
Seitenlagerung . . . . .	5
Serosanähte, Lember't'sche . . . . .	343
Silberdrahtnaht . . . . .	45
Sinus frontalis, Trepanation . . . . .	230
Skrotum, Spaltung bei Penisamputation . . . . .	468
Speiseröhre, Eröffnung der . . . . .	305
Sphinkterotomie . . . . .	386
Sprunggelenk, Eukleationen im . . . . .	101
— Resektion im . . . . .	196
Staphyloraphie . . . . .	274
Steinschnitt . . . . .	368
Steinschnittlage . . . . .	3
Steinzertrümmerung . . . . .	427
Stich, Trennung der Gewebe durch . . . . .	19
Stirnhöhle, Eröffnung der . . . . .	230
Struma, Operationen der . . . . .	318



	Seite
Stumpfes Präparieren . . . . .	14
Subkutane Durchschneidung der Sehnen . . . . .	10
Subperiostale Amputation des Unterschenkels . . . . .	122
Sylvi'sche Spalte, Projektion . . . . .	224
Syme'sche Operation . . . . .	122
Symphysis sacro-iliaca, Durchtrennung der . . . . .	439
Syndaktilie, Operation der . . . . .	204

## T.

Talotarsalgelenk, Exartikulation im . . . . .	108
Tamponkanüle . . . . .	299
Tenotomie, der Achillessehne . . . . .	211
— des Kopfnickers . . . . .	321
Thermokauter . . . . .	23
Thorakozentese . . . . .	332
Thorakoplastik . . . . .	327
Thorakotomie . . . . .	324
Thyreotomie . . . . .	286
Tirefond . . . . .	217
Tonsillarabszess . . . . .	253
Tonsillotomie . . . . .	251
Trachealkanülen . . . . .	298
Tracheotomie . . . . .	291
Transfixion, Lappenbildung durch . . . . .	87
Transplantation der Haut nach Thiersch . . . . .	258
Trepanation, Indikationen . . . . .	214
— mit dem Meissel und Hammer . . . . .	217
— mit dem Trepan . . . . .	216
— des Warzenfortsatz . . . . .	226
Trepanationsstellen am Schädel . . . . .	222
Trigeminus Erster Ast . . . . .	276
— Zweiter Ast . . . . .	277
— Dritter Ast . . . . .	284
— Intrakranielle Resektion . . . . .	285
Trigonum linguale . . . . .	312
Truncus anonymus, Unterbindung . . . . .	308
Tuberculum Lisfranci . . . . .	316
Tunica vaginalis, Exstirpation der . . . . .	461
— Umstülpung der . . . . .	462

## U.

Unterarm, Amputationen am . . . . .	159
Unterbindung der Gefäße in der Kontinuität . . . . .	47
— an den oberen Extremitäten . . . . .	53
— an den unteren „ . . . . .	65
Unterkiefer, Resektion . . . . .	240
— — temporäre . . . . .	242

	Seite
Unterlippe, plastischer Ersatz der . . . . .	254
Unterschenkel, Amputationen . . . . .	111
Uranoplastik . . . . .	274
Ureter, Operationen am . . . . .	445
Urethrostomia . . . . .	486
Urethrotomia interna . . . . .	422
— externa . . . . .	415

## V.

Varikokele, Operation . . . . .	459
Varizen, Operation . . . . .	208
Vas deferens, Resektion des . . . . .	455
Vena saphena, Unterbindung . . . . .	208
Vereinigung durchtrennter Gewebe . . . . .	36
Verweilkatheter . . . . .	409
Vorderarm, Amputation am . . . . .	159
Vorhaut, Zirkumzision . . . . .	464
— Dorsalinzision . . . . .	462
Voroperationen zur Zungenexstirpation . . . . .	247

## W.

Wanderniere, Fixierung der . . . . .	
Wange, quere Spaltung der . . . . .	247
Wangenplastik . . . . .	268
Warzenfortsatz, Trepanation des . . . . .	226
Widernatürlicher After, Anlegung . . . . .	355
Wurmfortsatz, Abtragung des . . . . .	358
Wundnaht . . . . .	36

## Z.

Zange von Dohlgrén . . . . .	220
— von Langenbeck . . . . .	178
— von Luer . . . . .	218
Zehen, Amputation der . . . . .	98
— Exartikulation der . . . . .	90
Zentralfurche, Projektion der . . . . .	223
Zertrümmerung von Blasensteinen . . . . .	427
Zirkulärsäge . . . . .	28
Zirkumzision . . . . .	464
Zunge, Exstirpation der . . . . .	246
— nach Regnoli . . . . .	248
— — Kocher . . . . .	249
Zwischenkiefer, Rücklagerung . . . . .	274
Zystostomie . . . . .	438

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

---

# ***Lehmann's***

## ***medizinische***

### ***Handatlanten,***

**nebst kurzgefassten Lehrbüchern.**

Herausgegeben von:

Prof. Dr. O. v. Bollinger, Doz. Dr. G. Brühl, Prof. Dr. H. Dürck, Dr. E. Goleblewski, Dr. L. Grünwald, Professor Dr. O. Haab, Doz. Dr. R. Hecker, Prof. Dr. H. Helferich, Prof. Dr. A. Hoffa, † Prof. Dr. E. von Hofmann, Prof. Dr. Chr. Jakob, Prof. Dr. K. B. Lehmann, Doz. Dr. A. Lüning, Prof. Dr. G. Marwedel, Prof. Dr. F. Mracek, Dr. R. O. Neumann, Doz. Dr. G. Preiswerk, Doz. Dr. O. Schäffer, Doz. Dr. W. Schulthess, Prof. Dr. O. Schultze, Doz. Dr. W. Seiffer, Prof. Dr. J. Sobotta, Prof. Dr. G. Sultan, Doz. Dr. J. Trumpp, Doz. Dr. W. Weygandt, Doz. Dr. O. Zuckerkanal u. a. m.

*Bücher von hohem, wissenschaftlichem Wert,*  
*in bester Ausstattung, zu billigem Preise.*

---

**Urteile der Presse:**

**Wiener medizinische Wochenschrift:**

Sowohl der praktische Arzt als der Student empfinden gewisse vielfach das Bedürfnis, die Schilderung des Krankheitsbildes durch gute, bildliche Darstellung ergänzt zu sehen. Diesem allgemeinen Bedürfnisse entsprechen die bisherigen Atlanten und Bildwerke wegen ihrer sehr erheblichen Anschaffungskosten nicht. Das Unternehmen des Verlegers verdient daher alle Anerkennung. Ist es doch selbst bei eifrigem Studium kaum möglich, aus der wörtlichen Beschreibung der Krankheitsbilder sich allein eine klare Vorstellung von den krankhaften Veränderungen zu machen. Der Verleger ist somit zu der gewiss guten Idee zu beglückwünschen, ebenso glücklich war die Wahl der Fachmänner, unter deren Aegide die bisherigen Atlanten erschienen sind.

**Therapeutische Monatshefte:**

Es ist entschieden als ein glücklicher Gedanke des Verlegers zu bezeichnen, das, was in der Medizin bildlich darzustellen ist, in Form von Handatlanten zu bringen, die infolge ihres ausserordentlich niedrigen Preises jedermann leicht zugänglich sind.

**Lehmann's mediz. Handatlanten.**

Band I.

**Atlas und Grundriss der  
Lehre vom Geburtsakt u. der operativen Geburtshilfe**

von Dr. O. Schäffer, Privatdozent an der Universität Heidelberg.

Mit 16 bunten Tafeln nach Originalen von Maler A. Schmitson  
und 139 Abbildungen.

5. erweiterte Auflage. Preis eleg. geb. Mk. 8.—

Die Wiener medizin. Wochenschrift schreibt: Die kurzen Bemerkungen zu jedem Bilde geben im Verein mit demselben eine der anschaulichsten Darstellungen des Geburtsaktes, die wir in der Fachliteratur kennen.

Band II.

**Geburtshilfliche Diagnostik  
und Therapie.**Von Dr. O. Schäffer, Priv.-Doz.  
an der Universität Heidelberg.Mit 160 meist farbigen Abbildungen  
auf Tafeln nach Originalen von den  
Malern A. Schmitson und C. Krapf,  
und zahlreichen Textillustrationen.  
2. vollst. umgearb. u. erw. Aufl.

Preis eleg. geb. Mk. 12.—

Band III.

**Atlas und Grundriss der  
Gynäkologie.**Von Dr. O. Schäffer, Priv.-Doz.  
an der Universität Heidelberg.Mit 90 farbigen Tafeln, 65 Text-  
Illustrationen und reichem Text.  
2. vollständig umgearbeitete und  
erweiterte Auflage.

Preis eleg. geb. Mk. 14.—

Band XXVIII:

**Atlas und Grundriss  
der****Gynäkologischen Operationslehre.**

Von Dr. O. Schäffer, Privatdozent an der Universität Heidelberg.

Mit 42 farbigen Tafeln u. 21 zum Teil farbigen Textabbildungen  
nach Originalen von Maler A. Schmitson.

Preis schön und dauerhaft gebunden Mk. 12.—

Prof. Fritsch, Bonn, schreibt (Centralblatt für Gynäkologie 1895, No. 39)

Als Gegengewicht gegen die quantitative Vermehrung des Lernstoffes hat man vielfach die Lehrmittel verbessert. Es sind kurze Kompendien, instruktive Abbildungen eingeführt.

Diese Tendenz verfolgen auch die bei Lehmann erschienenen Atlanten. Einer der besten ist jedenfalls der von S. Ich möchte den Studenten mehr diesen Atlas als eines der modernen Kompendien empfehlen. Alle Zeichnungen sind einfach, übersichtlich und jedenfalls so hergestellt, dass der Lernende auf den ersten Blick das sieht, was er sehen soll. Es wäre sehr zu wünschen, dass diese Atlanten von den Lehrern überall warm empfohlen würden.

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

# Atlas und Grundriss der gesamten Augenheilkunde.

Band I.

## Atlas der äusseren Erkrankungen des Auges

nebst Grundriss ihrer Pathologie  
und Therapie von

Professor Dr. O. Haab  
in Zürich.

2. stark vermehrte Auflage.

Mit 80 farbigen Abbildungen auf  
48 Tafeln nach Aquarellen von Maler  
Johann Fink und 7 schwarzen Ab-  
bildungen im Text.

Preis eleg. gebunden Mk. 10.—

Dieses neue Werk des rühmlichst  
bekannten Züricher Ophthalmologen  
ist wie wenige geeignet, ein wahres  
Handbuch in der Bücherei eines jeden  
praktischen Arztes zu werden.

Band II.

## Atlas und Grundriss der Ophthalmoskopie und ophthalmoskop. Diagnostik.

Von

Professor Dr. O. Haab,  
Direktor der Augenklinik in Zürich.

4. verbesserte Auflage.

Mit 149 farbigen und 7 schwarzen  
Abbildungen.

Preis eleg. gebunden Mk. 10.—

*Korrespondenzblatt für schweizerische  
Aerzte:*

Ein prächtiges Werk. Die mit  
grosser Naturtreue wiedergegebenen  
Bilder des kranken und gesunden  
Augenhintergrundes bilden eine vor-  
zügliche Studie für den ophthalmolo-  
gischen Unterricht sowohl als für die  
ophthalmologische Diagnose in der  
Praxis.

Band III.

## Atlas und Grundriss der Lehre von den Augenoperationen

von

Professor Dr. O. Haab  
in Zürich.

Mit 30 farbigen Tafeln und zahlreichen schwarzen  
Abbildungen.

Preis gebunden Mk. 10.—

(Lehmann's med. Handatanten Band VII, XVIII, XXXI.)

**Lehmann's mediz. Handatlas.**

Band IV.

**Atlas und Grundriss der  
Krankheiten der Mundhöhle,  
des Rachens und der Nase**

**von Dr. Ludwig Grünwald in München.**

Zweite Auflage.

17 Bogen Text, 42 farbige Tafeln und 39 Textabbildungen.

Preis gebunden Mk. 12.—

Band XIV.

**Atlas und Grundriss der  
Kehlkopf-Krankheiten**

Mit 48 farbigen Tafeln und zahlreichen Textillustrationen nach Originalaquarellen des Malers

**Bruno Keilitz.**

Preis gebunden Mk. 8.—

Dem oft und gerade im Kreise der praktischen Aerzte und Studierenden geäusserten Bedürfnisse nach einem farbig illustrierten Lehrbuche der Kehlkopfkrankheiten, das in knapper Form das anschauliche Bild mit der im Text gegebenen Erläuterung verbindet, entspricht das vorliegende Werk des bekannten Münchener Laryngologen. Weit über hundert praktisch wertvolle Krankheitsfälle und 30 mikroskopische Präparate, nach Naturaufnahmen des Malers Bruno Keilitz, sind auf den 48 Volltafeln in hervorragender Weise wiedergegeben, und der Text, welcher sich in Form semiotischer Diagnose an diese Bilder anschliesst, gehört zu dem Instrukтивsten, was je auf diesem Gebiet geschrieben wurde.

Band XIII.

# **Atlas und Grundriss der Verbandlehre**

**für Studierende und Aerzte von**  
**Dr. Albert Hoffa,**

a. o. Professor an der Universität Berlin, Geh. Medizinalrat, Direktor der Universitäts-Poliklinik für orthopädische Chirurgie.

Mit 148 Tafeln nach Originalaquarellen von Maler Joh. Fink.

3. vermehrte und verbesserte Auflage.

**Preis gebunden Mk. 8.—**

Dieses Werk verbindet den höchsten praktischen Wert mit vornehmster, künstlerischer Ausstattung. Das grosse Ansehen des Autors allein bürgt schon dafür, dass dieses instruktive Buch, das die Bedürfnisse des Arztes, ebenso wie das für den Studierenden Nötige berücksichtigt, sich bei allen Interessenten Eingang verschaffen wird. Es liegt bereits in dritter Auflage vor. Die Abbildungen sind durchwegs nach Fällen aus der Würzburger Klinik des Autors in prächtigen Originalzeichnungen durch Herrn Maler Fink wiedergegeben worden.

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

---

## **Lehmann's mediz. Handatlanten.**

Band VIII.

### **Atlas und Grundriss**

der

# **traumatischen Frakturen und Luxationen**

von

Professor **Dr. H. Helferich** in Kiel.

Mit 76 Tafeln und 195 Figuren im Text von Maler B. Keilitz.

**Sechste verbesserte und vermehrte Auflage.**

Preis schön und dauerhaft gebunden Mk. 12.—

---

Band XXXII.

## **Atlas und Grundriss**

der

# **Kinderheilkunde.**

Von

**Dr. R. Hecker** und **Dr. J. Trumpp**

Privatdozenten an der Universität München.

Mit 48 farb. Tafeln und 144 schwarzen Abbildungen. 30 Bogen Text..

**Preis gebunden Mk. 16.—**

Die Kinderheilkunde eignet sich wegen der Uebersiehbarkeit der Körperformen und der grossen Zahl der auf der Oberfläche des Körpers sich abspielenden Erkrankungen ganz besonders für die bildliche Darstellung. Die beiden Autoren vereinigen in wissenschaftlicher wie in künstlerischer Beziehung in hervorragendem Masse diejenigen Eigenschaften, die sie zu einer gedeihlichen Lösung ihrer Aufgabe befähigen. Wer die Schwierigkeiten kennt, die bei der Herstellung solcher Tafeln zu überwinden sind, wird die grosse Mehrzahl derselben als ganz vorzüglich gelungen bezeichnen. Dem Atlas ist ein Text beigegeben, dem die Abbildungen gleichsam als Illustration dienen. Er zeichnet sich durch eine klare, knappe und doch angenehm zu lesende Diktion, sowie durch übersichtliche Anordnung und Behandlung des Stoffes aus. Man kann jedenfalls mit Genugtuung konstatieren, dass mit dem Erscheinen dieses Atlases ein dem Studierenden, wie dem praktischen Arzte und dem Kliniker gleich willkommenes Werk geschaffen wurde, das einen bedeutungsvollen Zuwachs der deutschen pädiatrischen Literatur darstellt.

*Escherich-Wien, Münchener med. Wochenschrift No. 48, vom 29. Nov. 1904*

**Lehmann's mediz. Handatlanten.**

Band X.

**Atlas und Grundriss der Bakteriologie**

und

**Lehrbuch der speziellen bakteriolog. Diagnostik.**

Von Prof. Dr. K. B. Lehmann in Würzburg und Dr. R. O. Neumann  
in Hamburg.

Bd. I Atlas mit za. 700 farbigen Abbildungen auf 74 Tafeln.  
Bd. II Text 623 Seiten mit 38 Bildern.

3. vermehrte und verbesserte Auflage.

Preis der 2 Bände eleg. geb. Mk. 16.—

**Münch. mediz. Wochenschrift 1896 No. 23.** Sämtliche Tafeln sind mit ausserordentlicher Sorgfalt und so naturgetreu ausgeführt, dass sie ein glänzendes Zeugnis von der feinen Beobachtungsgabe sowohl, als auch von der künstlerisch geschulten Hand des Autors ablegen.

Bei der Vorzüglichkeit der Ausführung und der Reichhaltigkeit der abgebildeten Arten ist der Atlas ein wertvolles Hilfsmittel für die Diagnostik, namentlich für das Arbeiten im bakteriologischen Laboratorium, indem es auch dem Anfänger leicht gelingen wird, nach demselben die verschiedenen Arten zu bestimmen. Von besonderem Interesse sind in dem I. Teil die Kapitel über die Systematik und die Abgrenzung der Arten der Spaltpilze. Die vom Verfasser hier entwickelten Anschauungen über die Variabilität und den Artbegriff der Spaltpilze mügen freilich bei solchen, welche an ein starres, schablonenhaftes System sich weniger auf Grund eigener objektiver Forschung, als vielmehr durch eine auf der Zeitströmung und unerschütterlichem Autoritätsglauben begründete Voreingenommenheit gewöhnt haben, schweres Bedenken erregen. Allein die Lehmann'schen Anschauungen entsprechen vollkommen der Wirklichkeit und es werden dieselben gewiss die Anerkennung aller vorurteilslosen Forscher finden. —

So bildet der Lehmann'sche Atlas nicht allein ein vorzügliches Hilfsmittel für die bakteriologische Diagnostik, sondern zugleich einen bedeutsamen Fortschritt in der Systematik und in der Erkenntnis des Artbegriffes bei den Bakterien.

Prof. Dr. Hauser.

**Allg. Wiener medicin. Zeitung 1896 No. 28.** Der Atlas kann als ein sehr sicherer Wegweiser bei dem Studium der Bakteriologie bezeichnet werden. Aus der Darstellungsweise Lehmann's leuchtet überall gewissenhafte Forschung, leitender Blick und volle Klarheit hervor.

**Pharmazent. Zeitung 1896 S. 471/72.** Fast durchweg in Originalfiguren zeigt uns der Atlas die prachtvoll gelungenen Bilder aller für den Menschen pathogenen, der meisten tierpathogenen und sehr vieler indifferenten Spaltpilze in verschiedenen Entwicklungsstufen.

Trotz der Vorzüglichkeit des „Atlas“ ist der „Textband“ die eigentliche wissenschaftliche Tat.

Für die Bakteriologie hat das neue Werk eine neue, im ganzen auf botanischen Prinzipien beruhende Nomenklatur geschaffen und diese muss und wird angenommen werden.

C. Mez-Breslau.



J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

## Lehmann's mediz. Handatlanten.

Band XI/XII.


# Atlas und Grundriss der patholog. Anatomie.

Von Obermedizinalrat Professor Dr. O. v. Bollinger.

In  
130 farbigen  
Tafeln nach  
Originalen  
von Maler  
A. Schmitson.

2. stark  
vermehrte  
Auflage.

Preis  
jedes Bandes  
eleg. geb.  
Mk. 12.—



Korrespondenzblatt f. Schweizer Aerzte 1895, 24. Die farbigen Tafeln des vorliegenden Werkes sind geradezu mustergültig ausgeführt. Die komplizierte Technik, welche dabei zur Verwendung kam (15facher Farbendruck nach Original-Aquarellen) lieferte überraschend schöne, naturgetreue Bilder, nicht nur in der Form, sondern namentlich in der Farbe, so dass man hier wirklich von einem Ersatz des natürlichen Präparates reden kann. Der praktische Arzt, welcher erfolgreich seinen Beruf ausüben soll, darf die pathol. Anatomie, „diese Grundlage des ärztl. Wissens und Handelns“ (Rokitansky) zeitlebens nie verlieren. — Der vorliegende Atlas wird ihm dabei ein ausgezeichnetes Hilfsmittel sein, dem sich zur Zeit, namentlich wenn man den geringen Preis berücksichtigt, nichts Ähnliches an die Seite stellen lässt. Die Mehrzahl der Tafeln sind reine Kunstwerke; der verbindende Text aus der bewährten Feder Prof. Bollingers gibt einen zusammenhängenden Abriss der für den Arzt wichtigsten path.-anat. Prozesse. — Verfasser und Verleger ist zu diesem prächtigen Werke zu gratulieren.

E. Haffter.

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

---

## Lehmann's medicin. Handatlanten.

Band V.

# Atlas und Grundriss der Hautkrankheiten

von

Professor Dr. Franz Mracek in Wien.

Zweite, vielfach verbesserte und erweiterte Auflage.

Mit 77 farbigen Tafeln nach Originalaquarellen von Maler J. Fink  
und A. Schmitson und 50 schwarzen Abbildungen.

Preis schön und dauerhaft gebunden Mk. 16.—

Dieser Band, die Frucht jahrelanger wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeit, enthält neben 77 farbigen Tafeln von ganz hervorragender Schönheit noch zahlreiche schwarze Abbildungen und einen reichen, das gesamte Gebiet der Dermatologie umfassenden Text. Die Abbildungen sind durchweg Originalaufnahmen nach dem lebenden Materiale der Mracek'schen Klinik, und die Ausführung der Tafeln übertrifft die Abbildungen aller, selbst der teuersten bisher erschienenen dermatologischen Atlanten.

Band VI:

# Atlas der Syphilis

und der

## venerischen Krankheiten

mit einem

## Grundriss der Pathologie und Therapie derselben

mit 71 farbigen Tafeln nach Originalaquarellen

von Maler A. Schmitson und 16 schwarzen Abbildungen

von

Professor Dr. Franz Mracek in Wien.

Preis des starken Bandes eleg. geb. Mk. 14.—

Nach dem einstimmigen Urteile der zahlreichen Autoritäten, denen die Originale zu diesem Werke vorlagen, übertrifft dasselbe an Schönheit alles, was auf diesem Gebiete nicht nur in Deutschland sondern in der gesamten Weltliteratur geschaffen wurde.

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

## Lehmann's medicin. Handatlanten.

Band XVII.

### Atlas der gerichtlichen Medizin

nach Originalen von

**Maler A. Schmitson**

mit erläuterndem Text von

**Hofrat Professor**

**Dr. E. Ritter v. Hofmann**

Direktor des gerichtl. medicin.  
Instituts in Wien.

Mit 56 farbigen Tafeln und 193  
schwarzen Abbildungen.

Preis elegant gebunden Mk. 15.—



Hymenformen.

Band XIX.

### Atlas und Grundriss der Unfallheilkunde

sowie der

### Nachkrankheiten der Unfallverletzungen.

Von Dr. Ed. Golebiewski in Berlin.

Mit 40 farbigen Tafeln, nach Originalen von Maler J. Fink und  
141 schwarzen Abbildungen.

Preis elegant gebunden Mk. 15.—

Dieses, in seiner Art ganz einzig dastehende Werk ist für jeden Arzt von tiefster Bedeutung und von ganz hervorragendem, praktischem Werte. In unserer Zeit der Unfallversicherungen und Berufsgenossenschaften kommt ein Spezialwerk über dieses Gebiet einem wahrhaft lebhaften Bedürfnisse entgegen und, so wie an jeden praktischen Arzt immer wieder die Notwendigkeit herantritt, in Unfallangelegenheiten als Arzt, als Zeuge, als Sachverständiger u. s. w. zu fungieren, so wird auch jeder Arzt stets gern in diesem umfassenden Buche Rat und Anregung in allen einschlägigen Fällen suchen und finden. Von grösstem Interesse ist das Werk ferner für Berufsgenossenschaften, Bezirksärzte, Physici, Vertrauensärzte, Krankenkassen, Landes-Versicherungsämter, Schiedsgerichte. Unfallversicherungsgesellschaften u. s. w.

**Lehmann's mediz. Handatlanten.**

Band IX.

**Atlas des gesunden und kranken Nervensystems**

nebst

**Grundriss der Anatomie, Pathologie und Therapie**

desselben

von Professor **Dr. Christfried Jakob,**

Vorstand d. patholog. Institutes f. Gehirn- u. Geisteskrankheiten

a. d. Universität Buenos-Ayres,

s. Z. I. Assistent der medicin. Klinik in Erlangen.

Mit einer Vorrede von

*Prof. Dr. Ad. v. Strümpell*, Direktor der medicin. Klinik in Erlangen**2. vollständig umgearbeitete Auflage.***Mit 105 farbigen und 120 schwarzen Abbildungen, sowie 284 Seiten Text und zahlreichen Textillustrationen.*Preis eleg. geb. **Mk. 14.—**

Prof. Dr. Ad. von Strümpell schreibt in seiner Vorrede zu dem vorliegenden Bande: „Jeder unbefangene Beurteiler wird, wie ich glaube, gleich mir den Eindruck gewinnen, dass die Abbildungen alles leisten, was man von ihnen erwarten darf. Sie geben die tatsächlichen Verhältnisse in deutlicher und anschaulicher Weise wieder und berücksichtigen in grosser Vollkommenheit fast alle die zahlreichen und wichtigen Ergebnisse, zu denen das Studium des Nervensystems in den letzten Jahrzehnten geführt hat. Dem Studierenden, sowie dem mit diesem Zweige der medizinischen Wissenschaft noch nicht näher vertrauten praktischen Arzt ist somit die Gelegenheit geboten, sich mit Hilfe des vorliegenden Atlases verhältnismässig leicht ein klares Bild von dem jetzigen Stand der gesamten Neurologie zu machen.“

Band XV.

**Atlas der klinischen Untersuchungsmethoden****nebst Grundriss der klinischen Diagnostik und der speziellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten**von Professor **Dr. Christfr. Jakob** in Buenos-Ayres.

s. Z. I. Assistent der medizinischen Klinik in Erlangen.

Mit 182 farbigen Abbild. auf 68 Tafeln und 250 Seiten Text mit 64 Textabbildungen.

Preis elegant geb. **Mk. 10.—****Dieser Band bietet für jeden praktischen Arzt und für jeden Studenten ein geradezu unentbehrliches Vademecum.**

Neben einem vorzüglichen Atlas der klinischen Mikroskopie sind in dem Bande die Untersuchungsbefunde aller inneren Krankheiten in instruktivster Weise in 50 vielfarbigen schematischen Bildern zur Darstellung gebracht. Nach dem Urteil eines der hervorragendsten Kliniker ist das Werk für den Studierenden ein Lehrmittel von unschätzbarem Werte, für den praktischen Arzt ein Repetitorium, in dem er sich sofort orientieren kann und das ihm in der täglichen Praxis vorzügliche Dienste leistet.

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

---

**Lehmann's mediz. Handatanten.**

Band XX/XXI.

**Atlas und Grundriss**

der

**pathologischen Histologie.**

**Spezieller Teil.**

120 farbige Tafeln nach Originalen des Universitätszeichners **C. Krapf**  
und reicher Text.

Von Professor **Dr. Hermann Dürck** in München.

2 Bände Preis geb. je **Mk. 11.—**

---

Band XXII.

**Atlas und Grundriss**

der

**Allgemeinen**


**pathologischen Histologie**

von Professor **Dr. Hermann Dürck** in München.

Mit 77 vielfarbigen lithographischen und 31 zum Teil zweifarbigen  
Buchdruck-Tafeln nach Originalen von Maler **K. Dirr** und Uni-  
versitätszeichner **C. Krapf**.

Preis geb. **Mk. 20.—**

Der Band schliesst sich den beiden vorhergegangenen über spe-  
zielle pathologische Histologie an, oder vielmehr die letzteren dienen  
zu seiner Ergänzung, aber seiner Anlage nach kann derselbe auch  
für sich allein als abgeschlossenes Ganzes benutzt werden.



Band XXIII.  
 Atlas und Grundriss  
 der  
 orthopädischen  
 Chirurgie

von Privatdozent

Dr. A. Lünig  
 Zürich

und Privatdozent

Dr. W. Schulthe  
 Zürich.

Mit 16 farbigen Tafeln  
 366 Textabbildungen.

Preis

elegant gebunden

Mk. 16.—

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

---

## Lehmann's medizinische Handatlanten.

Band XXIV.

### Atlas und Grundriss

der

# Ohrenheilkunde.

Unter Mitwirkung von

Professor Dr. A. Politzer in Wien

herausgegeben von

Privatdozent Dr. **Gustav Brühl**, Ohrenarzt in Berlin.

Mit 244 farbigen Abbildungen auf 39 Tafeln nach Originalaquarellen von Maler G. Hammerschmidt und 99 Textabbildungen.

**Preis elegant gebunden Mk. 12.—**

Dieser Atlas enthält neben einem vorzüglichen Grundriss, der alles Wissenswerte über Anatomie, Pathologie und Therapie in klarer, knapper, aber doch erschöpfender Form zur Darstellung bringt, einen Atlas von seltener Reichhaltigkeit. Den pathologischen Präparaten sind meist die normal anatomischen gegenübergestellt, sodass das Verständnis ungemein erleichtert wird. Die Ausführung der Tafeln wurde von den ersten Autoritäten als geradezu klassisch bezeichnet. Der Preis ist im Verhältnis zu dem Gebotenen erstaunlich billig.

---

Band XXX.

## Lehrbuch und Atlas

der

# Zahnheilkunde

mit Einschluss der Mundkrankheiten

von Dr. med. et phil. **Gustav Preiswerk**, Lektor an der Universität Basel.

Mit 44 farbigen Tafeln und 152 schwarzen Figuren nach Originalen von den Malern **J. Fink, M. Oser, P. Fiechter**.

**Preis schön und dauerhaft gebunden Mk. 14.—**

Das ganze Gebiet der Zahnheilkunde ist hier erschöpfend zur Darstellung gebracht. Unentbehrlich für die Bibliothek aller Zahnärzte und vieler praktischer Aerzte, entspricht das Buch auch besonders den Bedürfnissen der Studierenden, da es namentlich zur Vorbereitung für das Examen vorzüglich geeignet ist. Der Preis ist in Anbetracht der prächtigen Farbtafeln ein aussergewöhnlich niedriger.

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

**Lehmann's mediz. Handatlanten.**


Band XXV.

# **Atlas und Grundriss der Unterleibsbrüche**

von Professor **Dr. Georg Sultan** in Berlin.

Mit 36 farbigen Tafeln und 83 schwarzen Textabbildungen.

Preis elegant gebunden Mk. 10.—



Dieser Atlas bringt die Hernien in geradezu einziger Art zur Darstellung. Die in diesem Atlas enthaltenen Abbildungen, die farbigen sowohl als auch die schwarzen, sind vorzüglich ausgeführt und machen das Buch zu einem wertvollen Ratgeber für jeden Arzt und Medizinstudierenden. Der Text des Buches zeichnet sich durch klare und übersichtliche Behandlung des Stoffes aus.

Der Atlas ist ein Gegenstück zu Helferich, Frakturen und Luxationen, und es ist zu erwarten, dass Sultan ebenso wie Helferich bald in keiner medizin. Bibliothek fehlen wird.



**Lehmann's medizinische Handatlanten.**

Band XXVI.

**Atlas und Grundriss**  
 der  
**Histologie und**  
**mikroskopischen Anatomie**  
**des Menschen**

von Professor **Dr. J. Sobotta** in Würzburg.

17 Bogen Text. 80 farbige Tafeln und 68 Textabbildungen  
 nach Originalen von Maler **W. Freytag**.

**Schön und dauerhaft gebunden Mk. 20.—**

Dieses neue Werk über normale Histologie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass bei weitem die grosse Mehrzahl der Abbildungen, insbesondere fast alle, welche gefärbte Präparate wiedergeben, **in den natürlichen Farben des Präparates reproduziert sind**. Besonderes Gewicht wurde auf die Wiedergabe von Präparaten bei schwachen Vergrösserungen (Uebersichts- und Situsbildern) gelegt, da solche in den bisher vorzugsweise gebrauchten Lehrbüchern entweder ganz fehlten, oder wegen der Reproduktionsweise grösstenteils ungenügend für die Orientierung waren.

Das Schwergewicht des Werkes liegt in den **Abbildungen**. Trotzdem ist der beigegebene Text so vollständig, dass er als ein kurz gefasster Grundriss gelten kann, der alles bisher Festgestellte, soweit es für die Studierenden und Aerzte von Wichtigkeit ist, berücksichtigt und den ganzen Stoff ausserordentlich klar und übersichtlich zur Darstellung bringt.

Es hat jahrelanger, anstrengender, mühsamer Arbeit des Verfassers, des Malers und der lithographischen Anstalt bedurft, diesen Atlas, der in den ärztlichen Kreisen der ganzen Welt Aufsehen erregt hat, zustande zu bringen. Die 80 farbigen Tafeln, die der Atlas enthält, sind so vollendet schön und naturgetreu, dass man die Präparate im Original vor sich zu haben glaubt. Da es bisher für unmöglich galt, Tafeln in solch hervorragend schöner Ausführung auf der Schnellpresse zu drucken, kann der Sobotta'sche Atlas auch in drucktechnischer Hinsicht als eine einzigartige Musterleistung deutscher graphischer Kunst gelten. Durch den Schnellpressendruck war es möglich, dieses Kunstwerk zu einem relativ so ausserordentlichen niedrigen Preis herzustellen.

**Lehmann's medizinische Handatlanten.**

Band XXVII.

**Atlas und Grundriss  
der  
Psychiatrie**

von

**Wilhelm Weygandt**

Dr. med. et phil.

Privatdozent der Psychiatrie an der Universität  
Würzburg.43 Bogen Text, 24 farb.  
Tafeln nach Originalen  
von Maler Joh. Fink  
und Maler W. Freytag,  
276 Textabbildungen  
u. eine Anstaltskarte.  
Preis schön und dauer-  
haft gebund. Mk. 16.—

Band XXIX.

**Atlas und Grundriss  
der  
Allgemeinen  
Diagnostik und Therapie  
der Nervenkrankheiten**

von

**Dr. W. Seiffer,**Privatdozent an der Universität und Oberarzt an der Nervenlinik  
der Kgl. Charité, Berlin.Mit 26 farb. Taf. nach Originalen von Maler G. Hammerschmidt  
und Maler M. Landsberg und 264 Textabbildungen.**Preis schön und dauerhaft gebunden Mk. 12.—**

J. F. LEHMANN's Verlag in MÜNCHEN.

---

## Lehmann's medizinische Atlanten.

Neue Folge in Quartformat.

Band I.

### Atlas und Grundriss der topographischen und angewandten Anatomie

von

Dr. med. Oskar Schultze, Professor der Anatomie in Würzburg.  
Mit 70 farbigen Tafeln nach Originalen von Maler A. Schmitson  
und Maler K. Hajek, sowie 23 Textabbildungen. Preis geb. Mk. 16.—.

*„Dieses Werk ist nicht für den Anatomen geschrieben, sondern für den, der ein Arzt werden und sein will.“ Mit diesen Worten führt der Verfasser sein Buch ein und bekennet damit, dass er nicht nur für Studierende geschrieben haben, sondern auch den in der Praxis stehenden Arzt anatomisch unterstützen will. Der Text zeichnet sich durch prägnante Kürze und klaren Ausdruck, die Anordnung durch grosse Uebersichtlichkeit aus.*

Band II—IV.

### Atlas der deskriptiven Anatomie des Menschen

von Dr. J. Sobotta,

ao. Professor und Prosektor der Anatomie und der anthropotomischen Anstalt  
zu Würzburg.

I. Band (Lehmann's medizinische Atlanten Bd. II):

#### Knochen, Bänder, Gelenke und Muskeln des menschlichen Körpers.

Mit 34 farbigen Tafeln, sowie 257 zum Teil mehrfarbigen Abbildungen nach Originalen von Maler K. Hajek und Maler A. Smitson. Gebunden Mk. 20.—.

II. Band (Lehmann's medizinische Atlanten Bd. III):

#### Die Eingeweide des Menschen einschliesslich des Herzens.

Mit 19 farbigen Tafeln, sowie 187 zum Teil mehrfarbigen Abbildungen nach Originalen von Maler K. Hajek. Gebunden Mk. 16.—.

III. Band (Lehmann's medizinische Atlanten Bd. IV):

#### Das Nerven- und Gefäss-System und die Sinnes-Organе des Menschen. (Erscheint im Jahre 1905.)

#### Grundriss der deskriptiven Anatomie des Menschen

von Professor Dr. J. Sobotta.

Ausführlicher Text zum vorstehenden Atlas mit Verweisungen auf diesen.  
I. Band geheftet Mk. 4.—, II. Band geheftet Mk. 3.—.

Jeder Band enthält ausser den Abbildungen ausführliche Erklärungen derselben nebst Tabellen und kurzem Text. Ein ausführlicher Textband wird jedem Bande des Atlas, also in 3 Abteilungen, beigegeben. Diese Textbände stellen ein kurzes Lehrbuch der Anatomie dar.

Dars

To avoid fine, this book should be returned on  
or before the date last stamped below

idheits-

100-1-44

In Verl.  
von G  
P

ausgegeben  
Kamminer.  
10.—.

- |  |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
| 1. Einl.                               |  |  |                                     |
| 2. Hygi                                |  |  | ator(Berl.)                         |
| 3. Ange                                |  |  | München).                           |
| 4. heite                               |  |  |                                     |
| 5. Blut                                |  |  | Orth (Berl.)                        |
| 6. derel                               |  |  |                                     |
| 7. schal                               |  |  | aus (Berl.)                         |
| 8. Klim                                |  |  | Berlin).                            |
| 9. ihrer                               |  |  | Erbringer                           |
| 10. Sexua                              |  |  | (Berlin).                           |
| 11. Menst                              |  |  | Kossmann                            |
| 12. Woch                               |  |  | (Berlin).                           |
| 13. Konst                              |  |  |                                     |
| 14. Krank                              |  |  | tor(Berl.)                          |
| 15. Blutkr                             |  |  | Berlin).                            |
| 16. Krank                              |  |  | v. Leyden                           |
| 17. und El                             |  |  | (Berlin).                           |
| 18. Krankl                             |  |  |                                     |
| 19. und El                             |  |  | in).                                |
| 20. Krankl                             |  |  | A. Ewald                            |
| 21. und Eh                             |  |  | (Berlin).                           |
| 22. Nierenl                            |  |  | Richter                             |
| 23. Krankh                             |  |  | (Berlin).                           |
| 24. rates u                            |  |  | 4. Hofa                             |
| 25. Beziehu                            |  |  | (Berlin).                           |
| 26. halten                             |  |  |                                     |
| 27. auf die                            |  |  | belsdorf                            |
| 28. Hautkra                            |  |  | (Berlin).                           |
| 29. Syphillis                          |  |  | rlin).                              |
| 30. Trippere                           |  |  | rlin).                              |
| 31. Erkrank                            |  |  | Netzer                              |
| 32. wege, ph                           |  |  | Breslau).                           |
| 33. Frauenkr                           |  |  | er(Berl.)                           |
| 34. unfähigk                           |  |  | umreich                             |
| 35. Nervenkr                           |  |  | Berlin).                            |
| 36. Geisteskr.                         |  |  | lenburg                             |
| 37. Perverse                           |  |  | Berlin).                            |
| 38. chische l                          |  |  |                                     |
| 39. Alkoholl                           |  |  | Dr. med. A. Moll (Berlin).          |
| 40. morphinismus und                   |  |  | Med.-Rat Dr. A. Leppmann und        |
| 41. Ehe                                |  |  | Dr. med. F. Leppmann (Berlin).      |
| 42. Gewerbliche Schädlichkeiten und    |  |  | Med.-Rat Dr. A. Leppmann und        |
| 43. Ehe                                |  |  | Dr. med. F. Leppmann (Berlin).      |
| 44. Aerztliches Berufsgeheimnis u. Ehe |  |  | Dr. med. S. Placzek (Berlin).       |
| 45. Sozialpolitische Bedeutung der     |  |  | Privatdozent Dr. phil. R. Eberstadt |
| 46. sanitären Verhältnisse in der Ehe  |  |  | (Berlin).                           |

Redakteur:  
Dr. Bernhard Spatz  
Arnulfstrasse 26.

Auflage 10 000.

Münchener

Medizinische Woche

Verlag:  
J. F. Lehmann  
Heustraße 20.

ift

O. v.  
H. H.

M32 Zuckerkandl, O.

Z94 Atlas und Grundriss d. ann,  
1905 chirurgischen Operations-oldt,

lehre. 105742

DATE DUE

durch  
die L  
alle die  
jetzt d  
deuts

Sie  
Origin  
Un

wissens  
arbeiten  
In der Ru  
kurze In  
tracht k  
Die

mologie,  
jährlich u  
ungen rel  
monatlich  
einen Uebe  
wie er in g  
wird, sie e  
zimmer; sie  
falls seiten  
deren ärztli  
erstatte r  
und Prompt  
Med. Woch

Mitteilu  
tagesgesch  
ärztliche Va  
Med. Woche

Eine Gra  
„Galerie he  
erschieden u.  
kofer, v. Scan  
Thiersch, v. I  
v. Bollinger,  
Ludwig u.

Der  
der V

tützt  
über  
iber  
ist  
latt

lle

lle

el-

it.

ie

arl

nehmen  
entgegen.  
erfügung.  
asse 20.

